# KATALOG

ZUM

# HORTUS EISTETTENSIS.

IN ZWEI VERZEICHNISSEN:

1. NACH DER REIHENFOLGE DER TAFELN.
2. NACH ALPHABETARISCHER REIHENFOLGE DER NAMEN.

HERAUSGEGEBEN

VON DER

BIBLIOTHEK-COMMISSION DER KREIS- UND STADT-BIBLIOTHEK AUGSBURG.

**URHEBERRECHT VORBEHALTEN.**

**AUGSBURG.**

DRUCK VON PH. J. PFEIFFER.

**1885.**

# Erstes Verzeichnis, nach der Reihenfolge der Tafeln.

## Icones plantarum hiemalium.

Fol. 1. 1. Helleborus niger L. 2 u. 3. Galanthus nivalis L. 4 u. 5. Leucoium vernum L.

F. 2. 1. Helleborus viridis L. 2. Crocus luteus Lam. 3. Trichonema cruciatum Ker.

F. 3. 1. Helleborus foetidus L. 2 u. 3. Crocus variegatus Hpp. et Hsch.

F. 4. 1. Omphalodes verna Mönch. 2. Caltha palustris L. 3. Adonis vernalis L. 4. Viola tricolor L. 5. Primula officinalis (L.) Jacqu.

F. 5. 1. Petasites officinalis Mnch. 2. Petasites albus (L.) Gärtn. 3. Eranthis hiemalis Salisb.

F. 6. 1. Tussilago Farfarus L. 2. Pulsatilla vulgaris Mill. 3. Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 4. Anemone nemorosa L. 5. Chrysosplenium alternifolium L.

F. 7. 1. Daphne Mezereum L. 2. Corydallis cava (L.) Schw. u. K. 3. Cornus mas L. 4. Crocus vernus All.

## Icones plantarum vernalium.

### Ordo arborum et fruticum.

Fol. 1. 1. Buxus sempervirens L. 2 u. 3. Syringa vulgaris L.

F. 2. 1. Ruscus aculeatus L. 2. Philadelphus speciosus Schrader. 3. Philadelphus coronarius L.

F. 3. 1. Cercis Siliquastrum L. 2. Majanthemum bifolium (L.) Schmidt. 3. Botrychium Lunaria (L.) Sw. 4. Chrysosplenium alternifolium L.

F. 4. 1. Prunus Cerasus L. 2. Prunus Padus L. 3. Pinus excelsa (Lmk.) Lk.

F. 5. 1. Pirus Malus L. 2. Viscaria viscosa (Gil.) Aschs. 3. Campanula patula L.

F. 6. 1. Pistacia trifolia L. 2. Laurus nobilis L. 3. Amygdalus communis L.

F. 7. 1. Cytisus Laburnum L. 2. Cytisus alpinus Mill.

F. 8. 1. Staphylaea pinnata L. 2, 3, 4 u. 5. Vinca minor L.

F. 9. 1. Lonicera alpigena L. 2. Lonicera Xylosteum L. 3. Berberis vulgaris L.

F. 10. 1. Viburnum Opulus L. 2. Cytisus sessilifolius L. 3. Cytisus ratisbonensis Schaeff.

F. 11. 1. Lotus corniculatus L. 2. Cytisus supinus L. 3. Sarothamnus scoparius (L.) Koch. 4. Jasminum fruticans L.

F. 12. 1. Colutea arborescens L. 2. Medicago arborea L. 3. Cytisus nigricans L.

F. 13. 2. Ligustrum vulgare L.

F. 14. 1. Ribes alpinum L. 2, 4 u. 5. Ribes rubrum L. 3. Ribes nigrum L.

### Primus Ordo.

Fol. 1. 1. Lathraea Squamaria L. 2 u. 3. Erythronium Dens canis L. 4. Pulmonaria officinalis L. b) maculata. 5) Primula acaulis Jcqu.

F. 2. 1, 2 u. 3. Primula Auricula L. 4. Corydallis cava (L.) Schw u. K. 5. Anemone nemorosa L.

F. 3. 1. Anemone nemorosa L. 2. Anemone ranunculoides L. 3 u. 4. Cardamine pratensis L.

F. 4. 1, 2 u. 3. Viola ordorata L. 4 u. 5. Viola hirta L.

F. 5. 1. Doronicum Pardalianches L. 2. Geum rivale L. 3. Primula acaulis Jacqu. 4. Primula elatior (L.) Jacqu. (Die interessante Varietät calycantha.)

F. 6. 1. Ajuga reptans L. 2. Lathyrus variegatus Tn. 3. Melandryum rubrum (Weig.) Gke.

F. 7. 1. Lunaria rediviva L. 2. Lunaria annua L.

F. 8. 1. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 2 u. 3. Geranium pratense L.

F. 9. 1. Geranium maculatum L. 2. Geranium palustre L.

F. 10. 1. Erodium moschatum Her. 2. Geranium reflexum L. 3. ad: Geranium rotundifolium L.

F. 11. 1 u. 2. Thalictrum aquilegiifolium L. 3. Fumaria parviflora Lmk.

F. 12. 1. Ranunculus aconitifolius L. 2. Trollius asiaticus L. 3. Ranunculus bulbosus L.

F. 13. 1. Ranunculus illyricus L. 2. Ranunculus acer L. (acer × illyricus?) 3. Anemone silvestris L.

F. 14. 1. Ranunculus repens L. 2. Ranunculus lanuginosus L. 3. Ranunculus auricomus L.

F. 15. Ranunculus asiaticus L.

F. 16. 1. Geranium sanguineum L. 2. Geranium macrorhizon L. 3. Geranium tuberosum L.

F. 17. 1. Anemone coronaria L. 2. Anemone fulgens, b) pavonia Lmk. 3. Anemone hortensis L.

F. 18. 1. Anemone coronaria L. 2. Anemone fulgens b) pavonia Lmk. 3 u. 4. Anemone hortensis L.

## Secundus Ordo.

Fol. **1.** 1 u. 2. Arum maculatum L. 3. Bulbocodium vernum L. 4. Scilla amoena L.
F. **2.** 1 u. 2. Hepatica triloba Gil. 3. Narcissus bicolor Salisb. 4. Narcissus moschatus L. 5. Muscari botryoides W.
F. **3.** 1. Urginia Scilla Steinh. (= Scilla maritima L.) 2 u. 3. Crocus vernus W. 4 u. 5. Hepatica triloba Gil.
F. **4.** Hyacinthus orientalis L.
F. **5.** 1, 2, 3. Hyacinthus orientalis L. 4. Scilla bifolia L.
F. **6.** 1. Ornithogalum umbellatum L. 2 u. 3. Hyacinthus orientalis L.
F. **7.** 1. Gagea minima (L.) Schult. 2 u. 3. Hyacinthus orientalis L.
F. **8.** 1. Agraphis patula (Desf.) Rchb. 2. Hyacinthus convallarioides Thunb. 3 u. 4. Hyacinthus non scriptus L. 5. Hyacinthus amethystinus L.
F. **9.** 1. Scilla peruviana L. 2. Orchis ustulata L. 3. Orchis latifolia L.
F. **10.** 1. Muscari racemosum W. 2 u. 3. Muscari moschatum Willd.
F. **11.** 1. Scilla italica L. 2. Bellevalia romana (L.) Rchb. 3. ad: Ornithogalum umbellatum L.
F. **12.** 1. Mycogalum nutans Lk. (= Ornithogalum.) 2 u. 3. Hyacinthus pallens M. Bieb.
F. **13.** 1. Muscari botryoides Mill. 2. Muscari moschatum Willd. b) flava. 3. Scilla byzantina Poir.
F. **14.** 1. Hyacinthus orientalis L. 2, 3 u. 5. Hyacinthus romanus L. 4. Hyacinthus orientalis L.
F. **15.** 1, 2. Hyacinthus orientalis L. 3. Hyacinthus revolutus Thumb. 4. Crocus vernus W.
F. **16.** 1. Uropetalum serotinum Gawl. 2 u. 3. Viola tricolor. L.
F. **17.** 1. Muscari comosum Mill. 2. Hyacinthus convallarioides Thunb. 3. Orchis latifolia L. 4. Calla palustris L.

## Tertius Ordo.

Fol. **1.** 1. Narcissus Pseudo-Narcissus L. 2. Narcissus minor L. 3. Bulbocodium vernum L. 4 u. 5. Muscari botryoides Mill.
F. **2.** 1. Narcissus poeticus L. 2. Narcissus patulus Lois. 3. Narcissus biflorus Curt.
F. **3.** 1. Narcissus poeticus L. 2. Narcissus Pseudo-Narcissus L. 3. Narcissus Jonquilla L.
F. **4.** 1. Narcissus Jonquilla L. 2. Narcissus juncifolius Requien. 3 u. 4. Narcissus intermedius Lois. 5. Narcissus Bulbocodium L.
F. **5.** 1—3. Narcissus Pseudo-Narcissus L. 4. Narcissus cuneiflorus Salisb.
F. **6.** 1. Narcissus Sabini Lindl. 2. Narcissus major Curt. 3. Narcissus serratus Haw.
F. **7.** 1. Fritillaria ruthenica Wickstr. 2. Narcissus odorus L. 3. Narcissus Pseado-Narcissus L.
F. **8.** 1. Fritillaria montana Hpp. 2. Fritillaria Meleagris L. 3. Fritillaria Meleagris L. $\beta$ alba.
F. **9.** 1. Fritillaria tenella M. v. B. 2. Fritillaria messanensis Rafin. 3. Fritillaria pyrenaica L.
F. **10.** 1. Fritillaria Meleagris L. 2. Allium ursinnm L.
F. **11.** 1. Narcissus stellatus D. C. (= papyraceus Ker.) 2 u. 3. Narcissus niveus Lois.
F. **12.** 1 u. 2. Narcissus polyanthos Lois. 3. Narcissus dubius Gouan.
F. **13.** 1. Narcissus triandrus L. 2. Narcissus aurantius Schult. 3. Narcissus tortuosus Haw. 4. Narcissus tenuifolius Salisb.
F. **14.** 1 u. 2. Narcissus Tazetta L.
F. **15.** Narcissus Tazetta L.
F. **16.** 1. Pancratium illyricum L. 2 u. 3. Gnaphalium dioicum L.
F. **17.** 1. Narcissus Jonquilla. b. albiflora. 2. Tulipa silvestris L. 3. Leucojum aestivum L.

## Quartus Ordo.

Fol. **1—3.** Tulipa Gesneriana L. Figur 4 auf Fol. 1 gehört zu Tulipa Gesneriana. b. psittacina.
F. **4.** 1—5. Tulipa Gesneriana L.
F. **5. 6. 7. 8.** Die grössern Formen zu Tulipa Gesneriana L., die kleineren zu Tulipa pubescens Willd.
F. **9.** 1 u. 3. Tulipa turcica Roth. 2. Tulipa media Agardh.
F. **10.** 1. Tulipa praecox Ten. b) polyantha. 2. Leucojum aestivum L. 3. Narcissus radiiflorus Salisb.
F. **11.** Tulipa Oculus Solis St. Amand.
F. **12.** 1. Tulipa Gesneriana L. b. polyantha. 2 u. 3. Tulipa Clusiana D. C.
F. **13.** 1. Tulipa stellata Hook. 2. Allium Moly L. 3. Allium victoriale L.

## Quintus Ordo.

Fol. **1. 2. 3.** Petilium imperiale Jaume.
F. **4.** 1. Fritillaria persica L. 2. Iris tuberosa L. 3. Iris graminea L.
F. **5.** 1. Lilium croceum Choix. 2 u. 3. Viola persicifolia Schreb.
F. **6.** Lilium croceum Choix.
F. **7.** 1 u. 2. Lilium bulbiferum L. 3. Chlora serotina Koch.

# Icones plantarum aestivalium.

## Ordo arborum et fructicum.

Fol. **1.** Thuja occidentalis L. 2. Brunella vulgaris L. 3. Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb.
F. **2.** 1. Melia Azedarach L. 2 u. 3. Achillea Millefolium L.
F. **3.** 1. Cupressus fastigiata DC. (= sempervirens L.) 2. Spartium junceum L.
F. **4.** 1. Nerium Oleander L. 2 u. 3. Ocimum Basilicum L.
F. **5.** Nerium Oleander L.
F. **6.** 1. Citrus japonica Thnbg. 2. Citrus medica L. 3. Citrus Aurantium L.
F. **7.** 1. Punica Granatum L. 2 u. 3. Plantago major L. (Die Blüten zeigen Monstrositäten, wie sie manchmal bei dieser Art und P. lanceolata L. vorkommen).
F. **8.** 1. Punica Granatum L. 2. Terminalia Catappa. L. 3. Prunus Armeniaca L.
F. **9.** 1. Cistus monspeliensis L. 2. Punica Granatum L. 3. Rhus Cotinus L.
F. **10.** 1. Hibiscus syriacus L. 2. Anthemis Cotula L. 3. Malcolmia maritima Br.
F. **11.** Hibiscus syriacus L.
F. **12.** Myrtus communis L. (Valde varians.)
F. **13.** 1. Jasminum grandiflorum L. 2. Origanum Majorana L. 3. Euphrasia officinalis a) pratensis Fr. 4. E. officinalis b) nemorosa Pers.
F. **14.** 1. Solanum pseudocapsicum L. 2. Linaria alpina DC.

## Primus Ordo.

Fol. **1.** 1. Paris quadrifolius L. 2. Digitalis pupurea L. 3. Digitalis ambigua Murr. (grandiflora) a) acutiflora Koch.
F. **2.** 1. Digitalis Thapsi L. 2. Digitalis Thapsi b) tomentosa Lk. 3. Hieracium aurantiacum L.
F. **3.** 1. Centranthus ruber D. C. 2 u. 3. Campanula anchusaefolia Sibth.
F. **4.** 1. Campanula Medium L. 2 u. 3. Agrostemma Githago L.
F. **5.** 1. Campanula laciniata A. DC. 2. Silene venosa (Gil.) Aschs. (= inflata Sm.) 3. Silene nutans L.
F. **6.** 1. Campanula rapunculoides L. 2 u. 3. Campanula Trachelium L.
F. **7.** 1. Campanula pyramidalis L. 2 u. 3. Silene Armeria L.
F. **8.** 1. Epilobium angustifolium L. 2 u. 3. Campanula persicifolia L.
F. **9.** 1. Antirrhinum siculum Ucria. 2. Antirrhinum majus L. 3. Antirrhinum Orontium L.
F. **10.** 1 — 3. Antirrhinum majus L.
F. **11.** 1. Aconitum Lycoctonum L. 2. Delphinium elatum L.
F. **12.** 1. Aconitum Anthora L. 2. Aconitum Napellus L. 3. Aconitum variegatum L.
F. **13.** 1. Linum alpinum Icqu., potius L. austriacum L. 2 u. 3. Tragopogon porrifolius L.
F. **14.** 1. Chrysocoma Linosyris L. 2. Linaria genistaefolia Mill. 3. Linaria vulgaris Mill.
F. **15.** 1. Reseda Luteola L. 2. Mentha Pulegium L. 3. Preslia cervina Fresen. (= Mentha cervina L.)
F. **16.** 1. Reseda alba L. 2. Artemisia Dracunculus L. 3. Artemisia Abrotonum L.

## Secundus Ordo.

Fol. **1. 2. 3.** Matthiola annua S. und Matthiola incana R. Br.
F. **4.** 1. Matthiola fenestralis R. Br. 2 u. 3. Cheiranthus Cheirei L.
F. **5.** Cheiranthus Cheirei L.
F. **6.** 1 u. 2. Aquilegia vulgaris L. 3. Aquilegia vulgaris b. stellata Hort.
F. **7. 8. 9.** Je unter 1: Aquilegia vulgaris b. stellata Hort., unter 2 u. 3: Aquilegia vulgaris L.
F. **10.** 1. Nigella hispanica L. 2 u. 3. Nigella damascena L.
F. **11. 12.** 1. Delphinium Consolida L. 2 u. 3. Delphinium Ajacis L.
F. **13. 14.** 1. Delphinium Consolida L. 2. Delphinium orientale Gay.
F. **15.** 1. Cheiranthus Cheirei L. 2. Erysimum hieraciifolium L. a) strictum Fl. Wett.
F. **16.** 1. Nigella sativa L. 2 u. 3. Solanum Dulcamara L.

## Tertius Ordo.

Fol. **1.** 1. Lilium Martagon L. 2 u. 3. Dianthus Seguierii Vill.
F. **2. 3.** Lilium Martagon L.
F. **4.** 1. Lilium pomponium L. 2. Iris juncea Poir L. 3. Iris sibirica L.
F. **5.** 1 u. 2. Lilium chalcedonicum L. 3. Scilla autumnalis L.
F. **6.** Lilium Martagon L.
F. **7.** 1. Circaea lutetiana L. 2 u. 3. Lilium Martagon L.
F. **8.** 1. Lilium pomponium L. 2 u. 3. Orchis latifolia L.
F. **9.** 2 u. 3. Lilium superbum L.
F. **10.** 1. Iris juncea Poir. 2. Lilium chalcedonicum L. 3. ad: Crocus serotinus Salisb. 4. Crocus serotinus Salisb.

+ 1 extra plate not numbered in Ordo III

## Quartus Ordo.

Fol. 1. Dracunculus vulgaris Schott.
F. 2. 1. Leontice Leontopetalum L. 2. Alyssum montanum L. 3. Globularia vulgaris L.
F. 3. 1. Aristolochia rotunda L. 2. Aristolochia Clematidis L. 3. Bupleurum rotundifolium L.
F. 4. 1. Orchis fusca Jacq. 3. Neottia Nidus avis (L.) Rich. 4. Coralliorrhiza innata R. Br.
F. 5. 1. Epipactis latifolia Rchb. (aber mit gespornter Honiglippe). 2. Gymnadenia conopea (L.) R. Br. 3. Orchis incarnata L. a) lanceata A. D. (= angustifolia W. und Grab.). 4. Platanthera bifolia (L.) Rchb. 5. Nigritella angustifolia Rich. 6. Goodyera repens (L.) R. Br.
F. 6. 1. Ophrys Arachnites Reich. 2. Iris juncea Poir. 3. Iris reticulata Adam.
F. 7. 1. Iris Xiphoides Ehrh. 2. Polygonatum verticillatum L.
F. 8. 1. Iris Xiphoides Ehrh. 2 u. 3. Iris syrtica Vir.
F. 9. 1. Iris Xiphoides Ehrh. 2 u. 3. Iris lusitanica Ker.
F. 10. 1. Iris Xiphium L. 2. Gladiolus communis L. 3 u. 4. Gladiolus byzantinus Mill.
F. 11. 1. Allium Moly L. 2 u. 3. Iris syrtica Vir.
F. 12. Gladiolus cardinalis Curt.

## Quintus Ordo.

Fol. 1. Helianthus annuus L.
F. 2. Helianthus multiflorus L.
F. 3. Calendula officinalis L.
F. 4. 1. Chrysanthemum (Pyrethrum) corymbosum L. 2. Catananche coerulea L. 3. Calendula officinalis L., potius: C. arvensis L.
F. 5. 1. Impatiens Noli tangere L. 2. Chrysanthemum Tanacetum Karsch (= Tanacetum vulgare L.) 3. Chrysanthemum Tanacetum Karsch b) crispum DC.
F. 6. 1. Chrysanthemum leucanthemum L. 2 u. 3. Chrysanthemum (Pinardia) coronaria L.
F. 7. Chrysanthemum (Matricaria) Parthenicum (L.) Pers.
F. 8. 1. Achillea Ageratum L. 2. Bidens cernuus L. 3. Conyza asteroides Wall.
F. 9. 1. Gnaphalium margaritaceum L. 2. Senecio Cineraria DC. (= Cineraria maritima L.).
F. 10. 1. Saxifraga Cotyledon L. 2. Anacyclus officinarum Hayne (= Anthemis Pyrethrum Willd).
F. 11. 1. Pirola rotundifolia L. 2. Adonis auctumnalis L. 3. Adonis flammeus L.
F. 12. 1. Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. 2 u. 3. Aster Amellus L.

## Sextus Ordo.

Fol. 1. 1. Hibiscus Sabdariffa L. 2. Campanula bononiensis L. 3. Suaeda maritima (L.) Dumort. (= Chenopodium maritimum L.)
F. 2. 1. Hibiscus Trionum L. 2 u. 3. Ranunculus repens L.
F. 3. 1. Althaea cannabina L. 2. Malva Alcea L.
F. 4. 1. Althaea officinalis L. 2. Althaea Ludwigii L.
F. 5. 1. Lavatera thuringiaca L. 2. Linaria Cymbalaria (L.) Mill. 3. Clematis Vitalba L.
F. 6. Lavatera arborea L.
F. 7. 8. Althaea rosea Cav.
F. 9. 1. Malva crispa L. 2. Ballota Pseudodictamnus Benth. 3. Marrubium peregrinum L.
F. 10. 1. Abutilon Avicennae D. C. (Sida Abutilon L.) 2 u. 3. Lathyrus sativus L. (oder der hiezu sehr nahe verwandte Lath. Cicera L.)

## Septimus Ordo.

Fol. 1. 1. Moluccella spinosa L. 2. Melissa officinalis L. 3. Dracocephalus Moldavica L.
F. 2. 1. Moluccella laevis L. 2. Dracocephalus Moldavica L.
F. 3. 1. Mentha silvestris L. b) viridis Godr. 2. Mentha nepetoides Lej. 3. Mentha gentilis L. b) variegata.
F. 4. 1. Nepeta Nepetella L. 2. Nepeta nuda L. 3. Nepeta Cataria L.
F. 5. 1. Mentha piperita L. b) crispa L. 2. Urtica pilulifera L. 3. Mentha silvestris L. b) lanceolata Rchb. fil.
F. 6. 1. Marrubium vulgare L. 2. Marrubium candidissimum L. 3. Chrysanthemum majus (Desf.) Aschs. (= Tanacetum Balsamita L.)
F. 7. 1. Calamintha grandiflora Mönch. 2. Calamintha officinalis Mönch.
F. 8. 1. Statice sinuata L. 2. Calamintha Nepeta Clairv. 3. Plantago Coronopus L.
F. 9. Ocimum Basilicum L.
F. 10. 1, 2. Ocimum Basilicum. L. 3. Ocimum minimum L.
F. 11. 1. Teucrium flavum L. 2. Iberis umbellata L.
F. 12. 1. Helichrysum orientale Gärtn. 2. Dentaria bulbifera L. (Ohne die unteren gefiederten Blätter.) 3. Silene noctiflora L.

## Octavus Ordo.

Fol. 1. 1 u. 2. Salvia officinalis L. 3. Salvia silvestris L.
F. 2. 1. Salvia Sclarea L. 2. Salvia syriaca L.
F. 3. Salvia Aethiopis L.
F. 4. Salvia glutinosa L.
F. 5. 1. Caryolopha sempervirens L. (= Anchusa sempervirens L.) 2 u. 3. Anchusa italica Retz.
F. 6. 1. Anchusa officinalis L. 2. Cynoglossum officinale L. 3. Cynoglossum montanum L.
F. 7. Symphytum officinale L.
F. 8. 1. Hyoscyamus niger L. 2. Hyoscyamus albus L.
F. 9. 1. Veratrum album L. 2. Veratrum nigrum L.
F. 10. 1. Androsaemum officinale All. 2. Hypericum hircinum L. 3. Hypericum quadrangulum L.
F. 11. 1. Ricinus communis L. 2. Gentiana Pneumonanthe L. 3. Parnassia palustris L.
F. 12. 1. Ricinus communis L. 2. Lycopodium clavatum L.

## Nonus Ordo.

Fol. 1. Melandryum rubrum (Weig.) Gke.
F. 2. Coronaria tomentosa A. Br. (Lychnis Coronaria Descr.)
F. 3. 1. Calluna vulgaris (L.) Salisb. 2 u. 3. Coronaria tomentosa A. Br.
F. 4. Dianthus barbatus L.
F. 5. Lychnis chalcedonica L.
F. 6. 1. Scorzonera hispanica L. 2. Aruncus silvester Kost. (= Spiraea Aruncus L.)
F. 7. 1. Crepis foetida L. (= Barkhausia foetida D. C.) 2. Lychnis flos cuculi L.
F. 8. 1. Scabiosa alpina L. 2. Scabiosa stellata L. 3. Knautia arvensis (L.) Coult.
F. 9. 1. ad: Scabiosa stellata L. 2. Scabiosa columbaria L. 3. Scabiosa columbaria b. ochroleuca L.
F. 10. 1 u. 2. Scabiosa atropurpurea L. 3. Scabiosa lucida Vill.
F. 11. 1. Valeriana Phu L. 2 u. 3. Polemonium coeruleum L.
F. 12. 1. Saponaria officinalis L. 2. Astrantia major L. 3. Valeriana officinalis L.

## Decimus Ordo.

Fol. 1. 1. Capparis cynophallophora L. 2. Ononis Natrix L.
F. 2. 1. Ononis Natrix L. 2. Ononis arvensis L. syst. 3. Ononis spinosa L.
F. 3. 1. Actaea spicata L. 2. Ulmaria Filipendula (L.) A. Br.
F. 4. 1 u. 2. Verbascum Blattaria L. 3. Verbascum nigrum L.
F. 5. 1. Aster Tripolium L. 2. Verbascum Thapsus L. 3. Verbascum Lychnitis L.
F. 6. 1. Senecio sarracenicus L. 2. Solidago Virga aurea L. 3. Lysimachia vulgaris L.
F. 7. 1. Lysimachia punctata L. 2. Lythrum Salicaria L. 3. Stachys palustris L. (Die unterirdischen Ausläufer sind als Wurzelknollen abgebildet.)
F. 8. 1. Myagrum perfoliatum L. 2. Sinapis alba L.
F. 9. 1. Comarum palustre L. 2. Potentilla recta L. 3. Potentilla silvestris Neck. (= Tormentilla erecta L.).
F. 10. 1. Melilotus coeruleus (L.) Descr. 2. Trifolium incarnatum L. 3. Trifolium rubens L.
F. 11. Psoralea bituminosa L.
F. 12. 1. Melilotus officinalis (L.) Descr. 2 u. 3. Galega officinalis L.

## Undecimus Ordo.

Fol. 1. 1. Acanthus spinosus L. 2. Myosotis palustris (L.) With. 3. Myosotis intermedia Lk.
F. 2. 1. Jasminum officinale L. 2. Jasminum odoratissimum L. 3. Acanthus mollis L.
F. 3. 1. Carthamus tinctorius L. (aber ohne Bezähnelung der Blätter). 2 u. 3. Anthemis nobilis L.
F. 4. 1. Amberboa erucifolia D. C. 2. Serratula tinctoria L. 3. Cirsium canum M. Bieberst.
F. 5. 1 u. 2. Centaurea Jacea L. 3. Carduncellus coeruleus D. C. (= Carthamus coeruleus).
F. 6. Cynara Cardunculus L.
F. 7. 1. Echinops sphaerocephalus L. 2. Carduus nutans L.
F. 8. 1. Carlina acaulis L. 2. Cnicus Benedictus L. 3. Carlina vulgaris L. 4. Eryngium amethystinum L.
F. 9. 1. Eryngium maritimum L. 2 u. 3. Helianthemum Chamaecistus Mill. (Helianthemum vulgare Gaertn.)
F. 10. 1. Eryngium planum L. 2, 3, 4. Hyssopus officinalis L.

## Duodecimus Ordo.

Fol. 1. Ecbalium agreste Rchb. 2. Hieracium umbellatum L. 3. Rosmarinus officinalis L.
F. 2. 1. Tithymalus Lathyris (L.) Scop. 2. Melampyrum pratense L. 3. Lysimachia Nummularia L.
F. 3. 1. Portulaca oleracea L. 2. Thymus capitatus Hoffm. et Link. 3. Satureja hortensis L.

4. 1. Artemisia Absinthium L. 2. Artemisia coerulescens L. 3. Artemisia pontica L.
5. 1. Argemone mexicana L. 2. Helichrysum orientale Gaertn. 3. Achillea Ptarmica L.
6. 1. Glaucium luteum Sm. 2 u. 3. Viola tricolor L.
7. 1. Papaver somniferum Gmel. 2. Papaver Rhoeas L.
8. Papaver somniferum Gmel.
9. 1. Tordylium syriacum L. 2 u. 3. Papaver somniferum Gmel.
10. Papaver comniferum Gmel.

### Decimus tertius Ordo.

1. 1. Tropaeolum majus L. 2 u. 3. Bellis perennis L.
2. 1. Hedysarum coronarium L. 2. Onobrychis viciaefolia Scop. (= Onobrychis sativa Lmk.) 3. Chenopodium Botrys L.
3. 1. Lupinus varius L. 2. Lupinus nanus Dougl. 3. Lupinus luteus L.
4. 1. Lupinus hirsutus L. 2. Lupinus albus L. 3. Tetragonolobus purpureus Mnch.
5. 1. Sempervirum tectorum L. 2. Sedum villosum L. 3. Sedum acre L. 4. Sedum mite Gil. (= Sedum sexangulare). 5. Lathyrus tuberosus L. 6. Pisum sativum L.
6. 1. Coix Lacryma L. 2. Lathyrus latifolius L. 3. Lathyrus silvester L.
7. 1. Clematis integrifolia L. 2 u. 3. Clematis Viticella L.
8. 1. Campanula rotundifolia L. 2. Pharbitis purpurea (L.) Asch. 3. Pharbitis hederacea Choisy.
9. 1. Convolvulus sepium L. 2. Cynanchum acutum L. 3. Calystegia Soldanella R. Br.
10. 1. Clematis recta L. 2 u. 3. Clematis Viticella L.
11. 1. Cardiospermum halicacabum L. 2. Physalis Alkekengi. L. 3. Nicandra physaloides Gaertn.

### Decimus quartus Ordo.

1. Tagetes erectus L.
2. 1. Tagetes erectus L. 2 u. 3. Ocimum Basilicum L.
3. Tagetes patulus L.
4 u. 5. Dianthus Caryophyllus L.
6. 1. Dianthus Caryophyllus L. 2 u. 3. Lavandula Spica L.
7. 1. Dianthus Caryophyllus L. 2. Thymus Mastichina L. 3. Santolina Chamae-Cyparyssus L.
8. 1. Dianthus Caryophyllus L. 2. Drosera rotundifolia L. 3. Arnica montana L.
9. 10. 11. Dianthus Caryophyllus L.
12. 1. Dianthus sylvestris Wulf. 2 u. 3. Dianthus plumarius L.
13. 1. Dianthus superbus L. 2. Dianthus prolifer L. 3. Brunella grandiflora (L.) Jacqu. 4. Anthemis tinctoria L.
14. 1. Dianthus Carthusianorum L. 2 u. 3. Dianthus plumarius L.

## Icones plantarum auctumnalium.

### Primus Ordo.

1. 1. Lycopersicum esculentum Mill. 2 u. 3. Cucumis Melo L.
2. Lycopersicum esculentum Mill.
3. Solanum Melongena L.
4. 1. Impatiens Balsamina L. 2 u. 3. Momordica Balsamina L.
5. 1. Solanum aethiopicum L. 2. Origanum Majorana L.
6. 1. Capsicum longum DC. 2. Capsicum longum DC. (form. min.)
7. Capsicum longum DC. β incrassatum Fingerh.
8. 1. Capsicum conoides Mill. 2. Capsicum annuum L. β subangulosum Fingerh.
9. 1. Capsicum longum DC. β rectum Fingerh. 2. Capsicum longum DC. β latum Fingerh.
10. 1. Capsicum tetragonum Mill. 2. Capsicum cordiforme Mill. β globosum Fingerh.
11. 1. Capsicum grossum W. β angulosum Fingerh. 2. Capsicum annuum L. β acuminatum Fingerh.
12. 1. Capsicum cordiforme Mill. β minus Fingerh. 2. Capsicum cordiforme Mill. β globosum Fingerh.
13. 1. Capsicum cordiforme Mill. β majus Fingerh. 2. Capsicum cordiforme Mill.

### Secundus Ordo.

1. Canna indica L.
2. Canna lutea Ait.
3. 1. Mirabilis Jalappa L. 2. Gentiana ciliata L. 3. Gentiana germanica Willd.
4. Mirabilis Jalappa L.

Fol. **5.** 1. Inula Helenium L. 2. Origanum hirtum Link. 3. Origanum vulgare L.
F. **6.** Amarantus tricolor L.
F. **7.** 1. Amarantus paniculatus L. 2. Leontodon hispidus L. β hastilis L. 3. Silene Otites (L.) Sm.
F. **8.** 1. Amarantus retroflexus L. 2. Celosia cristata L.
F. **9.** 1. Nicotiana Tabacum b) latissima Mill.
F. **10.** 1. Nicotiana Tabacum L. 2. Nicotiana rustica L. 3. Vaccinium Oxycoccus L.
F. **11.** 1. Datura Metel L. 2. Halimus portulacoides Wllr. 3. Dracunculus vulgaris Schott.
F. **12.** 1. Datura Stramonium L. 2. Teucrium montanum L. 3. Linaria purpurea Mill.
F. **13.** Andropogon bicolor Roxb. (= Sorghum vulgare b. bicolor Pers.)

## Tertius Ordo.

Fol. **1.** 1. Solanum tuberosum L. 2. Thymus Serpyllum L. b) citriodorus Schreb. 3. Thymus vulgaris L.
F. **2.** 1. Colocasia antiquorum Schott. 2. Cucurbita ovifera L. 3. Cucurbita Melopepo L.
F. **3.** 1. Cyclamen Coum Mill. 2 u. 3. Lavandula Spica L.
F. **4.** Cyclamen hederaefolium Willd. 2 u. 3. Cyclamen europaeum L.
F. **5.** 1 u. 6. Sternbergia lutea Ker. 2. Scilla autumnalis L. 3. Crocus sativus L. 4. Colchicum crociflorum Anders.
F. **6.** 1. Acis autumnalis Salisb. 2—5. Colchicum autumnale L.
F. **7.** 1. Colchicum variegatum L. 2 u. 3. Colchicum autumnale L. 4. Colchicum speciosum Stev. 5. Colchicum multiflorum Brot. 6. Colchicum arenarium W. K.
F. **8.** 1. Sempervivum arboreum L. 2. Colchicum umbrosum Stev. 3. Colchicum bulbocodioides Bieb.
F. **9.** 1. Paliurus aculeatus Lam. 2 u. 3. Colchicum autumnale L.

## Quartus Ordo.

Fol. **1.** 1. Melocactus communis DC. 2. Anastatica hieruchontica L.
F. **2.** Aloe variegata L.
F. **3.** Agave americana L.
F. **4.** Cynara Scolymus L.
F. **5.** 1 u. 3. Cynara Scolymus L. 2. Cynara humilis L.
F. **6. 7.** Opuntia Ficus indica Mill.

# Zweites Verzeichnis, nach alphabetarischer Reihenfolge der Namen.

Es sind bezeichnet:
Die Plantae als auctumnales mit „a“, als aestivales mit „ae“, als hiemales mit „h“, als vernales mit „v“; die Ordines arborum et fruticum mit „O“, die übrigen Ordines mit römischen Ziffern, die Folia mit der jeweils zuerst stehenden arabischen Ziffer und die Abbildungen mit der oder den darauf folgenden arabischen Ziffern.


**A**butilon Avicennae DC. ae. VI. 10. 1.
Acanthus mollis L. ae. XI. 2. 3.
spinosus L. ae. XI. 1. 1.
Achillaea millefolium L. ae. O. 2. 2 u. 3.
Ptarmica L. ae. XII. 5. 3.
Ageratum L. ae. V. 8. 1.
Acis auctumnalis Salisb. a. III. 6. 1.
Aconitum Anthora L. ae. I. 12. 1.
Lycoctonum L. ae. I. 11. 1.
Napellus L. ae. I. 12. 2.
variegatum L. ae. I. 12. 3.
Acorus Calamus L. v. VIII. 9. 1.
Actaea spicata L. ae. X. 3. 1.
Adonis aestivalis L. ae. V. 11. 3.
auctumnalis L. ae. V. 11. 2.
vernalis L. h. 4. 3.
Agave americana L. a. III. 3.
Agraphis campanulata (Ait.) Lk. v. V. 13. 1.
patula (Desf.) Rchb. v. II. 8. 1.
Agrostemma Githago L. ae. I. 4. 2 u. 3.
Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb. ae. O. 1. 3.
reptans L. v. I. 6. 1.
Alchemilla vulgaris L. v. VI. 10. 2.
Allium Moly L. ae. IV. 11. 1; v. IV. 13. 2.
ursinum L. v. III. 10. 2.
victoriale L. v. IV. 13. 3.
Althaea cannabina L. ae. VI. 3. 1.
Ludwigii L. ae. VI. 4. 2.
officinalis L. ae. VI. 4. 1.
Aloe variegata L. a. IV. 2.
Alyssum montanum L. ae. IV. 2. 2.
Amarantus paniculatus L. a. II. 7. 1.
retroflexus L. a. II. 8. 1.
tricolor L. a. II. 6.
Amberboa erucifolia DC. ae. XI. 4. 1.
Amygdalus communis L. v. O. 6. 3.
Anacyclus officinarum Hayne ae. V. 10. 2.
Anastatica hierochuntica L. a. IV. 1. 2.
Anchusa italica Retz. ae. VIII. 5. 2 u. 3.
officinalis L. ae. VIII. 6. 1.
Andropogon bicolor Roxb. a. II. 13.
Androsaemum officinale All. ae. VIII. 10. 1.
Anemone coronaria L. v. I. 17. 1; v. I. 18. 1.
fulgens Gay. v. I. 17. 2; v. I. 18. 2.
hortensis L. v. I. 17. 3; v. I. 18. 3 u 4.
nemorosa L. v. I. 2. 5; v. I. 3. 1; h. 6. 4.
ranunculoides L. v. I. 3. 2.
silvestris L. v. I. 13. 3.
Anthemis Cotula L. ae. O. 10. 2.
nobilis L. ae. XI. 3. 2.
tinctoria L. ae. XIV. 13. 4.
Anthericus ramosus L. v. VII. 1. 2.
Antirrhinum majus L. ae. I. 9. 2; ae. I. 10.
Orontium L. ae. I. 9. 3.
siculum Ucria. ae. I. 9. 1.
Aquilegia vulgaris L. ae. II. 6. 1 u. 2; ae. II. 7. 2 u. 3; ae. II. 8. 2 u. 3; ae. II. 9. 2 u. 3.
vulgaris β stellata Hort. ae. II. 6. 3; ae. II. 7. 1; ae. II. 8. 1; ae. II. 9. 1.
Argemone mexicana L. ae. XII. 5. 1.
Aristolochia Clematidis L. ae. IV. 3. 2.
rotunda L. ae. IV. 3. 1.
Arnica montana L. ae. XIV. 8. 3.
Artemisia Abrotonum L. ae. I. 16. 3.
Absinthium L. ae. XII. 4. 1.
coerulescens L. ae. XII. 4. 2.
Dracunculus L. ae. I. 16. 2.
pontica L. ae. XII. 4. 3.
Arum maculatum L. v. II. 1. 1 u. 2.
Aruncus silvester Kost. ae. IX. 6. 2.
Asarum europaeum L. v. VI. 9. 2.
Asparagus altilis (L.) Asch. v. IX. 9.
Asphodelus ramosus L. v. IX. 7. 1.
Aster Amellus L. ae. V. 12. 2 u. 3.
Tripolium L. ae. X. 5. 1.
Astrantia major L. ae. IX. 12. 2.

**B**allota Pseudodictamnus Benth. ae. VI. 9. 2.
Bellevalia romana (L.) Rchb. v. II. 11. 2.
Bellis perennis L. v. VII. 4. 1—3; ae. XIII. 1. 2 u 3.
Berberis vulgaris L. v. O. 9. 3.
Bidens cernuus L. ae. V. 8. 2.
Borrago officinalis L. v. VI. 14. 4 u. 5.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. v. O. 3. 3.
Brunella grandiflora (L.) Jacqu. ae. XIII. 13. 3.
vulgaris L. ae. O. 1. 2.
Bulbocodium vernum L. v. II. 1. 3; v. III. 1. 3.
Bupleurum rotundifolium L. ae. IV. 3. 3.
Butomus umbellatus L. v. IX. 4.
Buxus sempervirens O. 1. 1.

**C**alamintha grandiflora Mönch. ae. VII. 7. 1.
Nepeta Clairv. ae. VII. 8. 2.
officinalis Mönch. ae. VII. 7. 2.
Calendula arvensis L. ae. V. 4. 3.
officinalis L. ae. V. 3.
Calla palustris L. v. II. 17. 4.
Calluna vulgaris (L.) Salisb. ae. IX. 3. 1.

Caltha palustris L. v. VII. 5, 1; h. 4. 2.
Calystegia Soldanella R. Br. ae. XIII. 9. 3.
Campanula anchusaefolia Sibth. ae. I. 3. 2 u. 3.
bononiensis L. ae. VI. 1. Nr. 2.
laciniata A. DC. ae. I. 5. I.
medium L. ae. I. 4. I.
patula L. v. O. 5. 3.
persicifolia L. ae. I. 8. 2. u. 3.
pyramidalis L. ae. I. 7. 1.
rapunculoides L. ae. I. 6. 1.
rotundifolia L. ae. XIII. 8. 1.
trachelium L. ae. I. 6. 2 u. 3.
Canna lutea Ait. a. II. 2.
indica L. a. II. 1.
Capparis cynophallophora L. ae. X. 2. 1.
Capsicum annuum L. a. I. 8. 2; a. I. 11. 2.
cordiforme Mill. a. I. 10. 2; a. I. 12; a. I. 13.
conoides Mill. a. VIII. 1.
longum DC. a. I. 6; a. I. 7; a. I. 9.
tetragonum Mill. a. I. 10. I.
Cardamine pratensis L. v. I. 3. 3 u. 4.
Cardiospermum halicacabum L. ae. XIII. 11. 1.
Carduncellus coeruleus DC. ae. XI. 5. 3.
Carduus nutans L. ae. XI. 7. 2.
Carlina acaulis L. ae. XI. 8. 1.
vulgaris L. ae. XI. 8. 3.
Carthamus tinctorius L. ae. XI. 3. 1.
Caryolopha sempervirens L. ae. VIII. 5. 1.
Catananche coerulea L. ae. V. 4. 2.
Celosia cristata L. a. II. 8. 2.
Centaurea Cyanus L. v. VII. 7.
Jacea L. ae. XI. 5. 1 u. 2.
montana L. v. VII. 6. 2.
Centranthus ruber DC. ae. I. 3. 1.
Cephalanthera grandiflora (Scop.) Babingt. v. IX. 5. 2.
Cercis Siliquastrum L. v. O. 3. 1.
Cheirantus Cheirei L. ae. II. 4. 2 u. 3; ae. II. 5; ae. II. 15. 1.
Chenopodium Botrys L. ae. XIII. 2. 3.
Chlora serotina Koch. v. V. 7. 3.
Chrysanthemum coronaria L. ae. V. 6. 2 u. 3.
corymbosum L. ae. V. 4. 1.
leucanthemum L. ae. V. 6. 1.
majus (Desf.) Aschs. ae. VII. 6. 3.
Tanacetum Karsch ae. V. 5. 2 u. 3.
Chrysocoma Linosyris L. ae. I. 14. 1.
Chrysosplenium alternifolium L. h. 6. 5; v. O. 3. 4.
Cicuta virosa L. v. VII. 2. 2.
Circaea lutetiana L. ae. III. 7. 1.
Cirsium canum M. Bieberst. ae. XI. 4. 3.
Cistus monspeliensis L. ae. O. 9. 1.
Citrus Aurantium L. ae. O. 6. 3.
japonica Thnb. ae. O. 6. 1.
medica L. ae. O. 6. 2.
Clematis integrifolia L. ae. XIII. 7. 1.
recta L. ae. XIII. 10. 1.
Vitalba L. ae. VI. 5. 3.
Viticella L. ae. XIII. 7. 2 u. 3; ae. XIII. 10. 2 u. 3.
Cnicus Benedictus L. ae. XI. 8. 2.
Coix Lacryma L. ae. XIII. 6. 1.
Colchicum arenarium W. K. a. III. 7. 6.
autumnale L. a. III. 6. 2—5; a. III. 7. 2 u. 3; a. III. 9. 2 u. 3.
bulbocodioides Bieb. a. III. 8. 3.
Colchicum crociflorum Anders. a. III. 5. 4.
multiflorum Brot. a. III. 7. 5.
speciosum Stev. a. III. 7. 4.
variegatum L. a. III. 7. 1.
Colocasia antiquorum Schott. a. III. 2.
Colutea arborescens L. v. O. 12. 1.
Comarum palustre L. ae. X. 9. 1.
Convallaria majalis L. v. IX. 6. 2 u. 3.
Convolvulus arvensis L. v. VII. 1. 1 (der 3. Zweig).
sepium L. ae. XIII. 9. 1.
Coralliorrhiza innata R. Br. ae. IV. 4. 4.
Cornus mas L. h. 7. 3.
Coronaria tomentosa A. Br. ae. IX. 2; ae. IX. 3. 2 u. 3.
Corydallis cava (L.) Schw. u. K. h. 7. 2; v. I. 2. 4.
Conyza asteroides Wall. ae. V. 8. 3.
Crepis foetida L. ae. IX. 7. 1.
Crocus luteus Lam. h. 2. 2.
sativus L. a. III. 5. 3.
serotinus Salisb. ae. III. 10. 3 u. 4.
variegatus Hyp. et Hsch. h. 3. 2 u. 3.
vernus All. h. 7. 4; v. II. 3. 2 u. 3; v. II. 15. 4.
Cucumis Melo L. a. I. 1. 2 u. 3.
Cucurbita Melopepo L. a. III. 2. 3.
ovifera L. a. III. 2. 2.
Cupressus fastigiata DC. ae. O. 3. 1.
Cyclamen Coum Mill. a. III. 3. 1.
europaeum L. a. III. 4. 2 u. 3.
hederaefolium Willd. a. III. 4. 1.
vernum Rchb. v. VI. 13. 2.
Cynanchum acutum L. ae. XIII. 9. 2.
Cynara Carduuculus L. ae. XI. 6.
humilis L. a. IV. 5. 2.
Scolymus L. a. IV. 4; a. IV. 5. 1.
Cynoglossum montanum L. ae. VIII. 6. 3.
officinale L. ae. VIII. 6. 2.
Cypripedium Calceolus L. v. VIII. 6. 1.
Cytisus alpinus Mill. v. O. 7. 2.
Laburnum L. v. O. 7. 1.
nigricans L. v. O. 12. 3.
ratisbonensis Schaeff. v. O. 10. 3.
sessilifolius L. v. O. 10. 2.
supinus L. v. O. 11. 2.
Czackia Liliastrum Andrz. v. IX. 6. 1.

Daphne Mezereum L. h. 7. 1.
Datura Metel L. a. II. 11. 1.
Stramonium a. II. 12. 1.
Delphinium Ajacis L. ae. II. 11. 2 u. 3; ae. 12. 2 u. 3.
Consolida L. ae. II. 11. 1; ae. II. 12. 1; ae. II. 13. 1; ae. II. 14. 1.
elatum L. ae. I. 11. 2.
orientale Gay. ae. II. 13. 2; ae. II. 14. 2.
Dentaria bulbifera L. ae. VII. 12. 2.
Dianthus barbatus L. ae. IX. 4.
Carthusianorum L. ae. XIV. 14. 1.
Caryophyllus L. ae. XIV. 4 u. 5; ae. XIV. 6. 1; ae. XIV. 7. 1; ae. XIV. 8. 1; XIV. 9—11.
plumarius L. ae. XIV. 12. 2 u. 3; ae. XIV. 14. 2 u. 3.
prolifer L. ae. XIV. 13. 2.
Seguerii Vill. ae. III. 1. 2.
silvestris Wulf. ae. XIV. 12. 1.
superbus L. ae. XIV. 13. 1.

Dictamnus Fraxinella Pers. v. IX. 5. 1.
Digitalis ambigua Murr. ae. I. 1. 3.
purpurea L. ae. I. 1. 2.
Thapsi L. ae. I. 2. 1 u. 2.
Doronicum Pardalianches L. v. I. 5. 1.
Dracocephalum austriacum L. v. VII. 6. 3.
Moldavica L. ae. VII. 1. 3; ae. VII. 2. 2.
Dracunculus vulgaris Schott. ae. IV. 1; a. II. 11. 3.
Drosera rotundifolia L. ae. XIV. 8. 2.

Ecbalium agreste Rchb. ae. XII. 1. 1.
Echinops sphaerocephalus L. ae. XI. 7. 1.
Epilobium augustifolium L. ae. I. 8. 1.
Epipactis latifolia Rchb. ae. IV. 5. 1.
Eranthis hyemalis Salisb. h. 5. 3.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. v. I. 8. 1.
moschatum L. v. I. 10. 1.
Eryngium amethystinum L. ae. XI. 8. 4.
planum L. ae. XI. 10. 1.
maritimum L. ae. XI. 9. 1.
Erysimum hieracifolium L. ae. II. 15. 2.
Erythraea Centaurium (L.) Pers. v. V. 8. 2 u. 3.
Erythronium Dens canis L. v. I. 1. 2 u. 3.
Euphrasia officinalis L. ae. 13. 3 u. 4.

Fragaria elatior Ehrh. v. VII. 8. 3.
grandiflora Ehrh. v. VII. 8. 1.
vesca L. v. VII. 8. 2.
Fritillaria Meleagris L. v. III. 8. 2 u. 3; v. III. 10. 1.
messanensis Rafin. v. III. 9. 2.
montana Hypp. v. III. 8. 1.
persica L. v. V. 4. 1.
pyrenaica L. v. III. 9. 3.
ruthenica Wickstr. v. III. 7. 1.
tenella M. B. v. III. 9. 1.
Fumaria parviflora Lmk. v. I. 11. 3.

Gagea minima (L.) Schult. v. II. 7. 1.
Galanthus nivalis L. h. 1. 2 u. 3.
Gagea officinalis L. ae. X. 12. 2 u. 3.
Gentiana ciliata L. a. II. 3. 2.
cruciata L. v. VIII. 8. 3.
germanica Willd. a. II. 3. 3.
Pneumonanthe L. ae. VII. 11. 2.
verna L. VII. 5. 3.
Genista tinctoria v. 12. 3.
Geranium macrorhizon L. v. I. 16. 2.
maculatum L. v. I. 9. 1.
palustre L. v. I. 9. 2.
pratense L. v. I. 8. 2 u. 3.
reflexum v. I. 10. 2.
rotundifolium L. v. I. 10. 3.
sanguineum L. v. I. 16. 1.
tuberosum L. v. I. 16. 3.
Geum rivale L. v. I. 5. 2.
Gladiolus byzantinus Mill. ae. IV. 10. 3 u. 4.
cardinalis Curt. ae. IV. 12.
communis L. ae. IV. 10. 2.
Glaucium luteum Sm. ae. XIII. 6. 1.
Globularia vulgaris L. ae. IV. 2. 3.
Gnaphalium dioicum L. v. III. 16. 2 u. 3.
margaritaceum L. ae. V. 9. 1.
Goodyera repens (L.) R. Br. ae. IV. 5. 6.
Gratiola officinalis L. v. VI. 15. 2.
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. v. V. 11. 3 u. 4; ae. IV. 5. 2.

Halimus portulacoides Wllr. a. II. 11. 2.
Hedysarum coronarium L. ae. XIII. 2. 1.
Helianthemum Chamaecistus Mill. ae. XI. 9. 2 u. 3.
Helianthus annuus L. ae. V. 1.
multiflorus L. ae. V. 2.
Helichrysum orientale Gaertn. ae. VII. 12. 1; ae. XII. 5. 2.
Helleborus fötidus L. h. 3. 1.
niger L. h. 1. 1.
viridis L. h. 2. 1.
Hemerocallis flava L. v. IX. 5. 3.
fulva L. v. IX. 8. 1.
Hepatica triloba Gil. v. II. 3. 4 u. 5; v. II. 2. 1 u. 2.
Hesperis matronalis L. v. VIII. 3. 2 u. 3.
Hibiscus Sabdariffa L. ae. VI. 1. 1.
syriacus L. ae. O. 10. 1; ae. O. 11.
Trionum L. ae. VI. 2. 1.
Hieracium aurantiacum L. ae. I. 2. 3.
umbellatum L. ae. XII. 1. 2.
Hyacinthus amethystinus L. v. II. 8. 5.
convallarioides Thunb. v. II. 8. 2; v. II. 17. 2.
non scriptus L. v. II. 8. 3 u. 4.
orientalis L. v. II. 4; v. II. 5. 1, 2 u. 3; v. II. 6. 2 u. 3; v. II. 7. 2 u. 3; v. II. 14. 1 u. 4; v. II. 15. 1 u. 2.
pallens M. Bieb. v. II. 12. 2 u. 3.
revolutus Thunb. v. II. 15. 3.
romanus L. v. II. 14. 2, 3 u. 5.
Hyoscyamus albus L. ae. VIII. 8. 2.
niger L. ae. VIII. 8. 1.
Hypericum hircinum L. ae. VIII. 10. 2.
quadrangulum L. ae. VIII. 10. 3.
Hyssopus officinalis L. ae. XI. 10. 2—4.

Jasione montana L. v. V. 12. 2.
Jasminum fruticans L. v. O. 11. 4.
grandiflorum L. ae. O. 13. 1.
odoratissimum L. ae. XI. 2. 2.
officinale L. ae. XI. 2. 1.
Iberis umbellata L. ae. VII. 11. 2 u. 3.
Impatiens Balsamina L. a. I. 4. 1.
Noli tangere L. ae. V. 5. 1.
Inula Helenium L. a. II. 5. 1.
Iris florentina L. v. VIII. 4. 2.
fötidissima L. v. VIII. 8. 1.
germanica L. v. VIII. 5. 2 u. 3.
graminea L. v. V. 4. 3; v. VIII. 3. 1.
juncea Poir. ae. III. 4. 2; ae. III. 10. 1; ae. IV. 6. 2.
lurida Soland. v. VIII. 5. 1.
lusitanica Ker. ae. IV. 9. 2 u. 3.
pallida Lam. v. VIII. 4. 3.
Pseudacorus L. v. VIII. 7. 3.
pumila L. v. VIII. 1. 1, 2 u. 4; v. VIII. 2.
reticulata Adam. ae. IV. 6. 3.
sambucina L. v. VIII. 7. 1.
sibirica L. ae. III. 4. 3.
squalens L. v. VIII. 7. 2.
Susiana L. v. VIII. 4. 1.
syrtica Viv. ae. IV. 8. 2 u. 3; ae. IV. 11. 2 u. 3.
tristis Rchb. v. VIII. 1. 3.

Iris tuberosa L. v. V. 4. 2.
variegata L. v. VIII. 6. 2 u. 3.
Xiphium L. ae. IV. 10. 1.
xiphioides Ehrh. ae. IV. 7. 1; ae. IV. 8. 1; ae. IV. 9. 1.

Knautia arvensis (L.) Coult. ae. IX. 8. 3.

Lathraea Squamaria L. v. I. 1. 1.
Lathyrus Cicera L. ae. VI. 10. 2 u. 3.
latifolius L. ae. XIII. 6. 2.
sativus L. ae. VI. 10. 2 u. 3.
silvester L. ae. XIII. 6. 3.
tuberosus L. ae. XIII. 5. 5.
variegatus Tn. v. I. 6. 2.
Laurus nobilis L. v. O. 6. 2.
Lavandula Spica L. ae. XIV. 6. 2 u. 3; a. III. 3. 2 u. 3.
Lavatera arborea L. ae. VI. 6.
thuringiaca L. ae. VI. 5. 2.
Leontine Leontopetalon L. ae. IV. 2. 1.
Leontodon hispidus L. a. II. 7. 2.
Leucojum aestivum v. III. 17. 3; v. IV. 10. 2.
vernum h. 1. 4 u. 5.
Ligustrum vulgare L. v. O. 13. 2.
Lilium bulbiferum L. v. V. 7. 1 u. 2.
candidum L. v. V. 9. 1; v. V. 10. 1.
carniolicum Bernh. v. V. 9. 2.
chalcedonicum L. ae. III. 5. 1 u. 2; ae. III. 10. 2.
croceum Choix v. V. 5. 1; v. V. 6.
Martagon L. ae. III. 1. 1; ae. III. 2; ae. III. 3; ae. III. 6; ae. III. 7. 2 u. 3.
pomponium L. ae. III. 4. 1; ae. III. 8. 1.
spectabile Fisch. v. IV. 8. 1.
superbum L. ae. III. 9. 2 u. 3.
Linaria alpina DC. ae. O. 14. 2.
Cymbalaria (L.) Mill. ae. VI. 5. 2.
genistaefolia Mill. ae. I. 14. 2.
purpurea Mill. a. II. 12. 3.
vulgaris Mill. ae. I. 14. 3.
Linum alpinum Jacq. ae. O. 13. 1.
austriacum L. ae. I. 13. 1.
Lonicera alpigena L. v. O. 9. 1.
Caprifolium v. IX. 4. 2.
Periclymenum L. v. IX. 4. 3.
Xylosteum L. v. O. 9. 2.
Lotus corniculatus L. v. O. 11. 1.
Lunaria annua L. v. I. 7. 2.
rediviva L. v. I. 7. 1.
Lupinus albus L. ae. XIII. 4. 2.
hirsutus L. ae. XIII. 4. 1.
luteus L. ae. XIII. 3. 3.
nanus Dougl. ae. XIII. 3. 2.
varius L. ae. XIII. 3. 1.
Lychnis chalcedonica L. ae. IX. 5.
flos cuculi L. ae. IX. 7. 2.
Lycopersicum esculentum Mill. a. I. 1 u. 2.
Lycopodium clavatum L. ae. VIII. 12. 2.
Lysimachia Nummularia L. ae. XII. 2. 3.
punctata L. ae. X. 7. 1.
vulgaris L. ae. X. 6. 3.
Lythrum Salicaria L. ae. X. 7. 2.

Majanthemum bifolium (L.) Schm. v. O. 3. 2.
Malcolmia maritima Br. ae. O. 10. 3.
Malva Alcea L. ae. VI. 3. 2.
crispa L. ae. VI. 9. 1.
rosea Cav. ae. VI. 7 u. 8.
Mandragora vernalis Bertol. v. IX. 1. 1.
Marrubium candidissimum L. ae. VII. 6. 2.
peregrinum L. ae. VI. 9. 3.
vulgare L. ae. VII. 6. 1.
Matricaria Parthenicum (L.) Pers. ae. V. 7. 1 u. 2.
Matthiola annua S. ae. II. 1—3.
fenestralis R. Br. ae. II. 4. 1.
incana R. Br. ae. II. 1—3.
Medicago arborea L. v. O. 12. 2.
Melampyrum pratense L. ae. XII. 2. 2.
Melandrium rubrum (Weig.) Gke. ae. IX. 1; v. I. 6. 3.
Melia Azedarach L. ae. O. 2. 1.
Melilotus coeruleus (L.) Descr. ae. X. 10. 1.
officinalis (L.) Descr. ae. X. 12. 1.
Melissa officinalis L. ae. VII. 1. 2.
Melittis Melissophyllum L. v. VI. 7. 3.
Melocactus communis DC. a. IV. 1. 1.
Mentha gentilis L. ae. 3. 3.
nepetoides Lej. ae. VII. 3. 2.
piperita L. ae. VII. 5. 1.
Pulegium L. ae. I. 15. 2.
silvestria L. ae. VII. 2. 1; ae. VII. 5. 3.
Menyanthes trifoliata L. v. VII. 1. 3.
Mirabilis Jalappa L. a. II. 3. 1; a. II. 4.
Moluccella laevis L. ae. VII. 2. 1.
spinosa L. ae. VII. 1. 1.
Momordica Balsamina L. a. I. 4. 2.
Muscari botryoides W. v. II. 2. 5; v. II. 13. 1; v. III. 1. 4 u. 5.
comosum Mill. v. II. 17. 1.
moschatum Willd. v. II. 10. 2 u. 3; v. II. 13. 2.
racemosum W. v. II. 10. 1.
Myagrum perfoliatum L. ae. X. 8. 1.
Mycogalum nutans Lk. v. II. 12. 1.
Myosotis intermedia Lk. ae. XI. 1. 3.
palustris (L.) With. ae. XI. 1. 2.
Myrtus communis L. ae. O. 12.

Narcissus aurantius Schult. v. III. 13. 2.
bicolor Salisb. v. II. 2. 3.
biflorus Curt. v. III. 2. 3.
Bulbocodium L. v. III. 4. 4.
cuneiflorus Salisb. v. III. 5. 4.
dubius Gouan. v. III. 12. 3.
intermedius Lois. v. III. 4. 3.
Jonquilla L. v. III. 3. 3; v. III. 4. 1; v. III. 17. 1.
juncifolius Requ. v. III. 4. 2.
major Curt. v. III. 6. 2.
minor L. v. III. 1. 2.
moschatus L. v. II. 2. 4.
niveus Lois. v. III. 11. 2 u. 3.
odorus L. v. III. 7. 2.
patulus Lois. v. III. 2. 2.
poeticus Lois. v. III. 2. 1; v. III. 3. 1.
polyanthus Lois. v. III. 12. 1 u. 2.
Pseudonarzissus L. v. III. 1. 1; v. III. 3. 2; v. III. 5. 1—3; v. III. 7. 3.
radiiflorus Salisb. v. IV. 10. 3.
Sabini Lindl. v. III. 6. 1.
serratus Haw. v. III. 6. 3.
stellatus DC. v. III. 11. 1.
Tazetta L. v. III. 14. 1 u. 2; v. III. 15.
tenuifolius Salisb. v. III. 13. 4.
tortuosus Haw. v. III. 13. 3.
triandrus L. v. III. 13. 1.

Neottia Nidus avis (L.) Rich. ae. IV. 4. 3.
Nepeta Cataria L. ae. VII. 4. 3.
Nepetella L. ae. VII. 4. 1.
nuda L. ae. VII. 4. 2.
Nerium Oleander L. ae. O. 4. 1; ae. O. 5.
Nicandra physaloides Gaertn. ae. XIII. 11. 3.
Nicotiana rustica L. a. II. 10. 2.
Tabacum L. a. II. 9; a. II. 10. 1.
Nigella damascena L. ae. II. 10. 2 u. 3.
hispanica L. ae. II. 10. 1.
sativa L. ae. II. 16. 1.
Nigritella angustifolia Rich. ae. IV. 5. 5.
Nuphar luteum (L.) Sm. v. VII. 3. 3.
Nymphaea alba L. v. VII. 3. 1 u. 2.

Ocimum Basilicum L. ae. O. 4. 2 u. 3; ae. VII. 9. 1; ae. VII. 10. 1 u. 2; ae. XIV. 2. 2 u. 3.
minimum L. ae. VII. 10. 3.
Omphalodes verna Mönch. h. 4. 1.
Onobrychis viciaefolia Scop. ae. XIII. 2. 2.
Ononis arvensis L. syst. ae. X. 2. 2.
Natrix L. ae. X. 1. 2; X. 2, 1.
spinosa L. ae. X. 2. 3.
Ophioglossum vulgatum L. v. VI. 7. 2.
Ophrys Arachnites Reich. ae. IV. 6. 1.
Opuntia Ficus indica Mill. a. IV. 6.
Orchis coriophora L. v. IX. 7. 2.
fusca Jaqu. ae. IV. 4. 1.
incarnata L. ae. IV. 5. 3.
latifolia L. ae. III. 8. 2 u. 3; v. II. 9. 3; v. II. 17. 3.
ustulata L. v. II. 9. 2.
Origanum hirtum Link. a. II. 5. 2.
Majorana L. ae. O. 13. 2; a. I. 5. 2.
vulgare L. a. II. 5. 3.
Orlaya grandiflora Hffm. v. VIII. 8. 2.
Ornithogalum corymbosum R. et P. v. V. 12. 1.
latifolium Jaqu. v. V. 14. 2.
longebracteatum Jacqu. v. V. 14. 3.
pyramidale Jacqu. v. V. 11. 1.
sulphureum Bert. v. V. 11. 2.
umbellatum L. v. II. 6. 1; v. II. 11. 3.
Orobanche caryophyllacea Sm. v. VII. 2. 1.
Oxalis Acetosella L. v. VI. 1. 2.
corniculata L. v. VI. 1. 3.

Paeonia albiflora Pall. v. VI. 13. 1.
anomala L. v. VI. 7. 1.
corallina L. v. VI. 14. 1—3; v. VI. 11. 1.
officinalis L. v. VI. 12. 1; v. VI. 10. 1; v. VI. 8. 1.
peregrina Mill. v. VI. 9. 1; v. VI. 15. 1.
Palinurus aculeatus Lam. a. III. 9.
Pancratium illyricum L. v. III. 16. 1.
Papaver Rhoeas L. ae. XII. 7. 1.
somniferum Gmel. ae. XII. 7. 2; ae. XII. 8; ae. XII. 9. 2 u. 3; ae. XII. 10.
Paris quadrifolius L. ae. I. 1. 1.
Parnassia palustris L. ae. VIII. 11. 1.
Petasites albus (L.) Gaertn. h. 5. 2.
officinalis Mnch. h. 5. 1.
Petilium imperiale Jaume. v. V. 1, 2 u. 3.
Pharbitis hederacea Choisy. ae. XIII. 8. 3.
purpurea (L.) Asch. ae. XIII. 8. 2.
Philadelphus coronarius L. v. O. 2. 3.
speciosus Schrad. v. O. 2. 2.
Physalis Alkekengi L. ae. XIII. 11. 2.
Pinus excelsa (Lmk.) Lk. v. O. 4. 3.
Pirola rotundifolia L. ae. V. 11. 1.
uniflora L. v. VI. 12. 2.
Pirus Malus L. v. O. 5. 1.
Pistacia trifolia L. v. O. 6. 1.
Pisum sativum L. ae. XIII. 5. 6.
Plantago Coronopus L. ae. VII. 8. 3.
major L. ae. O. 7. 2 u. 3.
Platanthera bifolia (L.) Rchb. v. VII. 6. 1; ae. IV. 5. 4.
Platycapnos spicata Bernh. v. IX. 7. 3.
Polemonium coeruleum L. ae. IX. 11. 2 u. 3.
Polygala Chamaebuxus L. v. VI. 12. 3.
vulgaris L. v. VI. 11. 2 u. 3.
Polygonatum multiflorum (L.) All. v. V. 13. 2.
officinale All. v. V. 13. 2.
verticillatum L. ae. IV. 7. 2.
Polygonum Bistorta L. v. IX. 2. 1.
Portulaca oleracea L. ae. XII. 3. 1.
Potentilla caulescens L. v. VII. 6. 4.
recta L. ae. X. 9. 2.
silvestris Neck. ae. X. 9. 3.
splendens Ram. ae. X. 9. 3.
Preslia cervina Frcs. ae. I. 15. 3.
Primula acaulis v. I. 1. 5; v. I. 5. 3.
Auricula L. v. I. 2. 1, 2 u. 3.
elatior (L.) Jacqu. v. I. 5. 4.
farinosa L. v. VII. 4. 4 u. 5.
officinalis (L.) Jacqu. h. 4. 5.
Prunus Armeniaca L. ae. O. 8. 3.
Cerasus L. v. O. 4. 1.
Padus L. v. O. 4. 2.
Psoralea bituminosa L. ae. X. 11.
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. ae. V. 12. 1.
Pulmonaria officinalis L. v. I. 1. 4.
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. h. 6. 3.
vulgaris Mill. h. 6. 2.
Punica Granatum L. ae. O. 7; ae. O. 8. 1; ae. O. 9. 2.

Ranunculus acer L. v. I. 13. 2.
aconitifolius L. v. I. 12. 1.
asiaticus L. v. I. 15.
auricomus L. v. I. 14. 3.
bulbosus L. v. I. 12. 3.
Ficaria L. v. IX. 1. 2.
illyricus L. v. I. 13. 1.
lanuginosus L. v. I. 14. 2.
repens L. v. I. 14. 1; ae. VI. 2. 2 u. 3.
Reseda alba L. ae. I. 16. 1.
Luteola L. ae. I. 15. 1.
Rhus Cotinus L. ae. O. 9. 3.
Ribes alpinum L. v. O. 14. 1.
nigrum L. v. O. 14. 3.
rubrum L. v. O. 14. 2, 4 u. 5.
Ricinus communis ae. VIII. 11. 1; ae. VIII. 12. 1.
Rosa alba v. VI. 3. 1 u. 2.
canina L. v. VI. 6. 1.
centifolia L. v. VI. 2. 1 u. 2.
cinnamomea L. v. VI. 5. 2.
gallica L. v. VI. 1. 1; v. VI. 2. 3; v. VI. 3. 3 u. 4; v. VI. 4.
lutea Mill. v. VI. 2. 4; v. VI. 5. 1.
pimpinellifolia DC. v. VI. 5. 4.
pumila Ait. v. VI. 6. 4.
reversa W. K. v. VI. 6. 3.
tomentosa Sm. v. VI. 6. 2.
turbinata Ait. v. VI. 5. 3.

**Rosmarinus** officinalis L. ae. XII. 1. 3.
**Rumex** vesicarius L. v. VI. 15. 3.
**Ruscus** aculeatus L. v. O. 2. 1.
Hypoglossum L. v. IX. 3. 1.

**Salvia** Aethiopis L. ae. VIII. 3.
glutinosa L. ae. VIII. 4.
officinalis L. ae. VIII. 1. 1 u. 2.
pratensis L. v. IX. 2. 2 u. 3.
Sclarea L. ae. VIII. 2. 1.
silvestris L. ae. VIII. 1. 3.
syriaca L. ae. VIII. 2. 2.
**Sanicula** europaea L. v. VI. 10. 3.
**Santolina** Chamae-Cyparissius L. ae. XIV. 7. 3.
**Saponaria** officinalis L. ae. IX. 12. 1.
**Sarothamnus** scoparius (L.) Koch. v. O. 11. 3.
**Satureja** hortensis L. ae. XII. 3. 3.
**Saxifraga** Cotyledon L. ae. V. 10. 1.
rotundifolia L. v. IX. 3. 3.
**Scabiosa** alpina L. ae. IX. 8. 1.
atropurpurea L. ae. IX. 9. 1 u. 2.
columbaria L. ae. IX. 9. 2 u. 3.
lucida Vill. ae. IX. 9. 3.
stellata L. ae. IX. 8. 2; ae. IX. 9. 1.
**Scilla** amoena L. v. II. 1. 4.
auctumnalis L. ae. III. 5. 3; a. III. 5. 2.
bifolia L. v. II. 5. 4.
byzantina Poir v. II. 13. 3.
italica L. v. II. 11. 1.
peruviana L. v. II. 9. 1.
**Scorzonera** hispanica L. ae. IX. 6. 1.
**Sedum** acre L. ae. XIII. 5. 3.
arboreum L. a. III. 8.
mite Gil. ae. XIII. 5. 4.
villosum L. ae. XIII. 5. 2.
**Sempervivum** montanum L. v. VI. 8. 2.
tectorum L. ae. XIII. 5. 1.
**Senecio** Cineraria DC. ae. V. 9. 2.
Doria L. v. IX. 8. 2.
sarracenicus L. ae. X. 6. 1.
**Serratula** tinctoria L. ae. XI. 4. 2.
**Sinapis** alba L. ae. X. 8. 2.
**Silene** Armeria L. ae. I. 7. 2 u. 3.
noctiflora L. ae. VII. 12. 3.
nutans L. ae. I. 5. 3.
Otites (L.) Sm. a. II. 7. 3.
venosa (Gil) Aschs. ae. I. 5. 2.
**Solanum** aethiopicum L. a. I. 5. 1.
Dulcamara L. ae. II. 16. 2 u. 3.
Melongena L. a. I. 3.
pseudocapsicum L. ae. 14. 1.
tuberosum L. a. III. 1. 1.
**Solidago** Virga aurea L. ae. X. 6. 2.
**Sparganium** ramosum Huds. v. VII. 2. 3.
**Spartium** junceum L. ae. O. 3. 2.
**Specularia** Speculum (L.) A. DC. v. VII. 1. 1. (der 1. u. 2. Zweig.)
**Stachys** palustris L. ae. X. 7. 3.
**Staphylaea** pinnata L. v. O. 8. 1.
**Statice** sinuata L. ae. VII. 8. 1.
**Sternbergia** lutea Ker. a. III. 5. 1 u. 6.
**Suaeda** maritima (L.) Dumort. ae. VI. 1. 3.
**Symphitum** officinale L. ae. VIII. 7.
**Syringa** vulgaris L. v. O. 1. 2 u. 3.

**Tagetes** erectus L. ae. XIV. 1; ae. XIV. 2. 1.
patulus L. ae. XIV. 3.
**Terminalia** Catappa L. ae. O. 8. 2.
**Tetragonolobus** purpureus Mnch. ae. XIII. 4. 3.
**Teucrium** Chamaedrys L. v. VIII. 9. 3.
flavum L. ae. VII. 11. 1.
montanum L. a. II. 12. 2.
Scordium L. v. VIII. 9. 2.
**Thalictrum** aquilegifolium L. v. I. 11. 1 u. 2.
**Thuja** occidentalis L. ae. O. 1. 1.
**Thymus** capitatus Hoffm. et Link. ae. XII. 3. 2.
Mastichina L. ae. XIV. 7. 2.
Serpyllum L. a. III. 1. 2.
vulgaris L. a. III. 1. 3.
**Tithymalus** Lathyris (L.) Scop. ae. XII. 2. 1.
**Tordilion** syriacum L. ae. XII. 9. 1.
**Tragopogon** porrifolius L. ae. I. 13. 2 u. 3.
**Trichonema** cruciatum Ker. h. 2. 3.
**Trifolium** incarnatum L. ae. X. 10. 2.
rubens L. ae. X. 10. 3.
**Trollius** asiaticus L. v. I. 12. 2.
**Tropaeolum** majus L. ae. XIII. 1. 1.
**Tulipa** Clusiana DC. v. IV. 12. 2 u. 3.
Gesneriana L. v. IV. 1—3; v. IV. 4—8; IV. 12. 1.
media Agardh. v. IV. 9. 2.
Oculus Solis St. Amand. v. IV. 11.
praecox Ten. v. IV. 10. 1.
pubescens Willd. v. IV. 5—8 (teilweise).
silvestris L. v. III. 17. 2.
stellata Hook. v. IV. 13. 1.
turcica Roth. v. IV. 9. 1—3.
**Tussilago** Farfarus L. h. 6. 1.

**Ulmaria** Filipendula (L.) A. Br. ae. X. 3. 2.
**Urginia** Scilla Steinh. v. II. 3. 1.
**Uropetalum** hyacinthoides Spr. v. V. 14. 1.
serotinum Gawl. v. II. 16. 1.
**Urtica** pilulifera L. ae. VII. 5. 2.

**Vaccinium** Oxycoccus L. a. II. 10. 3.
**Valeriana** officinalis L. ae. IX. 12. 3.
Phu L. ae. IX. 11. 1.
**Veratrum** album L. ae. VIII. 9. 1.
nigrum L. ae. VIII. 9. 2.
**Verbascum** Blattaria L. ae. X. 4. 1 u. 2.
Lychnitis L. ae. X. 5. 3.
nigrum L. ae. X. 4. 3.
Thapsus L. ae. X. 5. 2.
**Veronica** latifolia L. v. V. 10. 2.
**Viburnum** Opulus L. v. O. 10. 1.
**Vinca** major L. v. IX. 4. 1.
minor L. v. O. 8. 2—5.
**Viola** canina L. v. VII. 5. 2.
hirta L. v. I. 4. 4 u. 5.
persicifolia Schreb. v. V. 5. 2 u. 3.
odorata L. v. I. 4. 1—3.
tricolor L. h. 4. 4; v. II. 16. 2 u. 3; ae. XII. 6. 2 u. 3.
**Viscaria** viscosa (Gil.) Aschs. v. O. 5. 2.

Bearbeitet von M. Britzelmayr.




# HORTVS EYSTETTENSIS,

SIVE

DILIGENS ET ACCVRATA OMNIVM PLANTARVM, FLORVM, STIRPIVM, EX VARIIS ORBIS TERRÆ PARTIBVS, SINGVLARI STVDIO COLLECTARVM, QVÆ IN CELEBERRIMIS VIRIDARIIS ARCEM EPISCOPALEM IBIDEM CINGENTIBVS, OLIM CONSPICIEBANTVR DELINEATIO ET ADVIVVM REPRÆSENTATIO

CVRIS

REVERENDISSIMI ET CELSISSIMI EPISCOPI AC S.R.I. PRINCIPIS IOANNIS ANTONII I.

MDCCXIII.

# SPECTATORI ET LECTORI

HOrti Eyſtettenſis, Auſpicijs Reverendiſſimi & Celſiſſimi Epiſcopi ac S. R. I. Principis JOANNIS CONRADI, ad Arcis Wilibaldinæ, antiquæ Epiſcoporum Aureatenſium Sedis pedem olim exſtructi, ac ſubinde Æri nitidiſſimè inciſas denuò exhibemus Effigies, Plantarum nempe, Florum ac Stirpium ſplendidiſſimo iſthoc in Viridario, ſed temporum, prô dolor! bellíque injurijs jam dudum devaſtato ac penitus deſtructo, amœniſſimè florentium: Librum, inquam, qua forma, qua figurarum varietate, nitore ac Multitudine ampliſſimum, atque ſuo in genere facilè principem, qui, auſpice prædicto Principe, atque accurante (utinam ita loqui fas eſſet) BASILIO BESLERO Pharmacopolâ Norimbergenſi, Horti, cùm exiſteret, non ultimam, atque Libri quoque hujus præcipuam curam gerente in lucem prodijt, jlluſtrior certè factus, ſi feliciori Sidere editus, & peritiorem ac fideliorem Proxenetam nactus fuiſſet, quàm qui Horto excolendo, eidémque inſerendis, rigandis, fovendis, conſervandis & augendis quibusvis, rarioribus maximè ac peregrinis herbis aptior forſan exſtitit, quàm ijs deſcribendis fuit is ipſe BESLERUS: Ejus enim inſcitiæ debentur Deſcriptiones meliori JUNGERMANNI ſcientiæ, neſcio quo fato, denegatæ; quas, licèt Artis peritorum calculo minus exquiſitas, ac hodiernæ Methodo minimè adæquandas, & vel ideo ſecunda in Editione Eyſtettenſi omiſſas, figuris tamen hisce noſtris denuo reſtituere & annectere, quàm eas ſolo nomine inſignitas relinquere maluimus, ſaltem non omninò inutiles. Exquiſitam verò, & fortaſſe curioſius quàm utilius ab aliquibus deſideratam de ſitu, forma, & amplitudine Horti hujus, Arcem Epiſcopalem cùm cingeret, longè floridiſſimi inſuper enarrare hiſtoriam vel ideo etiam omittimus; ne una cum Horto vetuſtate potiſſimùm obliteratas illorum temporum Calamitates triſtem in Memoriam revocare cogamur, qui aliquam ſaltem libri hujus, aliena etiam laude & commendatione nunquam non magni facti, atque variarum cumprimis ejus editionum rationem damus.

Auſpicijs is nempe primis prodijt ſub Annum 1612. JOANNI CONRADO Eccleſiæ Eyſtettenſis Epiſcopo ac Principi prolixa Dedicatione inſcriptus, præfixo BESLERI nomine, aſt non niſi Anno 1613. atque ita defuncto interea Principe, publicum in conſpectum productus eſt integer, ab inclyto Medicorum Norimbergenſium Collegio, non ultimam in BESLERI laudem, ornatus prooemio, quem ſubinde ipſiſſimum, famæ certè & lucri gratiâ, titulis, dedicationibus, præfationibus & præfixa etiam BESLERI effigie aliquoties diverſum apparuiſſe ſcimus, licèt fortaſſis novô quoque prelô deinde recuſum non negemus, diutius nempe uſurpatis tabulis noſtris, quadriennem in uſum BESLERO tantum conceſſis, atque ijs poſt ſedecim demum annos, imò & tum quoque non niſi ægerrimè nobis reſtitutis. Ne verò Horti noſtri memoria omnis poſteritati efflueret, redeunte interea temporum tranquillitate, curis ſecundis Reverendiſſimi & Celſiſſimi Eccleſiæ Aureatenſis Epiſcopi, S. R. I. Principis, atque in Comitijs Ratisbonenſibus Principalis Comiſſarij Cæſarei MARQUARDI II. id ipſũ opus 1640. publicam denuo, deſcriptionibus tamen, quas (ut expreſſis in ejus Præfatione verbis utar) alij parum ſinceras, alij parum ſcitas, nec ſeculi hujus impatientiæ ſuffecturas exiſtimarunt, penitùs omiſſis, in lucem emiſſum eſt. Cumque huic, hac noſtra etiam ætate, multiplici ſub reſpectu, nullum facilè aſſimilandum veniat; tandem etiam præſens curis Reverendiſſimi & Celſiſſimi Eyſtettenſis Epiſcopi, ac S. R. I. Principis JOANNIS ANTONII I. ſub Annum 1712. potiſſimùm recuſum, Iſto tamen in vivis exiſtente nec completum eſt. Quod itaque, plurimorum utpote votis concupitum, omnibus jam numeris abſolutum, ac primo, ſive Magnitudinẽ formæ, ſive figurarum nitorem reſpicias, per omnia ſimillimum tandem repræſentamus, ſpeciale ſcilicet ad Mandatum Eccleſiam Eyſtettenſem fortunatiſſimè & glorioſiſſimè modò gubernantis Epiſcopi, S. R. I. Principis ac Domini, Domini noſtri Clementiſſimi JOANNIS ANTONII II. Quem, ut DEus T. O. M. poſt Solennia Eccleſiæ Eyſtettenſis, peractis ab ejus origine Mille, atque Reverendiſſimi & Celſiſſimi ejusdem Antiſtitis quinquaginta Sacerdotij Annis, Maximo omnium Applauſu celebrata, in longam Annorum ſeriem incolumem ac feliciſſimè regnantem ſervare velit, eà, qua par eſt, Reverentiâ ac Submiſſione ardentiſſimis ac devotiſſimis Votis fideles precantur Subditi, queis, Munere quoque id exigente, ſua jungit ſinceriſſima, ſimul atque Horti ſeu Libri noſtri Spectatorem & Lectorem quàm optimè valere cupit, Reverendiſſimo & Celſiſſimo Epiſcopo, Principi ac Domino ſuo Clementiſſimo ſingulari Devotione obſtrictiſſimus

*I. G. STHENANDER,*
*P. & M. D. C. A.*
*& ARCHIATER.*

# ORDO
# COLLECTARUM
# ARBORUM
ET
# FRUTICUM
# VERNALIUM.



III. *Syringa flo: lacteo.*

I. Buxus.

II. *Syringa flore cœruleo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

BUxus. Ætatis grandioris adminiculo etiam caudices, craſſitudine cruris humani amplitudinem ſuperantes, adipiſcitur, & ſalicum quarundam proceritatem: crebris & denſè confertis conſtat ramis, exteriùs ſubnigricantibus, interiùs luteo palleſcentibus: ligni materies dura eſt, & Operibus tornatilibus accommoda; folia frequentia ramis inſident, craſſa, ſuperiore parte lætè aut ſaturatè virentia, pronâ pallidiora, Vacinijs rubris Dodon. aut Pyxacanthæ Matth. ſimilia, ſubrotunda, reſplendentia, graveolentia: flores herbacei inter foliorum ſinus exeunt, globoſi, & tenuibus ſtaminulis obſiti, quibus evaneſcentibus remanent baccæ rotundæ, Myrto majores, denticulatâ coronide in ſummo notatæ, quæ inverſæ allulæ parvæ tripedalis ſpeciem exhibent, tribus in loculis ſemina oblonga nigricantia intùs foventes.

| | |
|---|---|
| Dodon. 769. | C. Bauh. Matth. 169. |
| Cœſalpin. lib. 3. cap. 48. fol. 126. | Germ: Buchsbaum. |
| Lobel. Obſ. 562. Adv. 419. | Fuchſ: 248. fol. |
| Lugdunenſ. 165. fol. | Tabern. 756. |
| Cam. Epit. Matth. 101. | Cam. Matth. Germ. 58. |
| Hort. Med. 32. | Durant. 165. |

### II

SYringa cœrulea Luſitanica. Lilac Matthioli. Liguſtrum Orientale Cœſalp: Oſtrijs Theophraſt. Cortuſi. Staphylodendron ſæpius altitudine æquat, multis ſtolonibus à radice emiſſis fruticans, cortex è rufo albeſcit, materiam duram medio parùm medulloſam involvens: rami ejus multi geniculatim enaſcuntur, æquè ac folia Populum nigram ſine ſerraturis quodammodò affectantia, ſeu Apocyni latifolij modo è latâ baſi in rotunditatem ſenſim acuminatam protracta, ſupernè ſaturatè viridia, infernè pallidiora: flores in racemis oblongis geniculatim emiſſi, denſè congeſti prodeunt, Gelſimino luteo ſimiles, ſed minores, è tenui infundibuli ſpecie in quaterna folia dilatati, coloris cœrulei, ſecundum oras modico rubore aſperſi, odore ſuaviſſimo præſtantes: diciduis his oriuntur ſiliquæ planæ oblongæ, punicantis obſoletè coloris, media membranâ interſeptæ, in quibus ſemina anguſta rufa latent. Surculis terræ impactis facilè compræhendit, potiſſimùm tamen verno tempore.

| | |
|---|---|
| Dodon. 766. fol. | Matth. C. Bauh. 854. |
| Cœſalpin. lib. 3. c. 43. fol. 120. | P. Renealm. exactè deſcribit fol. 31. ſpecim. hiſt. ubi Kalobotrychída nominat. |
| Lob. Obſ. 540. Adv. 414. | Germ: Spaniſcher Springs-Baum. |
| Lugdunenſ. 355. | Tabern. 750. |
| Cam. Hort. Med. 165. | |

### III

SYringa flore cinerei coloris. Floris tantùm colore cinereo & quaſi argenteo à priore diverſa eſt. Germ. Aſchenfarber Spaniſcher Springs-Baum.



II. Sÿringa Italica flore albo pleno.

I. Ruſcus.

III. Sÿringa flore albo simplici

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

RUſcus, Oxymyrſini Centromirini Theoph. Anguillar. Lobel. Spina murina ejuſdem. Scopa regia Marcelli Empyrici Dodon. Bruſcus Barbaris. Radices albeſcunt, multas à ſe fibras longas effundentes, Phalangio Cordi ſimiles (cujus etiam radices ejus loco, non ſine magno errore, à Rhizotomis, quibuſdam Pharmacopœis obtruduntur, annotante Thal. in ſuâ Harcin. Sylv. fol. 69.) unde plurimi caules nutantes, Aſparagorum inſtar emergunt, qui poſtmodùm ſe in ramos erectos dilatant, firmos, rotundos, virides, quibus folia, Buxo non majora, in acutum aculeum tendentia, robuſta, pungentia, alternatim inhærent, quæ in medio ſui floribus minutis herbaceis obſidentur, exiguis ſtaminulis purpuraſcentibus circumpoſitis; poſt illos baccæ rubentes, Aſparagi baccis ampliores, rotunda ſolida oſſicula ſervant.

Dodon. 732.
Cœſalpin: lib. 5. c. 28. fol. 221.
Lobel. Obſ. 362. Adv. 283. fol.
Lugdunenſ. 243.
Cam. Epit. Matth. 935.
C. Hort. Med. 149.

C. Bauh. Matth. 840. fol.
Germ: Meußdorn.
Trag. cap. 43. lib. ſecundo.
Tabern. 535.
Matth: Cam. Germ. 452.
Durant. 867.

### II

SYringa Italica, fl. albo pleno. Frutex è ramis duriuſculis ſubrubentibus, cui folia inæqualiter inhærent, lata, ambitu ſerrata, atque è rotunditate in mucronem coacta, venoſa, viridia, flores ſecundum caules inter folia locantur, albis aliquot foliolis, confertim coarcevatis, odoratis, conſtantes, & multis in medio tenuibus ſtaminulis ſeſe exerentibus.

Germ. Blaue Doſten / weiſſer Springs-Baum mit vollen Blumen.

### III

SYringa Italica, flore ſimplici albo. Bicubitum ſuperabat noſtra, cortice ſubrubeſcente, cui æqualiter adhærebant geminato ſitu folia, Ulmi ritu aliquantùm rugoſa, oblongata, in mucronem producta, & marginibus crenata, obſcurè viridia, Pyri ſeu Betulæ magis foliorum amplitudine: flores odorati, albi, ramorum extremitates racematim occupant, è quatuor latis oblongatis folijs conflati, meditullium tenuibus ſtaminulis concoloribus refertum habentes. De ſeminibus mihi non viſis, uti etiam exactiore totius plantæ deſcriptione, vide

Dodon. 765. fol.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 9. fol. 765.
Lobel. Obſ. 540.
Lugdunenſ. 355.
Cam. Hort. 165.
Germ: Springs-Baum / mit weiſſen einfachen Blumen.
Tabern. 750.


I. Arbor Iudæ
II. Vnifolium.
IIII Hepatica Paluſtris.
III. Lunaria Botrÿtis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

ARbor Judæ, Siliqua ſylveſtris. Colytea tertia Theoph. Lugdunenſ: Cercis Alpina quorundam &c. Fabago. Pluribus ab unâ radice fruticat ſtolonibus, culturâ etiam arboream Liguſtri magnitudinem æquans. Cortex ramorum è purpurâ nigricat, circa quos, ante foliorum exortũ, faſciculatim longis pediculis cohærentes, hilariter purpureo-rubentes floſculi, Pyſi aut Cytiſi florum æmuli: folia poſtmodùm ſuccedunt rotunda, Cyclaminis vulgaris aut Aſari formâ, minùs carnoſa, dilutè virentia: floribus pereuntibus ſubmittuntur ſiliquæ latæ, membranaceæ, compreſſæ, obſcurâ purpurâ nigricantes, claudentes intùs ſemina dura, plana, obſcurè rubentia, lentis magnitudine & propemodùm figurâ.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 774. fol. | Lugdunenſ: 220. | Germ. Judasbaum/wild Jo- |
| Cœſalp. lib. 3. cap. 29. fol. 111. | Epit. Matth. Cam. 140. | Tabern. 724. (hannsbrot. |
| Cluſ: 13. fol. lib. 1. | Hort. Med. 20. | Matth. Cam. Germ. 76. |
| Lobel. Obſ. 610. Adv. 441. | Matth. C. Bauh. 171. | Durant. 944. |

### II

UNifolium Cotyledon ſylveſtre Tragi. Palmaris eſt herbula, radiculis geniculatis, obliquis, tenuibus, variè ſub telluris ſuperficie repentibus, folia primo anno magis pediculo nituntur quàm caulè, cujus ſummitati in ſecundo anno, aut tertio quandoq; , folia dilutè virentia, anguſto mucrone finita, Volubilis folijs proxima, inhærent, per longitudinem virgata, ac virgula gracilis, racematim floſculos Galij albi candicantes erigens, & poſt hos ſeminum baccas rubentes.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 205. & 206. | Hort. Med. 183. | Trag. 163. cap. lib. 1. |
| Lobel. Obſ. 161. Adv. 127. | Matth. C. Bauh. 709. | Tabern. 428. |
| Lugdunenſ: 1260. | Phytop. C. Bauh. 114. | Matth. Cam. Germ. 421. |
| Epit. Cam. Matth. 744. | Germ. Ein Blat. | Durant. 675. & 1061. |

### III

LUnaria minor, ſeu Botrytis. Radices parvæ, fibroſæ, Ophioglоſſi ferè admodum prodeunt; cauliculus lævis eſt, rotundus, herbaceo colore palleſcens, cui in medii partis latere folia ſubrotunda, lunata, aliquot in unâ coſtâ conjugatim adjunguntur, Scolopendrij ſeu Cetrach effigiem referentia, cauli concoloria, quæ totidem eſſe putantur quot Lunæ curſus dies habet. E ſinu foliorum pediculus gracilis racematim faſtigiatur in ramulos quaſi floſculos globoſos abeuntes, ſeu minuta rotunda capitella, unde ſemen, pulviſculi inſtar, in auras diſpergitur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodon. 139. | Cam. Epit. Matth. 643. | Phytopin. 145. | Fuchſ. 183. cap. |
| Cœſalp. lib. 16. cap. 18. f. 600. | Hort. Med. 91. | Germ. Mohnkraut/Mohnraute | Matth. Cam. Germ. 308. |
| Lobel. Obſ. 470. Adv. 360. | C. Bauh. Matth. 647. | Trag. 138. cap. lib. 2. | Durant. 540. fol. |
| Lugdunenſ. 1312. | | | |

### IV

HEpatica paluſtris quorundam. Radices tenuiter fibratæ, multa ortu diverſo enaſcentia folia fulciunt, rotunda, & obtuſis dentibus in ambitu inſignita: cauliculi languentes ſuſtinent floſculos albos, multos, quibus, uti & totâ ferè formâ, accedunt ad Ranunculum aquaticum Hepaticæ facie, Lobel. Obſ. 497. & Polyanthemoni paluſtre Dodon. &c. Germ. Waſſerleberkraut.


I.
Ceraſus flore pleno.
II.
Ceraſus racemosa ſylveſtris.
III
Summitates Piceæ.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

## I

CEraſus flore pleno. Proceritatem & folia vulgaris Ceraſi, folijs Prunorum oblongiora, latiora, circumſerrata, in acutum finientia, profert, nec arboris cortex maculoſus differt, niſi ſpecioſa florum candidorum, multiplicibus folijs farctorum, luxuria accederet, quâ natura vim ſuam exhalans fructus omninò perdit.

Germ: Gefüllte Kirſchen-Blühe.

An Tabern. Ceraſus multiflora, fol. 694.

## II

CEraſus racemoſa ſylveſtris, Ceraſus avium Pſeudoliguſtrum Dodon. Mahaleb Avicennæ quorundam, Padus Theophraſti Lugdunenſ. Magnitudine mediocres æquat Ceraſos, folijs conſtans viridibus, tenuiter circumſerratis; truncus foris cinereo, rami nigricante colore tinguntur; floſculi numeroſi, ſtructurâ Labumi, longiùs racematim dependent, candidi, parvi, ſuaveolentes; quibus baccæ Piſi amplitudine ſuccedunt, maturitate nigræ, quæ attritu gravem odorem emittunt: os interiùs durum, nec magnum, criſpis liriolis eleganter imbricatum, exiguum nucleum condere Dodon. ſcribit.

Dodon. fol. 765.
Lobel. 593. Obſ.
Lugdunenſ. 312.

Germ: Elſchern / wilde Trauben-Kirſchen / oder Vogel-Kirſchen.
Tabern. 696. fol.

## III

SUmmitates Piceæ. Vulgaris notitiæ Arbor eſt Piceæ, colonis etiam agricolarum quibuſvis nota, Enodis & Abieti proceritate parùm concedens, cortice ſcabro, & in criſpaturas ſe ſolvente, rami decuſſatim terram verſus inclinant, variè brachiati, veſtiti folijs, Taxi ſeu Abietis folijs magis tenuioribus, teretibus, mucronatis, & lætioris viroris, indiſcriminatim circumquaque illos operientibus: floris juli ſunt palleſcente farinâ pleni, qui excipiuntur conis, rubentibus quidem, imbricatim ſquamatis, & ſurſùm ſpectantibus, ſed nutantibus tandem, & ſummitates ramorum occupantibus, contra opinionem Plinian. lib. 16. cap. 25. qui Pinum Piceámque flores ferre omninò negat. Theophraſt. Kytgaron nucamentum ei attribuit: ſemen exiguum alatum ſub ſquamis conditur.

Dod. Abietis nomine deſcript. fol. 852.
Cœſalpin: lib. 3. c. 52. fol. 130.
Cluſ. 33. fol.
Lobel. 633. & 634. Adv. 450.
Lugdunenſ. 50. fol.

Cam. Epit. Matth. 47.
C. Bauh. Matth. 102.
Germ. Fichten / rothe Tannen-Blühe.
Tabern. 640.
Cam. Matth: Germ. 24.
Durant. 742.



II. *Lÿchnis viscosa ſÿlveſtris flor. incarnato.*

I. Poma flore multiplici.

III. *Rapunculus Sÿlveſtris maior*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

## I

POma flore multiplici, ſeu pleniflora. Neque ramorum nigricantium & quodammodò ſcabrorum inordinatâ ſerie, & folijs atroviridibus ſuperiùs, ſubtùs verò pallore pubeſcentibus, ac è latitudine ſenſim oblongatis, mucrone finitis, ambitúque crenatis, à vulgari Malo admodùm diſcrepat, niſi multiplicium albeſcentium florum numeroſis folijs, umbilicum verſus modicè rubentibus, quibus etiam cum roſis quibuſdam certare videtur. Fructus nondùm obſervatus eſt, fortaſſis, alimento uberiùs in flores refuſo, nullus ſperari poterit.

Germ: Gefüllte Aepffel-Blühe.

## II

LYchnis viſcoſa ſylveſtris, flore incarnato. Radix oblonga, multipliciter fibrata, lignoſa, ac obliquè ſub tellure demiſſa, denſum ceſpitem foliorum fulcit, quæ ſaturatè viridia ſunt, oblonga, anguſta, & in ſummo mucronata: illorum è medio cubitum longi exurgunt cauliculi, teretes, & per intervalla geniculati, qui ſuperiore parte viſcoſo ſucco obliti, muſcas ac inſidentes formicas continent, anguſtioribus folijs pari ſitu utrinque geminis rariter obſeſſi: flores faſciculatim faſtigia caulium proferunt incarnatos, quinis in ſummo bifidis folijs, & coronatis aliquot ſtaminulis conſtantes, ſtriatis oblongis caliculis ſuffultos, in quibus ſemina minuta Lychnidum perficiuntur.

An Viſcaria ſeu Muſcipula Lobel. Obſ. 242. Adv. 190.
Jxókaylon Thalij, fol. 59.
Germ: Wilde Leibfarbe Negelein.
An Tabern. Lychnis Sylveſtris purpur. VII. fol. II.

## III

RApunculus Sylveſtris Minor. E radiculâ ſingulari, oblongâ, & parùm fibratâ, proſiliebant folia non magna, ex anguſtâ formâ in latiorem oblongatam porrecta, pallidè virentia, hirſutiem aliquam molientia, quæ graciliore & rariore ſpecie caulem cubitalem conſcendebant, ſtriatum, & in ſummitate ramoſum, ac ſingulis adnatorum cacuminibus proferentem cauliculos ſtriatos, ſingulatim tenuibus oblongis lacinijs faſtigiatos, à quibus ſuſtinentur flores cymbalares, è purpureo candicantes, Medio minores, & Cervicarijs; quorum ſemen minutiore formâ refert.

Vid. Rapunculus ſylveſt. flo: ex purpurâ candicante, Tab. 119.
Germ: Wilde Rapuntzeln / mit purpurweiſſen Blumen.



I.
Piſtacia.

II.
*Laurus cum flore.*

III.
*Amigdala cum flore.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

PIſtacia Arbor. Cortice exteriore eſt palleſcente, folijs ſubrotundis, latis, circa unum pediculum conjugatim digeſtis, quorum tria tantùm, aut pauciora, juniori plantæ, adultiori octona plerunq; in uno pediculo ſeu coſtâ diſpoſita ſpectantur, è viriditate in luteum colorem elangueſcentia, craſſa, attritu aromatici aliquid Odoris effundentia, ac alternato ſitu ramulos per intervalla veſtientia: horum in propinquo oculi ſeu gem̃æ extuberant, emittentes floſculorum exiguorum rudimenta, palleſcentia (apud nos nondum adhuc exactam perfectionem aſſecuta) racemos ſcilicet coloris rubeſcentis, quibus in alijs regionibus pariter racematim dependentes nuculæ, Avellanorum majorum amplitudine, ſuccedunt, albeſcente exteriùs cruſtâ nucleum firmum, lignoſum, atq; ſub illo tenui rubrâ membranulâ contectam medullam porracei coloris complectentes, guſtu & odore Pineis nucibus aliquantùm gratiore.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 805. fol. | Cam. Epit. Matth. 170. | Tabern. 726. lib. 3. |
| Cœſalp. lib. 2. cap. 44. fol. 78. | Hort. Med. 128. | Cam. Matth. Germ. 94. |
| Lobel. Obſ: 539. Adv. 412. | Matth. C. Bauh. 222. fol. | Durant. 762. |
| Lugdunenſ. 361. | Germ. Welſch Pimpernüßlein. | |

### II

LAurus cum flore. Perpetuò virentia folia, ac attritu guſtúq; aromaticum quid effundentia profert, Citriæ Mali folijs anguſtiora, oblonga, acuminata, dura, lævia, ſplendentia, quæ craſſo breviq; pediculo ſubvehuntur è caudice obſcurè rubeſcente, enodi, ramoſo, qui in mediocris arboris altitudinem attollitur, in cujus ſummo, ſecundum foliorum exortus, flores palleſcentes craſſiuſculi emergunt, odorati, & his ſubmiſſæ baccæ, in rotunditate elevatæ, virides initio, & poſtea maturitate nigræ, tenui putamine medullam benè compactam ambientes: ſtolonibus plurimis, à radice emiſſis, luxuriat.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 837. fol. | Cam. Epit. Matth. 60. | Tabern: 653. lib. 3. |
| Cœſalp. lib. 2. cap. 21. fol. 52. | Hort. Med. 85. | Cam. Germ. Matth. 34. fol. |
| Lobel: 570. Obſ: Adv. 424. | Matth. C. Bauh. 125. (ner blühe. | Durant. 500. fol. |
| Lugdunenſ: 351. | Germ: Lorbeer-Baum mit ſei- | |

### III

AMygdala cum flore. Poſt ætatem, etiam proceritate Perſica Mala ſuperant, quæ folijs refert oblongis, ſplendentibus, viridibus, acutis, & ambitu crenatis, æquè ac floribus ante foliorum eruptionem luxuriantibus, modicè è candido rubentibus: fructus ſtrigoſior eſt, ab unâ parte fiſſurâ notatus, oblongus, depreſſus, & pube araneoſâ albidâ obductus, cartilagineâ propè carne non eduli conſtans, & nucleo firmo, duro, Perſici mali nucleo oblongiore, in quo ſubrufa tunica, medullam dulcem albam, vel in quibuſdam amaram circumvolvit. Inſertam arborem ſuper Prunum lanuginem fructuum amittere, & grandiorem fieri. Cœſalpin: habet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodon. 786. | Lugdunenſ: 317. | Matth. C. Bauh. 221. | Cam. Germ. Matth. 93. |
| Cœſalp. l. 2. cap. 14. fol. 47. | Cam. Epit. Matth. 169. | Ger. Mandelbaum mit der Blühe. | Durant. 48. fol. |
| Lobel. 569. Obſ. Adv. 569. | Hort. Med. 14. | Tabern. 705. lib. 3. | |



II. *Anagÿris latifolÿs.*

I. Anagÿris angustifoliis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

ANagyris anguſtifolia. Laburnum, Eghelo Arbor. Aburnium Plinij, Anguillaræ. Faba inverſa Tragi. Frutex arboreſcens aliquot cubitorum eſt, ligno duro flaveſcente, medullitùs nigro, cortice exteriore è viridi ſubcandicante, lævi, multis ramis, in quibus folia, longis nitentia pediculis, Trifolij majoris tertij Cluſiani amplitudine, ſuperiùs viridia, inferiùs ſubalbida, tripartitim diſterminata, atque prope exortum eorum racemi promiſſiores florum, Geniſtæ flores vel Piſi referentium, coloris lutei, & his ſuccedentes ſiliquæ depreſſæ, condentes ſemina ſubrotunda, Coluteæ vulgatiori non abſimilia, nigricantia, lentis magnitudine.

Dodon. 773.
Cœſalpin: lib. 3. cap. 32.
Lobel. Obſ. 504. Adv. 388.
Lugdunenſ. fol. 103. & 104.
Epit. Matth. Cam. 672.
Hort. Med. Cam. 82.
Matth. C. Bauh. 665.
Germ. Linſenbaum/Baumbonen.
Trag. 14. cap. lib. ſecundo.
Tabern. 794. lib. ſecundo.
Matth. Cam. Germ. 450.
Durant. 53. in textu.

### II

ANagyris latifolia. Folijs eſt priori ſimilimum, Trifolio bituminoſo amplioribus, florum facies eadem, ſemen coloris flavi magis ad renum formam accedit.

Germ: Breitblätterichte Baumbonen.


III.
Clematis Daphnoides.
flore caeruleo.
II.
Clematis Daphnoides
flore albo.
I.
Staphylodendron.
V.
Clematis Daphnoides
flore purpureo pleno.
IIII.
Clematis Daphnoides
flore purpureo.

Ordo, Fol. 8.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

STaphylodendron. Nux Veſicaria Dodon: Piſtacia Sylveſtris Caſtor. Coulcoul. & Hebulben Turcarum Matth. in Epiſtolis. Piſtacia peregrina C. Bauhin. & Terebinthus Indica Theophras: recentior: Multos ſtolones, per intervalla geniculatos, è radice variè diſperſâ albicante emittit, qui adultiores aliquot cubitos tandem æquant, cortice exteriùs cineracei coloris; folia Sambuci çervinæ vel Fraxini ſitu conjugatim hærent, dilutè viridia; flores in oblongis racemis dependent, albidi, & circa oras foliorum modicè purpuraſcentes, Lilij convallij floribus majores, ac rotundi, quibus deciduis veſicæ, Coluteæ veſicis tumidiores & majores exoriuntur, herbaceæ primùm, & deniq; palleſcentes, inferiùs infirmo mucrone finientes, ac intrinſecus medio loco geminatim baccas hordei colore intenſiores, cicere ampliores oſtendentes, pulpâ interiore ſub viridi, & nauſeoſi guſtus, dulciuſculâ refertas.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 806. fol. | Lugdunenſ. 102. | Germ: Pimpernüßlein. |
| Cœſalpin: lib. 3. cap. 44. fol. 120. | Cam. Epit. Matth. 171. | Tabern. 724. lib. 3. |
| Lobel. Obſ. 540. Adv. 414. | Hort. Med. 164. | Cam. Matth. Germ. 94. |
| | Matth. C. Bauh. 222. | |

### II

CLematis Daphnoides minor, flore albo. Radicibus tenuibus conſtat, viticulíſq; gracilibus, flexibilibus, humum verſus ſubinde ſe reclinantibus, ac geniculatim ſobolem fibratam emittentibus: quædam ſurrectiores ſunt, quibus pari utrinq; ſerie folia lævia, ſaturatiùs ſemper virentia, Laurinis anguſtiora, Liguſtri æmula, apponuntur, è quorum alis oblongi exerti pediculi flores porrigunt, à tubuloſo ſeu fiſtuloſo calice in patentia quina folia alba dilatati, nullius Odoris. Semina nondum obſervavi, Cœſalpinus ei oblonga & depreſſa, in fructibus ſeu ſiliquis bifurcatis contenta, adſcribit.

| | | |
|---|---|---|
| Vid. Dodon. 401. | Cam. Epit. Matth. 694. | Germ. Singrün/oder Beerwinck/mit weiſſen Blumen. |
| Cœſalp. lib. 8. cap. 29. f. 336. | Hort. Med. Cam. 43. | Tabern. 558. lib. 2. |
| Lobel. 360. | Matth. C. Bauh. 679. | Cam. Matth. Germ. 525. |
| Lugdunenſ. 832. | Phytopin. 597. | Durant. 254. |

### III

CLematis Daphnoides flore cœruleo. Florum colore cœruleo vulgatior eſt tantùm, & autoribus prædictis hâc facie deſcripta. Germ. Singrün/mit blauen Blumen.

### IV

CLematis Daphnoides flore purpureo. Florum colori, & folijs ſæpè anguſtioribus, diſcrimen unicè imputandum eſt. Germ. Singrün/mit purpurfarben Blumen.

### V

CLematis Daphnoides flore purpureo pleno. Multiplici foliorum, in flore ſaturatè purpuraſcentium, luxuriâ ſpecioſior cæteris & rarior eſt, quamvis mox paucioribus, mox pluribus variet, alioquin prioris æmula eſt. Germ. Voll purpurfarb Süngrün.



II. Xÿloſtium floribus albis.

I. Xÿloſteon alterum Do„donei.

III Oxÿacantha.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

XYloſteum alterum Dodon. Cubitalis altitudinis erat, ramis foris albicantibus, obſequioſis, folijs Laurinis majoribus, in mucronem faſtigatis, ſupinâ parte virentibus, pronâ candicantibus, ejuſdem cum ſequenti ſitus; flores oblongis firmis ſuſtentantur pediculis, geminati, vulgatiori Xyloſteo magis exigui, è rubente purpurâ albicantes: fructus ſuccedit unicus, Juniperinis paulo major, ſucci plenus, & in rubore pellucidus, duplicatis in ſummo ſtigmatibus (Cluſio annotante) diſtinctus, unicum intùs oſſiculum occultans.

Dodon. 407.
Germ. Beinhöltzlein.
Cluſ. 59.

### II

XYloſteum floribus albis, vulgatius. Allobrogum Periclymenum alterum Corni fœminæ effigie Lobel. Caudex foris cinereo cortice obtegitur, nec multùm ſupra humanam ſtaturám, niſi culturâ cogatur, aſcendit; rami rotundi ſunt, folijs ſibi oppoſitis veſtiti, Frangulæ ſeu Corni fœminæ æmulis, minoribus, albicantis viroris, mollibus, & inferiùs candidioribus: flores vulgare Periclymenum affectant, brevioris & ſtrigoſioris figuræ, ſingulis pediculis gemini, uti & baccæ ſuccedentes, Periclymeni baccarum ritu oblongatæ, rubentes, & oſſicula ſeminum humidiore tranſparente pulpâ obvolventes.

Dodon. 407.
Cluſ. tantùm meminit fol. 58.
Lugdunenſ. 273.
Lobel. Obſ. 558. Adv. 280.
Hort. Med. Cam. 183.
Germ. Gemein Beinhöltzlein mit weiſſen blumē.

### III

OXyacantha Galeni, Cordi, Camer. Tab. Amirberis Arabum. Berberis Officinarum. Creſpinus Matth: & Cœſalpin: Spina acida Dodon. Plurimis prolixis virgultis, & ſæpè recurvatis firmíſq; aculeis albidis armatis attolitur, tenella germina rubeſcunt, cortex adultioris ſtipitis foris cineracei coloris, novelli albicantis eſt, intúſq; flava materia lignum albeſcens circumdat: folia plura in unâ ſede locantur, viridia, margine crenata, quodammodò aſpera, ac è rotunditate oblongata, guſtu acidula; è medio illorum flores rotundi, flavo palleſcentes, Lilij convallij æmuli, & odorati, in racemis dependent, quos ſequuntur baccæ oblongæ, hilari rubedine per maturitatem infecti, acidi, intùs ſingulatim oſſiculum oblongum, Farris æmulum, ſervantes: radices lignoſæ, intenſioris lutei coloris, variè diſperguntur.

Dodon. 737.
Cœſalp. lib. 3. cap. 12. fol. 99.
Cluſ. 120.
Lobel. Obſ. 599. Adv. 439.
Lugdunenſ. 138.
Cam. Epit. Matth. 86.
Hort. Med. 28.
C. Bauh. Matth. 150. fol.
Germ. Saurach / Weinlegelein / Saurerdorn / (Peiſſelbeer.
Tabern. 741.
Cam. Matth. Germ. 47.
Durant. 136.



I. Sambucus arbor roſea.

II Trifolium arborescens.

III. Cÿtisus V. Clusÿ.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

## I

SAmbucus roſea. Sambucus aquatica Polyanthos. Lycoſtaphylos maſcula Cordi. Humanæ ſtaturæ proceritatem æquat, culturâ adjuta, rami foris cineracei coloris cortice conſtant, ſubfuſcis, per intervalla geniculatim diſtinctis, ac intùs medullâ condidâ farctis, fragilibus, in quibus folia anguloſa, Aceris minoris folia affectantia, mollia, & ſecundum margines ſerraturis conſpicua: ab extremis ramorum alis flores, magnæ ſphæræ inſtar, denſè conglomerati, albis ſubrotundis quinis folijs, in latitudinem depreſſis, conſtantes, dependent, quibus nulla ſemina ſuccedere obſervatum fuit.

Dodon. 23. lib. 4. fol. 833.
Lobel. Obſ. 615. Adv. 444.
Lugdunenſ. 270. in textu.
Cam. Epit. Matth. 977. fol.
Hort. Med. Cam. 152. attingitur.

Matth. C. Bauh. 874.
Germ. Gefüllte Schwelcken/oder Schneballen.
Tabern. 732. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 45.
Durant. 451.

## II

CYtiſus quintus Cluſij putatus. Virgæ lentæ plurimis obſepiebantur folijs, aliorum Cytiſorum ritu tripartitâ diviſurâ uno pediculo annexis, oblongis quodammodò & ſubalbidis: inter folia frequentes flores lutei, Loto ſiliquoſæ pratenſi ſimiles, prodeunt, atque his ſuccedentia ſemina, in nigricantibus & apice tenuiſſimo quaſi faſtigiatis ſiliquis, ſubhirſutis, plana, rotunda, flava: radix ſe ſparſim in tellurem demittit.

Vid. Cluſ: fol. 95.
Germ: Baumklee / der fünffte bey dem Cluſio geachtet.

## III

TRifolium arboreſcens. Cytiſus quintus rotundifolius Tabernæ mont. Cytiſus alter minor & vulgatior Lobel. in Adverſ. Radice lignoſâ & diſperſâ prodit, etiam caudicem tres cubitos æquantem, per ætatem acquirens, ſubnigricantis corticis; folia priore latiora, rotundiora, & ſaturatè viridia ſunt, mollia, nec ſemper tripartitâ ſerie digeſta: flores præcedentem amplitudine pariter ſuperant, Geniſtam magis æmulantes, lutei, ſummis alarum verticibus inſidentes: ſemina, lobis oblongis compreſſis incluſa, quodammodò compreſſa, flaveſcentia, & lente minora ſunt.

Lobel. Adv. 388.
Lugdunenſ. Cytiſi alterius Penæ nomine, fol. 261.
Germ. Rundblätterichter Baumklee.
Tabern. 798. fol.


IV. Polemonium Monſpelli, ensium.
III. Geniſta Scoparia
II. Cytisus V. Cluſij.
I. Cytisus Columellæ.

Ordo, Fol. 11.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

CYtiſus Columellæ Camerarij. Radices, ſeſe infra terram ſparſim demittentes crebras virgas, lentas, hirſutas, pedales firmant, obſeptas folijs hirſutis ſubincanis, quinque partitâ ſerie iterata per intervalla cauli adfixis, Meliloti coronatæ inſtar: florum ſitus in cacuminibus alarum corymbos efformat, pari ritu ut Meliloti dictæ flores collocantur, quorum formam colore etiam albicante, & ſuperiorum foliorum parte nonnihil purpuraſcente, referunt: ſuccreſcunt ſiliquæ ſubrotundæ, ſeu teretes, è fuſco rufeſcentes, tenuiter mucronatæ, in quibus ſemina Viciæ minimæ, rotunda, exigua latent.

Hort. Med. Cam. 53. | Germ. Rauher Baum-Klee von Columella angedeuttet.

### II

CYtiſus, VII. Cluſij ſimilis, pedalem ultra altitudinem attollitur, virgis rectis, lignoſis, frequentibus, ſubflaveſcentibus villis obſitis, quas folia ab imo uſq; ad ſummum crebra conſcendunt, terna ſingulis pediculis inhærentia, Medic. Sylveſtris luteæ folijs majora, inferiùs tenuiter villoſa, ſuperiùs vireſcentia, ad quorum exortum ſe minora alia interſpargunt: flores ſimul congeſti aliquot in ſummitatibus alarum pallidè flaveſcunt, Loto pratenſi minores: ſemina compreſſa, ſubrotunda, exigua, fulveſcentia, Geniſtam æmulantur, ſiliquis, ſubfuſcâ ac aliquantùm incanâ hirſutie pubeſcentibus, recondita: radix dura, lignoſa, ſe ſummâ tellure diffundit.

Cum ſept. Cluſ. alt. ſpecie multùm conſentire videtur, fol. 97.
Germ: Baum-Klee / der mit 7. Cluſij ſich vergleichet.

### III

GEniſta Scoparia vulgi Lobel. Geniſta quadrato junco Cœſalp. Geniſta anguloſa C. Bauhin. Ad humanam proceritatem uſque fruticat ramulis, à radicibus lignoſis & prolixè fibratis, & obliquè diſperſis, viridibus, junceis, frequentibus, anguloſis, obſequioſis, ſeu, ut Dodon. habet, necti flectiq; facilibus, in quibus folia parva, initiò Trifoliorum ritu tripartitim diviſa, poſteà, plantâ adultiore factâ, ſimplicia, obſcurè viridia: flores ſub ramorum faſtigijs oriuntur lutei, Piſorum floribus conformes, quibus vaginulæ latæ, planæ, compreſſæ, & per maturitatem nigricantes ſuccreſcunt, ſemina ſubrotunda, fulveſcentia, lentibus minora, vomitibus ciendis idonea, complectentes.

Dodon. 749.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 35. fol. 115.
Lobel. Obſ. 531. Adv. 407.
Lugdunenſ. 167.
Cam. Epit. Matth. 950.
Matth. C. Bauh. 853.
Germ. Gelbe Pfrimen / oder Khunſchroten.
Fuchſ. 79.
Tabern. 802. lib. ſecundo.
Matth. Cam. Germ. 440.
Durant. 411.

### IV

POlemonium Monſpelienſe. Trifolium fruticans Tabernæmont. Radices fibrarum, contumaciter terræ inhærentium ac ligneſcentium, flexu variè ſerpendo diſperguntur, virgæ inde plurimæ per ætatem etiam bicubitalem longitudinem attingunt, lignoſæ. tenaces, ſaturatè virides, crebris folijs craſſis vestitæ, Rutæ latifoliæ folia ſingulatim affectantibus, Trifoliorum ſitu cohærentibus: flores in ſummis ramulis oriuntur lutei, Gelſimini lutei æmuli, quibus ſuccedunt baccæ nigricantes, Liguſtro minores, officula ſeminum complectentes.

Dodon. 561.
Lobel. Adv. 390.
Lugdunenſ. fol. 1187.
Germ. Baumichter Wiſen-Klee.
Tabern. 228. fol. lib. ſecundo.



I. Colutea Veſicaria.

II. *Cytiſus Galeni Marantb. cornutus.*

III. *Cytiſus primus Tabernæm: ſpicatus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

COlutea Veſicaria, & Liparea Theophraſ. Emeri alterum genus Cœſalpin. Supra humanæ ſtaturæ proceritatem fruticando attollitur, incano foris cortice, ramis tenuibus multis, circa quos folia Senæ ſeu Glycyrrhizæ aut Viciæ latifoliæ poſitu, ambitu rotundiora (quorum quædam in ſummo paulatim ſinuata videntur) conjugatim uno nervo inhærentia: flores veluti racematim prodeunt, Viciarum, Geniſtæ, ſeu potius Chamæbuxi Geſnerianæ ſpecie, medio folio reflexo, parùm radiati, lutei, quibus decidentib⁹ oriuntur membranaceæ veſicæ, quaſi flatibus diſtentæ turgentes, quarum compreſſione ſtrepitus excitatur, intus in medio ſemina ſubrotunda, modicè depreſſa, nigra, lentis magnitudine ferentes.

Dodon. 772.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 38. fol. 117.
Lobel. Obſ. 530. Adv. 406.
Lugdunenſ. 2140. fol.
Cam. Epit. Matth. 540.
Hort. Med. 45.

Matth. C. Bauh. 572. fol.
Germ: Welſch Linſenbaum/Schaflinſen/wild (Senet-Baum.
Fuchſ. 169.
Tabern. 795. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 431. fol.
Durant. 264.

### II

CYtiſus Galeni Maranthæ cornutus. Adoleſcit in hortis, & in ſeſquicubitalem altitudinem aſſurgit, cortice foris incano, ligno duro; folia nullo ſervato ordine & longis pediculis virgultis affiguntur, tripartitis ſegmentis diſterminata, ſubincana, inter quæ alæ tenues flores Geniſtæ minoris aureos ſubmittunt, quos ſubſequuntur ſemina in falcatis latis ſiliquis, flava, depreſſa.

Dodon. 559. fol.
Cœſalpin. cap. 33. lib. 3. fol. 113.
Lobel. 503. Obſ.
Lugdunenſ. 259.
Cam. Epit. Matth. 895.
Hort. Med. 53.

Matth. C. Bauh. 810.
Germ. Gehörnter Baumklee/oder Gaißklee.
Tabern. 798. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 408. fol.
Durant. 315.

### III

CYtiſus I. Tabernæmontani, ſpicatus. Bicubitalem proceritatem vix excedebat, obſequioſis ſubnigricantibus ramulis multùm dilatatus, in quibus folia viridia Trifoliorum oblongiuſcula, & tripartitim uno pediculo ſuſtenta, parvo mucrone finita, ac ſubtùs quaſi tenuiſſimis pilis ſplendentibus obſita: flores Piſi florum formâ, lutei coloris, exeunt, & his evanidis ſemina in ſiliquis oblongis anguſtis, lente minora, compreſſa, flaveſcentia: radix lignoſa, dura, longa, nec multùm fibrata erat.

Cluſ. IV. nomine, 95. fol.
Lobel. 387. Adv.

Lugdun. Cytiſi prioris Penæ nomine, 261.

Germ. Gaiß-Klee der erſte deß (Tab.
Tabern. 797. lib. 3.



II. *Liguſtrum*.

I. Guaiacana.

Ordo, Fol. 13.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

### I

GUajacana. Guajacum. Patavinum Lobel. Tuberum inter mala alterum genus Plinij, & Ermellinus Cœſalpin. Arboris proceritatem etiam in noſtris regionibus molitur, ramorum cortice foris è fuſcedine ſubincano, folijs Ceraſi Sylveſtris latitudine & longitudine, vel Citro majoribus, prorſus integris, & in acutum productis, obſcurè virentibus, nervoſis pediculis brevibus ſubnixis: floſculi ſeriatim ramis inſident, quatuor foliorum viridium fulcimento excepti, Arbuti ſpecie concavi, ac è pallore herbaceo ſubrubentes, quibus ſubmittuntur, ſine pediculis conſpicuis, fructus globoſi, Ceraſi magnitudine in ſummo umbilicati, fuſco cœrulei: per maturitatem ſenâ oblongâ cartilagineâ intus occultantes ſemina.

Cœſalpin. lib. 3. cap. 21. fol. 104.
Lobel. 605. Obſ. Adv. 439.
Lugd. Dioſpyros ſeu Fabæ Græcæ titulo, fol. 349.
Epit. Matth. Cam. 156.

Hort. Med. Cam. 69.
Matth. C. Bauh. fol. 211.
Germ. Vermeinter Zurgel-Baum.
Tabern. 733. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 86. fol.

### I I

LIguſtrum. Olivella & Olivetta Hetruſcorum Matth. Phillyrea Dodon. Cyprus Tragi. Ramis fruticat ſurrectis, ſepimentis accommodis, in quibus folia inordinata integra, Salicis, vel Oleæ, aut Pervincæ foliorum æmula, atriorum tamen, nitentia, lævia: flores racematim condenſati cacuminibus oriuntur candidi, parvis Hyacinthorum floribus æquales, valdè odorati, caduci, quibus marceſcentibus ſuccedunt baccæ, quodammodò oblongæ, nigricantes, compactæ uvæ rudimenta repræſentantes, Juniperinis baccis majores, intùs pulpâ friabili purpureâ, oblongiuſcula angularia ſeminum oſſicula circumvolventes, quæ ramis ſuis plerunque totâ hyeme inhærere ſpectantur.

Dodon. 763. fol.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 8. fol. 95.
Lobel. Obſ. 564. Adv. 420.
Lugdunenſ. 252. fol.
Epit. Matth. Cam. 89.
Matth. C. Bauh. 154. fol.
Germ. Klein Weidenmundholtz / Beinhöltzlein.
Fuchſ. 182. cap.
Tabern. 746. fol. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 49. fol.
C. Durant. 520.



V. *Ribes fructu albo.*



IIII. *Ribes maior fructu rubro.*



III. *Ribes fructu nigro.*



I. Ribes minor fructu rubro.



II. *Ribes vulgaris fructu rubro.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

horti, Icones arborum & fruticum Vernalium continens.

## I

RIbes minor, fructu rubro. Vvam criſpam vulgatam viticeâ ſuâ, ambitu crenatâ, & aliquantùm atro viridi fronde æmulabatur, frequentibus longis pediculis è caudice ſesquicubitali ſubvectâ, cui intermiſcentur tenues racemi, floſculis herbaceis, ſecundum angulos ſubrubentibus, ſummis fructibus inſidentibus, onuſti; ſunt autem fructus bacculæ parvæ rubicundæ, pellucidæ, ſucco dulci, ac propemodùm nauſeoſo guſtu, oſſiculis ſeminum ut plurimùm orbatæ.

An Ribes dulce Cluſij 119. & icone additâ 120. | Sylveſtre Cam. in Hort. Med. fol. 141.

Germ. Klein roth Johannis-Träubel / ſo ſüßlicht ſeyn.

## II

RIbes rubra vulgaris. Folijs eſt duplo latioribus, ſaturatè nigricantibus, vitigineâ diviſurâ per ambitum evidenter crenatis, quæ longi pediculi porrigunt, è virgultis bicubitalibus, corticis ſubnigricantis, ramoſis: flores ſuperioris modo à foliorum ſinubus racematim dependent, herbacei, palleſcentes, parvi, quibus baccæ, piperis magnitudine, poſt virorem maturitate rubentes, ſuccedunt, guſtu aciduli: radix lignoſa, ſubnigricans, variè diſpergitur, ac diviſa in ſurculos facilimè propaganda eſt.

Dodon. 737.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 12. fol. 99.
Lobel. Obſ. 615. Adv. 445.
Lugdunenſ. Groſſulariæ rub. titul. 132.

Epit Matth. Cam. 88. fol.
Hort. Med. 141.
C. Bauh. Matth. 151.
Germ. Gemein roth Joannis-Treubel / oder Joannis-Beerlein.

Fuchſ. 257.
Tabern. 784. lib. 3.
Matth. Cam. Germ. 49.
Durant. 849. fol.

## III

RIbes fructu nigro. Majoribus ejuſdem formæ folijs conſtat, ſed magis nigricantibus, & graviuſculo odore nauſeam moventibus; ſic & baccis multò majoribus, nigris, guſtu acredinem piperis aliquantùm referentibus, quæ poſt floſculos, è herbaceo rubeſcentes, prodeunt: radicibus multipliciter ſparſis ſe valdè propagat.

Dodon. 737. fol.
Cluſ. 120.
Lugd. Groſſulariæ nigræ nomine, f. 133.

Lobel. Adv. 44.
Cam. Hort. Med. 141.
Matth. C. Bauh. in textu, f. 152.

Germ. Schwartze Gicht-Beer / oder Joannis-Trœubel.
Tabern. 784. lib. 3.

## IV

RIbes fructu rubro, majus. Majoribus & vegetioribus plerunque differt folijs, uti & baccis, duplo vel triplo quandoque vulgare ſuperantibus.

Groſſularia majore fructu Cluſ. fol. 120. | Cam. Hort. Med. 141.

Germ. Groß / roth / frembd Joannis-Träubel.

## V

RIbes fructu albo. Quo colore fructus, unionum palleſcentium modo pellucidi, à ſuperioribus variat.

Matth. C. Bauh. in textu inter ſynonyma, 152. | Ribes vulgare, albo fructu, Cluſ. 120. fol.

Germ. Weiß Joannis-Träubel / oder Joannis-Beerlein.

*PRIMUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.


II. Denscanis flo: albo.
III. Dens canis flore rubro.
I. Squammata ſeu dentaria maior
V. Primula veris ſylveſtris flo: pallido.
IV. Pulmonaria maculoſa.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

DEntaria major, & prima Cluſij: Squammatia, & Radix ſquammata: Crocodilea: Anblatum: Dentaria, Aphvllos major dicta, quòd ſine folijs naſcatur, quamvis foliola, florum colore, exeant in caulibus teretibus, fragilibus, humidis, qui quidem caules in ſummo incurvati & demiſſi ſunt. Horum unus ut plurimùm flores habet, ex albo purpuraſcentes, ſummitate ſuâ hirſutos: extra quos caliculi ſemen parvum nigrum continent. Caulium autem ferè ſinguli ſingulas ſuas habent radices, ex compage ſquammatâ congeſtas, ad unam, eámque ſquammis craſſioribus, majorem, colore albicante, deſcendentes.

Lugdunenſes deſcribunt hanc fol. 1296.
Dodonæus fol. 544.
Cluſius lib. quinto, fol. 119.
Matthiol. Caſpar. Bauhini, fol. 685.
Epitome Matth. Camer. pag. 705.

Horto Medico Cam. pag. 54.
Germanicè, Schuppen-Wurtz / Ohneblatt / St. Georgen-Wurtz / Blumen-Kraut / Geſchuppt-Freyſam-Kraut.
Matth. Cam. Teutſch fol. 414.
Tabernæmont. lib. ſecundo fol. 518.

### II

DEns Caninus Belgarum: Satyrium Erythronium: Pſeudohermodactylus Matthioli: ex radice craſsâ, oblongâ, ſubtus fibroſâ, germinat: à cujus fibris proximè aſcendit caulis tenuis, cum duobus plerunque folijs latioribus acuminatis, rubro maculatis; intra quos caulis pergit ad flores, lactei & albicantis coloris, expanſos, tandémque repandos. Horum ſtamina ſunt nivea, cum apicibus nigris.

Lobel. Obſervat. fol. 97.
Adverſ. 64.
Dodon. fol. 202.
Lugdunenſ. fol. 1567.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 266.
Epitom. Matth. Cam. pag. 848.

Horto Camer. pag. 54.
Matth. Caſp. Bauhini. fol. 779.
Germanicè, Schoß-Wurtz / Weiß Stendel-Wurtz.
Im Teutſchen Matth. Camerarij, fol. 389.
Tabernæmontan. lib. ſecundo, fol. 348.

### III

DEns caninus, à priore, & jam deſcripto, parùm differt: radicis ſcilicet, caulis & foliorum formâ & naſcentia: niſi quòd dilutiore rubore floret, ſtaminibus purpuraſcentibus, ſtylo candido. Autores ſuperiùs notati.

Germanicè: Rothe Schoß-Wurtz.

### IV

PUlmonaria maculoſa, altera Matthioli: Symphytum maculoſum Dodonæi: folijs Buglosſum refert, hirſutis, ſed maculis candicantibus notatis, majoribus & aſperis: floribus rubentibus, qui, quando aperiuntur, purpuraſcunt: Radix ejus craſſa, viſcida, multifida, nigrior, cum fibris concoloribus.

Dodon. fol. 135.
Lobel. Obſ. 317. Adv. 252. 253.
Lugdunenſ. fol. 1327.
Cluſius libro quinto, fol. 169.

Epitome Camerarij, pag. 784.
Horto Camerarij, 133.
Germ. Fleckend Lungen-Kraut: Hirſchkel: Hirſch-Mangolt.

Germ. Matthioli Camerarij, f. 365.
Tabernæmont. lib. ſecund. f. 260.
Durant. 813.

### V

PRimula Veris ſylveſtris: Phlomydum una: humilis prope terram ampliatur, folijs virentibus, florum multitudine palleſcentium: radicibus ſparſis flavis.

Lobel. Obſerv. 305. Adv. 244.
Lugdunenſ. 835.

Cluſius lib. tert. fol. 302.
Germ. Bleich-gelbe / Nidrige / Fruhe Schlüſſel.

Blumen / oder Himmel-Schlüſſel.
Tabernæmont. Germ. lib. 2. f. 35.



II Auricula Vrſi flore purpureo.



I. Auricula Ursi flore albo.



III. Auricula Vrſi flore luteo.



IIII. Ariſtolochia flore albo.



V Ranunculus Sylvarum flore albo & pleno.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

INter Saniculas, Verbaſcula, vel Primulas Veris, ob plurium ſimilitudinem, numerantur Auriculæ Urſi, quarum prima Minor flore albo & candicante gratior multò, ſicut & folijs juxtà & arctiùs appoſitis, piloſitate circumadornatis, quæ Phlomidum eſt forma, levius virentibus conſtat.

Germanicè, Weiſer Berg-Sanickel.

### II

SEcunda flores purpureos habet lætiores, ſub quibus folia latiora ex viridi lutea panduntur.

Germanicè, Berg-Sanickel mit brauner Blumen.

### III

HAs ſequitur, omnibus Herbarijs ferè cognita, Auricula urſi, flore ex luteo pallente, ex porrectis latioribus ſuaviùs virentibus folijs, pinguibus, & aliquibus repandis.

Tres hæ ſpecies obſervantur à

Dodonæo 148.
Lobel. Obſervat. 306.
Adverſ. 244.
Lugdun. 837.
Cluſio 302. Rariorum Plant. lib. tertio
Matthiol. Cam. Epitome, 706.
Horto Camer. 25.

Matth. Bauhini, 685.
Germanicè, Berg-Sanickel / oder Gluß-Blumen.
Matth. Camerarij Germ. fol. 330.
Tabernæmont. fol. 41. lib. ſecundo.
Durante, 123.

### IV

ARiſtologia rotunda, floribus albis & folijs fumariæ tenellis, & levore quaſi cinere aſperſis, dilatatur, uno ſaltem caule plerunque, radice quidem non tuberoſâ, ſed ſubrotundâ & levi.

Dodon. fol. 324.
Lobel. Obſervat. fol. 438.
Lugdun. fol. 1292.
Matth. Cam. Epitom. pag. 891.

Bauhini, 807.
Germanicè, Weiß Hol-Wurtz.
Matth. Camer. Germ. 407.
Tabernæmont. 112. lib. primo.

### V

RAnunculus Sylvarum: Rarior planta: flore albiſſimo, eóque pleno: Radice Anemonis nigrâ: Aconito batrachoidi ſimilis, folia molliora, profundiùs diviſa habet, virore dulci.

Germanicè, Weiß gefüllte Waldhenlein.


III.
Naſturtium aquaticum flore pleno.
IIII.
Naſturtium aquaticum simplici flore.
I.
Ranunculus nemo, rosus flore pleno.
II
Ranunculus nemorosus flore luteo.

# Celeberrimi Eystettensis

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

RAnunculus Nemoroſus: floris pleni, roſei, innumerâ ſerie foliorum, intus albicantium, niveorum, ad capitulum, ex ſtaminibus rotundis, luteum, concentrantiùm: Exteriùs verò, & circa ambitum floris, foliolis, ex purpurâ rubeſcentibus, producitur. Cauliculi ſunt tenuiores: horum folia laciniata quidem latiùs & profundiùs, omni parte lætè virentia.

Germanicè, Gefüllte weiſe Waldhenlein.

### II

RAnunculus Nemoroſus, anguſtis foliis, lucidè virentibus, parùm crenatis & mucronatis (ſicut Ranunculus aquaticus, flammeus, ab aliis deſcribitur) flore majore luteo cauliculis tenioribus rotundis naſcitur.

Dodonæi 432. Species quinta.
Lobel. Obſervat. 382.
Adverſ. 30.
Lugdun. 10030.

Cluſius lib. ſecundo, fol. 247.
Germanicè, Gelbe Waldhenlein.
Fuchſ. cap. 57.
Tabernæmont. lib. primo. 139.

### III

NAſturtium Aquaticum: floribus plenis, uni cauliculo pluribus annatis, iisque candidis: Cardamines, vel Siſymbrii foliis conſpicuum.

Germanicè, Gefüllter weiſſer Kreß oder Gauchblumen.

### IV

NAſturtium Aquaticum: ſimplicibus floribus, iisque quatuor foliorum, albicantibus ſingulis. conſtat.

Dodon. 582.
Lobel. Obſervat. fol. 601.
Lugdun. 659.
Cluſio lib. ſecundo. cxxix.
Epitome Camer. 270.

Matth. Caſp. Bauhini, 379.
Germanicè, Gauchblumen.
Fuchſ. cap. 276.
Matth. Camer. Germ. 245.
Tabernæmont. lib. ſecundo. fol. 167.


IIII.
Viola martia flo. albo.
V.
Viola martia flo. rubro purpurascente.
III.
Viola matronalis flo. purpureo.
II.
Viola martia alba, flo. multiplici albo.
I.
Viola martia purpurea multiplici flore.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

VIola Martia purpurea: luxuriat folliis latioribus, venoſis, mucronatis, parùm ſerratis, quorum quælibet ſuos ſtylos, à radicis fibroſæ capite proſilientes, virentes, habent peculiares, tenues: ſicut & flores multiplices, lucidè purpuraſcentes, ſuaviter ſpirantes.

Germanicè, Brauner gefüllter Mertzen-Viol.

### II

VIola Martia multiplici flore, in cauliculis volubilibus ſe exerit, odoro, albo, exteriùs purpuraſcente, ut variegata etiam dici poſſit.

Germanicè, Weiſſer gefüllter Mertzen-Viol.

### III

VIola Martia nigra, vel ex nigro purpurea, folijs latioribus, calthæ æmulis, & floribus funditur elata, lætè expanſis, purpuraſcentibus, ſimplicibus, odoris.

Germanicè, Brauner einfacher Mertzen-Viol.

### IV

VIola Martia, folijs & flore humilior, ac ſi Sylveſtrium ſequeretur formam, floribus albicat ſimplicibus, ſine odore.

Germanicè, Weiſſer einfacher Mertzen-Viol.

### V

VIola Martia, conſtat folijs, ut & aliæ jam depictæ, ſuis cauliculis ſingulis porrectis, viridibus, ex rotunditate oblongis, mucronatis: floribus, ex ſummo rubore purpuraſcentibus, ſimplicibus, inodoris.

Germanicè, Einfacher Roſinrother Mertzen-Viol.

Iſtæ verò Violæ Martiæ, cum earundem ſpeciebus varijs, doctiùs & uberiùs deſcribuntur

à Dodon. fol. 156.
Lobel. Obſervat. fol. 334.
Adverſ. 266.
Lugdun. fol 788.
Matth. Caſp. Bauhini, 821.
Matthiol. Epitome Camer. pag. 910.

Horto Camer. 177.
Phytopinace Bauhini. 374.
Germ. Fuchſ. cap. 117.
Trag. 211.
Matth. Camer. 412.
Tabernæmont. 2. Buch. 17.
Durant. 1042.


III. Primula veris flor' pleno.
IV Primula Veris gemino flor'.
I Doronicum.
II Cariophyllata montana.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ACOnitum Pardalianches, ab alijs Doronicum Romanum latifolium, caule terete cubitali ſurgit, cujus circumferentiam ferè totam, folia ambiunt latiora, rara, circumroſa, hirſuta, molliuſcula, ſaturatè virentia: Flos eſt luteus, circa orbem interiorem, foliolis albicantibus, circulariter exporrectis: Radicum internodia apparent minùs diſtincta: illæ enim non ſunt geniculatæ, ſed tenuiores, & porrò fibroſæ.

Dodon. 434.
Lobel. Obſervat. fol. 370.
Adverſ. 289.
Lugdun. fol. 1737.
Cluſ. lib. quarto, fol. XVI.
Matth. Caſp. Bauhini, 763.
Epitome Camer. 823.
Germanicè, Gemſen-Wurtz.
Germ. Matth. Camer. 168.
Tabernæmont. ſecundo lib. 49.
Durante Germ. 325.

### II

GAryophyllata montana Matthioli: ex radice oblongâ, odoratâ, caules cum folijs, profundiùs laciniatis, ædit tenues, quorum, qui ſummi ſunt, floribus, ex Violâ rubentibus, inſtar campanularum nutantibus, linquuntur.

Dodon. fol. 137.
Lobel. Obſervat. 397.
Lugdun. 686.
Cluſ. lib. quinto, fol. CIII.
Epit. Camer. 727.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 697.
Germanicè, Berg-Benedicten-Wurtz.
Germ. Matth. Camer. fol. 168.
Tabernæmont. 404.
Durante 194.

### III

PRimula Veris ſylvarum, flore multiplici, dilutè luteo, ſpecioſo, ſe ampliat: folijs latioribus molliuſculis, ſubviridibus, ſicut tota planta, ſuavitatis rarioris.

Lobel. Obſer. 305. Adverſ. 244.
in Appendice Adverſ. 466.
Lugdun. 835.
Cluſius lib. tertio, fol. 302.
Germanicè, Gefüllt Wiſen-Schlüſſel-Blumen.
Germ. Tabernæmont. lib. 2. fol. 34.

### IV

PRimula Veris hortenſis, flore gemino, uno alteri impacto & innato, benè flaveſcente, in cauliculo erecto collectim effertur: ſub quibus folia ſunt oblongiora, indifferenter crenata, ex livido viridia, venoſa.

Lobel. Adverſar. Appendice 466.
Lugdun. 834.
Epitom. Camer. 883.
Germ. Doppelt in einander wachſende Schlüſſel-Blumen.
Germ. Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 34.
Matth. Camer. 404.


III
Lychnis Sylveſtris.
II.
Orobus Pannonicus.
I
Conſolida media.

Primus Ordo, Fol. 6.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

COnſolida media, Bugala, ſolidago, ex radice fibratâ, tenera, humi reptantes ſpargit cauliculos: folijs menthæ ſimilibus, parùm ſerratis, craſſioribus & hirſutis: Flores, juxta folia, interiùs circumcircâ prodeunt verticillatim cærulei, in caule aſſurgente, lanuginoſo.

Dodon. fol. 135.
Lobel. Obſervat. 252.
Adverſ. 199.
Lugdun. fol. 1075.
Epitome Camer. 702.
Matth. Bauhini, fol. 683.
Germanicè, Braun Gülden Gunſel.
Germ. Fuchſ. C. 219.
Matth. Camer. 329.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 257.

### II

ORobus Pannonicus, multorum caulium, ſtriatorum eſt planta, paulò elatior, in horum coſtis, folia opponuntur, ut plurimùm latiora, eaque mucronata, à nervo medio transverſim excurrentibus venis, viridia: cum floribus cœruleo purpureis, ex alarum ſurculis dependentibus: Radice nititur multifidâ, in diverſa tendente, longâ.

Cluſius lib. ſexto, fol. 230.
Germanicè, Wilde Ungeriſche Wicken.

### III

LYchnis ſylveſtris, nonnullis Ocynoides dicta, caulibus prodit rotundis: craſſiuſculis & minus lanuginoſis folijs: floribus ſimplicibus, rubro incarnatis.

Dodon. 171.
Lugdun. 817.
Cluſ. lib. tertio, fol. 288.
Lobel. Obſer. 181.
Adverſ. 142.
Matth. Caſp. Bauhini, 706.
Germanicè, Wilde Morgen-Röslein.
Germ. Matth. Camer. fol. 343.
Tabernæmont. 10.



II.
Lunaria græca annua.

I.
Lunaria græca perennis.

Primus Ordo, Fol. 7.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

LUnaria Græca major: Viola latifolia, peregrina: perennis: odorata: radicum eſt fibratarum, oblongiorum, tenuiorum, ſparſarum. Ex caule lignoſo pendent latiora folia, amplius aliquantò crenata: Flores ex albo ſubcœrulei: hos ſequuntur ſiliquæ longiores, protenſæ, laminoſæ, ita ut tres aliquandò membranulæ ſeparatæ divelli poſſint, ſuis annexis ſeminibus.

Lobel. Obſervat. margine, fol. 174.
Germanicè, Groß weiß Griechiſch Violen.

### II

LUnaria Græca alia: annua planta, aſſurgit floribus cœruleo purpureis, ſiliquis indè orbicularibus, pellucidis: folijs minùs latis, virentibus, benè crenatis, in caulibus ſurculoſis: Radice aliquibus partibus poroſâ, longiùs porrectâ albâ, ob ſimilitudinem Bulborum Bulbonac quibuſdam dicta.

Dodon. fol. 161.
Lobel. Obſervat. fol. 174.
Adverſ. 137.
Lugdun. fol. 805.
Germanicè, Braun Mond-Violen.
Germ: Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 31.
Durante, 543.



II. Geranium Batrachioides cærul

I. Geranium muſcatum inodorum.

III. Geranium Batrachioides flore albo

# Celeberrimi Eyſtettenſis

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

GEranium Muſcatum, inodorum, parvum: folijs Cicutæ, inæqualibus inciſuris, laciniatis, tollitur: floribus tenuibus, rubentibus: cui roſtella ſubnaſcuntur, gruum vel ciconiarum capitulis æmula, tenera: radice cum fibris palmari, albicante &c.

Dodon. fol. 64.
Lugdun. fol. 1276.
Matth. Caſp. Bauhini, 624.
Germanicè, Biſem-Storch-Schnabel ohne Geruch.
Germ. Fuchſ. cap. 76.
Tabernæmont. lib. primo, fol. 153.

### II

GEranium Batrachioides, magnum, ſpecioſum: floribus laſcivit cæruleis, in quorum medio capillamenta flaveſcunt: mucronibus conglomeratis roſtratis: folijs, lanuginoſos caules circùm amicientibus, profundis inciſuris, ſubtus incanis, ſuperiore parte verò virentibus: à radice longiore, extenſâ, ſparſâ, in ceſpite fibrante, caules protruſi rubent.

Germanicè, Blau-Storch-Schnabel-Blumen.

### III

QUod priori ſimile, Geranium eſt, Batrachioides, Ranunculum folijs reverens ſylveſtrem.

Flore albicante tamen differt: folijs inſuper longè magis protenſis, majoribus ſectionibus diviſis: ſcapo robuſtiore, molli lanugine veſtito: radicibus, in cirros multos confibrantibus, conſtat.

Famosè autem & eleganter utrasque ſpecies conſignant:

Dodon. fol. 63.
Lobel. Obſervat. fol. 376.
Adverſ. 296. & 297.
Lugdun. 1272.
Cluſ. lib. quinto, fol. C.
Matth. Caſp. Bauhini, 623.
Germanicè, Weiß groß Storch-Schnabel.
Germ. Tabernæmont. lib. primo, fol. 153.



II.
*Geranium Sanguinarium maius.*

I.
Geranium anglicanum va-
riegatum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

GEranium Anglicanum, cubitale: ob floris venuſtam diverſitatem, non ſine ratione, dictum variegatum, rarum: ille enim, à ſummis cauliculorum alis, foliolis quinque plerumque explicatur (inſtar roſarum exiguarum) albicantibus, cum maculis & radijs cæruleis, vel, quod pulchrè etiam conſpicitur, florum foliola alba ſunt & cærulea, alternatim: ad genicula autem caulium, folia, altioribus inciſuris, mirùm laciniata, circumeunt.

Germanicè, Engliſch geſprengt Storch-Schnabel-Kraut.

### II

GEranium ſanguinarium majus, Robertianum: radice prolixiore, eaque quodammodò bulboſâ, ſuperficiariè ſerpente, geniculatâ, humotenus rubente, nititur: caulibus exurgit articulatis, pinguibus, quorum ſinguli peticuli ſua habent folia ampliora, unâ, incana, alterâ parte, virentia: in ſummo emicant flores, ex purpurâ rubentes.

Dodon. fol. 64.
Lobel. Obſervat. fol. 376.
Adverſ. 296.
Lugdun. 1278.
Matth. Caſp. Bauhini, 623.
Germanicè, Blutberg/ Storch-Schnabel-Kraut/ oder Gottes Gnad.
Germ. Fuchſ. cap. 76.
Tabernæmont. lib. primo, fol. 449.



III. Geranium Saxatile.

I. Geranium moscatum odoratum

II. Geranium Fuscum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

GEranium Moſchatum: Acus muſcata odore jocunda: radice tenellâ: caule brevi, eóque rotundo: flore colore dilutè incarnato: in faſtigio, poſt flores, ſummo, porriguntur, cum ſuis ſtylis & roſtellis exilibus, erectis, caliculi exigui.

Lobel. Obſervat. fol. 376.
Adverſ. 296.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 621.
Horto Medio Camer. pag. 66.

Germanicè, Biſem Storch-Schnabel-Kraut.

Germ. Matth. Camer. 293.
Tabernæmont. lib. I. fol. 152.

### II

GEranium fuſcum, ob maculas, in folijs amplioribus obſervatas, pullas: floribus ex phæo purpurantibus, reflexis: radice magnâ, craſſiore, extensâ, multis propaginibus donatâ: in longum aſcendit, cum, Geraniorum omnium ferè communibus, gruum roſtris, verùm previoribus.

Lobel. Obſervat. 377.
Lugdun. 1279.
Germanicè, Frembd Storch-Schnabel.
Germ. Tabernæmont. lib. primo, fol. 154.

### III

GEranium Saxatile, argenteum: cauliculo & pediculis Xirampelinis, floribus rubentibus: foliorum eſt viridium, ſplendeſcentium, fiſſorum: radice ſerpit longâ, gracili, protensâ.

Matth. Caſp. Bauhini, 624.
Horto Medico Camer. pag. 66.
Deſcript. Hercyniæ ſylvæ Joan. Thalij, 44.
Germanicè, Berg Storch-Schnabel.
Germ. Matth. Camer. fol. 298.
Durante, 419.



I
Thalictrum flore incar, nato.

II.
*Thalictrum flore albo.*

III.
*Fumaria tenuifolia flore niveo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

THalictrum, Thalietrum, Herbariorum Ruta pratenſis vel paluſtris: hujus folia pinguia, ex argenteo coloratu ſunt viridia, tribus & pluribus ſectionibus diviſa: ex pediculo, articulis tuberoſis, caule cavo, imbricato prodeuntia: flores racematim faſtigiantes, villoſi, cum eorum ſtaminibus, ex albo rubentes, incarnati.

Dodon. fol. 58.
Lugdun. fol. 1080.
Lobel. Obſervat. fol. 508.
Adverſ. 391. & 392.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 794.

Germanicè, Wehlſamen.

### II

THalictrum, à priori non niſi florum colore albicante & niveo differt, folijs inſuper paulò latioribus, crenatis, obſcurè virentibus.

### III

FUmaria, tenuium foliorum flavoviridium ſcandica, floſculis albis: rara: à

Lobel. Adverſ. 338.
Obſervatur.



II.
*Ranunculus flore globoso.*

I.
Ranunculus albus flo-
re pleno.

III.
*Ranunculus bulbosus maior.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

RAnunculus albus multiflorus, peramœnâ & multiplici florum candidorum ſerie, erectis ſurculis tollitur ſequipedalis: folijs ſaturatè virentibus, nitentibus, ſerratis, oblongis: caule rotundo: radicibus tenuibus, ſparſis.

Lobel. Obſervat. fol. 381.
Lugdun. fol. 1035.
Cluſius lib. ſecundo, fol. 236.
Matth. Caſp. Bauhini, 459.
Epitome Camer. 383.
Germanicè, Weiß gefüllter Hannen-Fuß.
Germ. Matth. Camer. 200.
Tabernæmont. lib. primo, cap. 132.

### II

RAnunculus, flore glomerato, Major, auricolore & ampliore tandem panditur & explicatur, prius tamen in globum collecto: folia, in apicibus pediculorum, ſingula quinque, profundioribus inciſuris, crenata, ex albo habet virentia: pluribus caulibus aſſurgit evaginatis: radice multifidâ, ſuperficientenus ſparsâ.

Dodon. fol. 427.
Lobel. Obſervatur. 385.
Lugdun. 1033.
Cluſ. lib. ſecundo, 237.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 459.
Epit. Matth. Camer. 385.
Germanicè, Alpen-Hannen-Fuß.
Germ. Matth Camer. 199.
Tabernæmont. lib. 1. fol. 133.
Durante. 830.

### III

RAnunculus bulboſus, peculiariter Batrachium dictus, major: prolifero flore, ex uno, altero & tertio emergente, auroluteo, ſplendente, denſo, aſſurgit. Folijs latioribus, atrovirentibus, variè diſſectis: radice globosâ, inverſo exiguorapo ſimili (ſic rapum D. Antonij indigitant) ex quâ teneræ fibræ, & ſubtus annexa, gracilia dependent capillamenta.

Dodon. fol. 428.
Matth. Caſp. Bauhini, 458.
Epitome Camer. fol. 381.
Germanicè, Gelb gefüllter Hannen-Fuß oder Geiß-Blumen.
Germ. Matth. Camer. 199.
Tabernæmont, lib. primo, 131.



I. Ranunculus Illyricus.

II. *Ranunculus hortensis flore pleno.*

III. *Anemone Sylvestris flore albo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

RAnunculus Illyricus: caule levatur gracili, cubitali: folijs oblongis, inciſis, tenuibus, lanugine ex incano viridi obſitis, quorum ſummitatibus flores inſident aurei, nitidi: radices multâ granorum, vel tuberculorum oblongiorum, ſerie grumosè coacervantur.

Dodon. 425.
Lobel. Obſerv. 383.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 240.
Lugdun. 1032.
Hort. Camer. 137.
Germanicè, Illyriſcher Hannen-Fuß.
Tabernæmont. lib. primo, 143.

### II

RAnunculus Hortenſis, multiflorus, luxuriat floribus multiplicatis, auroluteis, reſplendentibus. Caule ſeſquipedali, ſurculoſo: folijs in quinque plerunq; partes profundius & inæqualius diviſis, dilutè virentibus: nervi radicis deſcendunt obliqui & multifidi.

Lobel. Obſerv. 380. Adverſ. 299.
Dodon. 424.
Matth. Caſp. Bauhini, 458.
Epitome Matth. Camerar. 381.
Germanicè, Gefüllter gelber Hannen-Fuß.
Germ. Matth. Camer. 199.
Tabernæmont. lib. primo, fol. 143.

### III

ANemone ſylveſtris, conſtat radice rectâ, multas & capillares diffundente propagines: caule albicante lanugine veſtito. Folijs ad umbilicum pediculi uſque laciniatis, obſcurè herbaceis: floribus niveis, in quorum medio capitellum exertum luteis cingitur ſtaminibus.

Dodon. fol. 444.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 244.
Epitom. Matth. Camer. pag. 388.
Matth. Bauhini, 461.
Germanicè, Weiſſe wilde Anemonen.
Germ. Matth. Camer. fol. 201.
Tabernæmont. lib. primo, fol. 96.



II.
Ranunculus Mõtanus ma-
ior flo: luteo

I.
Ranunculus Hortensis
erectus flore simplici lu-
teo.

III.
Ranunculus erectus minimus
flo: pleno luteo prolifero.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

RAnunculus erectus hortenſis, flore pleno luteo. Radice craſſiuſculâ conſtabat, longis inferiùs fibris emiſſis donatâ; folia vireſcebant, foliorum Ranunculi vulgatioris, pratenſis æmula, & per longa intervalla caulibus ſe multiplicantibus appoſita: cacumina floribus ſuperbiebant, denſo foliorum multiplicium rotundorum ſtipatu, Bellidum plenarum orbiculos mentientibus, colore luteo nitente: ſæpiùs geminatim combinantur, ac quandoque ſobolem aliam ex ſe emittunt: ſeminum quidem rudimenta angularia nonnunquam apparent, citra tamen ullam perfectionem.

Pertinent ad Ranunculum Dodon. hortenſ. ſecundum, in textu annotatum, 423.
Lobel. Obſervat. 380. Adverſ. 299.
Camer. Epit. Matth. 381.
Hort. Med. tertij erecti Fuchſiani titulo, fol. 136.
Phytopin. Bauh. 322. fol.

Germanicè, Aufrecht-ſtehendter Garten-Hannen-Fuß/mit gefüllten gelben Blumen/ſo bißweilen eine auß der andern wächſt.

Ad Tabern. IV. Ranunculum pertinent, 142.
Camer. Matth. Germ. 199. è floribus appictis.
Durant. 828. fol.

### II

RAnunculus oleraceus erectus, flore ſimplici luteo. Radicibus nititur fibroſis, albeſcentibus, caule dodrantem altiore, lævi, vireſcente, à quo longis craſſis pediculis porriguntur folia, Apij æmula, ſplendentia, viridia: caulis multiplicibus ſtatim à radice proceſſibus ſurſùm dilatatur, alijs folijs per intervalla magis acutis, & ferè pedes gallinarum imitantibus, ſeptus: flores faſtigiatim apponuntur, quinis rotundis luteis ſplendentibus folijs capillacea ſtamina concoloria ambientes: ſemina anguloſa, palleſcentia, compacta capitula, aliorum Ranunculorum modo, ferunt.

Germanicè, Gemeiner einfacher ſüſſer gelber Acker-Hannen-Fuß/oder Schmaltz-Blumen.
Tabern. 142.

### III

RAnunculus montanus major, flore luteo. Radice albeſcente, & in fibras ſparſas diffuſâ, firmatur, caule cubitali hirſuto; folia longis pediculis craſſis & ſubhirſutis innituntur, Aconito luteo non abſimilia, parùm piloſa, & atrovirentia: flores ſumma caulis faſtigia occupant, priore Ranunculo duplo majores, at illius æmuli, & concolores: ſeminum capitula quoque conformia viſuntur.

Familiaris eſt multùm Ranunculo montano quinto Cluſij, fol. 237.

Germanicè, Groſſer Berg-Hannen-Fuß/ mit gelben Blumen.



II
Ranunculus Aſiaticus grumosa radi ce flore pleno ruberrimo.

IIII
Ranunculus Aſiaticus grumosâ radice flore Phoeniceo ruberrimo.

I
Ranunculus Aſiaticus gru, mosâ radice flore pleno Sangui, neo prolifero.

III
Ranunculus Creticus grumosâ radice flore niveo.

V
Ranunculus Aſiaticus grumosa radice flo re fla rubris venis diſtincto.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

RAnunculus Aſiaticus, grumoſâ radice, flore pleno ſanguineo prolifero. Radicum caput oblongatarum, ſucculentarum glandularum congeriem fundebat, quæ Aſphodelinas æmulabantur; ab his ſurgebat caulis, circa quem inferiùs folia, craſſis oblongis pediculis innixa, ternis plerunque ſegmentis, Apio aliquantùm conformibus, diviſa erant, & per oras inæqualiter crenata; faſtigiatim deſinebat in florem, multiplici foliorum intensè phœniceorum, aut ferè ſanguinei coloris, glomeratione in orbem congeſtum, è quo petiolo ſublatus, alius minor pleniflorus attollebatur, unde nimis laſciviens vi ſeminis fruſtrabatur. Cluſ. 243. fol.

Germ. Aſiattiſcher Hannen=Fuß länglichter Wurtzeln / mit vollen und blut=rothen Blumen / deren eine durch die andere wächſt.

### II

RAnunculus Aſiaticus, grumoſâ radice, flore pleno ruberrimo. Radix priori conformis eſt, folia ſtrigoſiora per oras evidentius inciduntur, flos ruberrimus coccineum colorem affectat, multiplicium foliorum ſtipatu mirè confarctus, ſine ſeminum ſucceſſione tandem flacceſcens. Cluſ. 243. fol.

Germ. Aſiattiſcher Hannen=Fuß / mit länglichten knöttichten Wurtzeln / und ſehr rothen Blumen.

### III

RAnunculus Creticus, grumoſâ radice, flore niveo. Radix prioris æmula erat, folia multifidis oblongis lacinijs Ranunculos exprimebant, flos in caulis cacumine nivei candoris, ſena lata folia, ſubtùs per oras modicè rubentia, circa capitellum nigropurpureum villis denſis, obſcuro viroris pallore tinctis, cinctum, explicans.

Cluſ. 242. in textu & Curis poſterior fol. 25.

Germ: Aſiattiſcher Hannen=Fuß / mit länglichten knöttichten Wurtzeln / und ſchnee=weiſſen Blumen.

### IV

RAnunculus Aſiaticus, grumoſâ radice, flore phœniceo rubro ſimplici. Radicis caput multos grumos dependentes ſpargebat, caulis pedalis erat triplex, cui quina oblonga foliorum craſſiuſcula ſegmenta, conjugatim juncta, longis craſſis pediculis nixa, inhærebant, per margines inciſa, glabra & virentia; flores ſingulatim faſtigia caulium occupabant, lacinijs aliquot herbaceis anguſtis ſuffulti, quinis latis folijs, & circa oras aliquantùm fiſſis, phœniceo rubro intenſiore perfuſis placentes; quorum meditullij caput, in longitudinem proturberans, ſeminum ſterilium rudimentis obſitum, innumeris ſtrictis villoſis rubris ſtaminulis, quæ apicibus craſſiuſculis faſtigiabantur, circumſepiebatur. Cluſ. Ranunculi Aſiatici, qui Polyklonos dictus, radice grumoſâ, tit. fol. 241.

Germ. Aſiattiſcher Hannen=Fuß / mit länglichten knöttichten Wurtzeln / und rothen einfachen Blumen.

### V

RAnunculus Aſiaticus, grumoſâ radice, flore flavo, rubris venis diſtincto. Pedem altus erat, radicibus priori conformibus, folijs ad Ranunculi Echinati foliorum diviſuram accedebat, in tres plerunque & quandoque plures lacinias, per oras inciſas, diremptis, hilariè viridibus; inter quæ terni cauliculi, ſinguli, ſerunt flores novenis latis rotundis folijs, ſibi invicem per latera incumbentibus, flavis, & radijs ſeu venis rubris ſtriatim virgatis: capitellum meditullij ex obſcuro cœruleo colore, rubro permixto, variegatum, multis in orbem ſub viridi pallore infectis villis ſeptum eſt, ſine ſemine utili mareſcens.

Cluſ. Curis poſter. 26.

Germ. Aſiattiſcher Hannen=Fuß / mit länglichten knöttichten Wurtzeln / und bleich=gelben Blumen / ſo mit rothen Adern hin und wieder underſchieden ſeynd.



II. Geranium Macrorhizon.

I Geranium Sanguinarium.

III. Geranium Tuberoſum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

GEranium ſanguinarium ſeu Hæmatodes Tabernæmont. Geranium VII. Hæmatodes Cluſij. Radicem habebat rubeſcentem, oblongam, ſurculoſam, & lateralibus propaginibus ſe ſpargentem, è quâ aliquot proſiliebant caules, per intervalla nodoſi, circa quos pari ſitu in longis pediculis folia quinque partitim profundè fiſſa, & ſubindè in alia minus profunda ſegmenta diviſa, Ranunculi pratenſis lutei modo, ſupernè virentia, infernè ſubincana, aut ſæpiùs cum caule omninò rubentia: pares pediculi ſingulatim flores fulciunt, Geranio Batrachioidi cœruleo conformes, ſed ampliores, ſtaminulis meditullij capitulum mucronatum obſeptum cingentes, quod denique in noſtrum pentagonum abit, inferiore parte tumeſcentes utriculos ſemina obvolventes continens, quæ per maturitatem ſe circumvolventibus mucronibus ſpontè exiliunt, ut benè Cluſ. annotat. Cluſ. fol. CII.

Germanicè, Blut-Röslein / Blut-Wurtz / Schnabel-Kraut. Tabern. fol. 449. lib. 2.

### II

GEranium Macrorrhizon, ſeu longius radicatum, Lobel. Satis prolixis, craſſiuſculis, fibratis, & varijs propaginum flexibus ſe diffundentibus radiculis, ac veluti ſuperiùs ſquamatis, rubentibus, præditum eſt; caules articulati cubitum æquant, quibus, in longis firmis pediculis, folia ſubhirſuta quinque partita, Geranio Batrachioidi cœruleo minus fiſſa, odorata, appenduntur; flores ramulorum ſummitatibus faſciculatim inſident, è rotundo tenui ſtriato utriculo emergentes, quinis purpureorubentibus rotundis folijs circa ſtaminula ſtylum longum exertum, incurvatum, & apice capillato faſtigiatum, diſpoſita: ſemina huc uſque ſedulò me obſervantem eluſerunt Dodon. Geran. Montan. nomine, 63. & 64. fol.

Lobel. 376. Obſ. | Phytopin. Bauh. 636.

Germanicè, Bergſchnabel-Kraut mit länglichten Wurtzeln / und purpur-rothen Blumen.

### III

GEranium tuberoſum Herbariorum. Radices, è fuſco nigricantes, Anemonum more protuberabant, parùm fibratæ, caulis nudus erat, & longis ex intervallis nodoſus; ab hoc folia longis pediculis ſubvehebantur, Geranio Batrachioide magis ab uno centro multipliciter diſſecta, & ſubincana: flores, in ſummis brachiatis ramulis eminentes, quinque folijs bifidis, purpureo violaceis, præcedenti Geranio paulò amplioribus, conſtant: ſemina Geranio ſanguinario conformia ſunt, roſtris in lunatam formam ſe contrahentibus eruptura.

Dodon. 61. fol.
Lobel. 377. Obſ. Adv. 297.
Lugdunenſ. 1276.
Epit. Matth. Camer. 599. fol.
Hort. Med. Cam. 66. & 67.
Matth. C. Bauh. 621.

Phytopin. 637.
Germanicè, Storchſchnabel-Kraut mit knöttichten Wurtzeln und purpur-braunen Blumen.
Tabern. Geranij ſexti nomine, fol. 149.
Matth. Cam. Germ. 297.
Durant. 418.



II.
Anemone latifolia flore cocci-
neo plena.

III.
Anemone latifolia purpureo ru-
bescens Simplex

I.
Anemone tenuifolia flore
purpureo violacea.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ANemone tenuifolia, flore purpureo violaceo. Anemone hortenſis tenuifolia ſecunda fl. ſimplici Cluſ. Folia longis pediculis à radice, prolixè fibratâ, craſsâ, obliquè hinc & indè procedente, & foris è fuſco nigricante, nodoſâ, ſurriguntur, crebris inciſuris dilutè viridibus, Oenanthen ſeu Bulbocaſtanum æmulantia, paulò latioribus tamen particulis conſtantia. Caulis inter ea viſitur ſimplex, rotundus, & leviter lanuginoſus, non longè à floris faſtigio ternis multifidis ſegmentis ſeptus, in ſummo florem ferens, Roſis majoribus amplitudine nihil cedentem, latis purpureo violaceis folijs aliquot, ſubtùs lanuginis pube quodammodò obſitis, ſtamina nigricantia, meditullij capitulo villoſo concolori circumjecta, amplectentia.

Dodon. 431. fol.
Cluſ. fol. 255.
Lobel. Obſ. 145. Anemones tuberoſâ radice titulo.

Lugdunenſ. 846.
Phytopin. C. Bauh. 314. fol.
Germ. Schmalblätterichte purpur veil braune (Anemone.
Tab. Anemon. 4. nomine, fol. 90. lib. 1.

### II

ANemone latifolia, flore coccineo ſimplici. Folia, à radice variè tuberoſâ, nigreſcente, & multùm fibratâ, fractúque facili, elevata, Anemonen tertiam hortenſem Cluſij, aut Aconitum Lycoctonum aliquantùm referunt, lata, & ternis particulis ambitu inæqualiter ſerratis ac fiſſis diſterminata: caulis unus aut plures, ſingulares, pedales, paulò ſuperiùs triplici laciniarum cinctu obſidentur, inde, graciliore ſpecie procedentes ad florem coccinei coloris, circinatim medium, è fuſco nigricans, capitulum multis folijs ſtaminulis pallidè virentibus ſeptum, circumdantes.

Germ. Breit-blätterichte Anemonen-Röslein / faſt auf Chermeſin-Farbe.

### III

ANemone latifolia, purpureo rubeſcens plena. Omninò ferè quadrat cum deſcriptione Cluſianæ Anemones hortenſis latifoliæ ſimplicis tertiæ. Folijs eſt initiò Diapenſiæ æmulis, mox magis inciſis, multifidis; caulibus aliquot ſimplicibus, nudis, pedem altioribus, pallidè virentibus, tenuiter lanuginoſis, mediâ parte ternis foliaceis lacinijs obſeſſis; cacumina ſingula flores, numeroſa folia habentes, exornant, interiùs dilutâ miſtâ rubedine purpurâ nitentes, & medium caput fuſcis ſtaminulis, quæ apicibus cœruleis faſtigiata ſunt, cingentes; quod denique flore effluxo intumeſcens, plurima lanugini annexa parva ſemina, ventorum flatibus diſpergenda, exhibet: radices, variè protuberantes, foris nigricant, intùs albeſcunt, ſubtùs fibris ſe firmant. Sic multiplici foliorum ſerie tantùm à dictâ Cluſianâ variare videtur.

Familiaris Dodon. 431. ubi ſimplicem Cluſij pingit.
Cluſ. 249.
Lobel. Obſ. 147. Adv. 114.

Germ. Breit-blätterichte Anemonen-Röslein / mit purpur-rothen gefüllten Blumen.
Quadrat ad Tabernæm. 3. Anemones faciem, fol. 90. lib. I.



II
Anemone hortenſis flore pleno cocci
neo variegata latifolia

I
Anemone flore multiplici
coccineo colore tenuifolia.

III
Anemone simplex latifolia dilu
pupurascens

IIII
Anemone hortensis latifolia flore
flavo duplicato

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ANemone flore multiplici coccineo, tenuifolia. Nodoſâ conſtat radice, aliorum congenerum Anemonarum modo, atque ex Ochri colore nigricante, multúmque foris fibratâ; inde folia in longis porriguntur pediculis, tenuiter laciniata, multifida, viridia Cicutariæ aut Bulbocoſtani facie: flos cubitalium rotundorum caulium (quos ſuperiore parte aliæ Ranunculi pratenſis erecti æmulæ laciniæ ambiunt) faſtigia ſingulatim obſidet, coccineo rubore ſuperbiens, latioribúſque externis folijs alia tenuia, numeroſa, conferta, & in orbem conglomerata cingens, & Joachimici taleri magnitudinem æquans, cui ſemina, cognato generi ſimilia, licet rariùs, ſuccedunt.

Dodon. 432. Anemones quartæ titulo.
Lobel. 145. Obſ.
Cluſ. 263. fol.
Lugdunenſ. 848. fol.
Phytopin. C. Bauh. 314. fol.
Germ. Hoch-rothe volle ſchmal-blätterichte Anemonen-Röslein.
Tabern. 91.

### I I

ANemone hortenſis, flore pleno coccineo, latifolia. Anemones hortenſis, quæ Pavo major Cluſio dicta, faciem habebat, & folia Saniculæ folijs ampliora, caulis media pars æquè lacinijs latioribus, ac obſcurè coccineis maculis ſparſim infectis, cingebatur: flos priorem & elegantiâ & magnitudine ſuperabat, denſâ foliorum oblongiuſculorum ſerie in orbem coactus, cujus umbilico capitulum pallidum, villoſis ſubcœruleis apicatis ſtaminulis obſitum, inſidebat: radix nigricans inæqualiter protuberabat, à cognatis ſpeciebus non aliena.

Cluſ. 262. | Phytopin. C. Bauh. 316.

Germ. Breitblätterichte Anemonen-Röslein/roth mit vollen Blumen von Conſtantinopel.

### I I I

ANemone ſimplex, latifolia, dilutè purpuraſcens. Radicis color ad nigredinem tendebat, folia Saniculæ folia affectabant, dilutè virentia, caulis dodrante altior, mediâ parte lacinijs ſeptus, & in ſummo faſtigio flore hilarè purpuraſcente, atque unguetenus albeſcente, capitellúmque, ſordidi coloris, ſtaminulis concoloribus obſeſſum, ambiente. Semina congenerum ſpecierum formam referunt.

Germ. Einfache breit-blätterichte Anemonen-Röslein/ mit ſchönen purpurfarben Blumen/ und weiſſen Boden.

### I V

ANemone hortenſis, latifolia, flore flavo duplicato. Radicem æquè tuberoſam obtinebat, à quâ emiſſi nodoſi proceſſus ſuſtinebant pediculos oblongos, fulcientes folia ferè orbiculata, & ambitu ternis plerunque altioribus inciſuris & crenis ſuperficialibus prædita; à lacinijs ſuis bifidos in ſummo flore oſtendebat, luteo flaveſcentes, quibus ſemina, cognatum genus prodentia, ſuccedunt. Vid. Cluſ. fol. 248.

Germ. Breit-blätterichte/bleich-gelbe Anemonen-Röslein mit doppelten Blumen.

# *SECUNDUS ORDO*
# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.


IIII Hyacinthus Stellatus
flore coeruleo:
II
Arum latifolium:
I
Arum:
III Colchicum Vernum
flo pleno purpureum:

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ARum, Dracontea minor, Pes vituli: panditur folijs latioribus, non maculatis, ex pallido herbaceis, planta ſeſquipedalis, ſcapis evaginatis, qui involucrum promunt, in turbinem mucronatum, piſtillum purpurâ rutilantem ambiens: hoc decidente, botrus ſuccreſcit, uvis in acinorum veſtigijs depreſſis, croceo rubentibus. Radice firmatur craſsâ, tuberosâ, inſtar bulbi ovalis, circumcircà & ſuperiore parte numeroſis & diffuſis albis fibris circumvallatâ.

German: Aron / teutſcher Ingwer.

### II

ARum latifolium minus: ſine piſtillo, involucro & ſemine, folijs ſagittam referentibus, certis venulis ad peripheriam obtuſam protenſis: radice nititur tuberosâ, oblongâ, multis propaginibus tenuibus ſtipatâ.

Ari hiſtoria legitur apud Dodonæum, fol. 318.

Lobel. Obſ. 325. Adverſ. 260.
Lugdunenſes, fol. 1597.
Matth. Caſp. Bauh. 448. fol.
Hort. Camer. 22.
Germanicè, Aron.

Germ. Tragum, fol. 295.
Fuchſ. cap. 22.
Matth. Camer. 192.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 418.
Durant. 95.

### III

COlchicum vernum, flore multiplici, pleno: nudo cauliculo aſſurgit, paucis folijs, prope flores, in ſummitate confertim congeſtos, ex albo purpurantes, cum ſtaminibus, flavo apice præditis.

Lobel. Adverſ. alterâ parte, fol. 500.
Cluſ. lib. 2do, fol. 202. Et in Appendice alterâ, ſub titulo Colchici verni.
German: Gefüllt liecht-roth Frülingzeitloß.

### IV

HYacinthus ſtellatus, vulgaris, vernus, Martius, Liliflorus: ex bulbo capillato, tenui & flexuoſo viridi caule, quinque plerunque foliorum, exit floribus cæruleo purpureis, ſimilitudine radiantium ſtellarum, ſtaminibus luteis.

Lobel. Obſ. 51. Adverſ. 48.
Lugdunenſ. 1515.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 184.

Hort. Camerarij, pag. 76.
Germ. Gemeiner blauer Stern-Hyacinth.
Fuchſ. cap. 225.


IIII
Pſeudo Narciſſus albus calice luteo.
V
Hyacinthus Botryoides flore incarnato.
III
Pſeudo Narciſſus totus albus
I
Hepatica aurea flore pleno & cœruleo.
II
Hepatica Aurea flore albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

HEpatica aurea, ſeu nobilis, & Trifolium aureum, Polyanthos floribus purpureo cæruleis.
Dodon. fol. 1569.
Lobel. Obſerv. fol. 497.
Lugdunenſ. fol. 1274.
Cluſius, lib. ſexto, fol. 248.
Germanicè, Geel gefüllte gülden Leber-Kraut.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 226.

II

HEpatica aurea, flore albo explanatō majore.
Dodon. fol. 569.
Lobel. Obſerv. fol. 497.
Lugdunenſ. fol. 1274.
Cluſ. lib. ſexto, fol. 248.
Germanicè, Gülden Leber-Kraut mit weiſſen Blumen.
Tabernæmont. lib. ſecundo, 225.

III

PSeudonarciſſus montanus, floribus ex toto albis.
Cluſ. in alterâ Appendice, & in Curâ poſteriori, fol. 14.
Germanicè, Weiß Berg-Joſephs-Stab.

IV

PSeudonarciſſus montanus, calice luteo, floribus albis.
Cluſ. in Curâ poſteriori, fol. 61.
Germanicè, Weiſſer Joſephs-Stab mit einem gelben Kelch.

V

HYacinthus Botryoides minor, flore incarnato, & tertius.
Cluſij fol. 181. lib. ſecundo.
Germanicè, Leibfarber Trauben-Hyacinth.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 316.



III.
Crocus Vernus
flore violaceo.
II.
Crocus Vernus flore
candido.
V.
Hepatica Aurea
flore rubro.
I.
Scilla Alba.
IV.
Hepatica Aurea
flore coeruleo

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

SQuilla, Cæpa marina, Scylla, fœmina major: cubitalis, exurgit folijs liliaceis, viridibus, denſis, reflexis: in quorum medio caulis teres & glaber ornatur floribus ſtellatis, ex albo pallidis: Bulbus eſt craſſus, albicans, laminoſus, capillamentis craſſioribus deorſum fibratus.

Dodon. fol. 679.
Lugdunenſ. 1576.
Lobel. Obſerv. 75.
Adverſ. 57.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 172.

Matth. Epitom. Camer. 374.
Matth. Caſp. Bauhini, 453.
Horto Camer. 153.
Germanicè, Weiß Meer-Zwiffel.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 318.

### II

CRocus vernus, Major Alpinus, Tenuifolius, floribus candicantibus &c.

Dodon. 215.
Cluſ. Append. altera.
Germanicè, Frůling-Saffran mit weiſſen Blumen.

### III

CRocus vernus, Tenuifolius, Alpinus ſylveſlris: conſtans floribus foliorum ſeptenorum, octenorum, violapurpureis &c.

Dodon. 214.
Lobel. Obſerv. 68.
Lugdunenſ. 1535.

Germanicè, Purpurbraun Frůling-Saffran.
Tabernæmont. lib. quarto, fol. 334.

### IV

PRope terram, ſuis explicatur trifolijs, Aurea Hepatica: floribus ſubinde altior, pediculis pendulis cæruleis explicatis: ſtaminibus alboluteis &c.

Lugdun. 1274.
Matthiol. Camer. 292.
Germanicè, Edel/ oder gulden Leber-Kraut mit blauen Blumen.

Hieron. Bock, 167.
Tabernæmont. 225. lib. ſecundo.
Durante. 1013.

### V

RArior ſequitur, caule, uti aliæ hujus generis, vidua: ex radice tenui multa capilloſa Epatica Aurea: trifolijs profundius exciſa. Floribus ſeptenis rubris.

Dodon. 569.
Lobel. Obſerv. 469. Adverſ. 382.
Matth. Caſp. Bauhini, 611.
Cluſius 248.

Matth. Epitome Camer. 585.
Horto Camer. 172.
Germ: Edel Leber-Kraut mit rothen Blumen.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 225.



II.
*Hyacinthus Orientalis maior. violaceo colore.*

I
Hyacinthus Orientalis maior flo: cœruleo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HYacinthus major, Polyanthos nobilis orientalis dictus: floret colore cæruleo, floribus quadraginta plus productis majuſculis: funditur folijs virentibus ex radice purpurâ albeſcente: gignitur ſparſis capillamentis.

Germanicè, Orientaliſcher blauer Hyacinth.

### II

HYacinthus Orientalis Major, floribus obſcurè colore violaceis effertur, nec non folijs anguſtis, carinatis, elatis.

Dodon. fol. 216.
Lobel. Obſerv. fol. 54.
Adverſ. 48.
Lugdunenſ. fol. 1508.
Cluſius, fol. 174.
Epitome Matth. Camerarij, fol. 800.
Germanicè, Veilbrauner Orientaliſcher Hyacinthen-Blum.
Camer. in Matth. æditione Germ. fol. 368.


I.
Hÿacinthus Orientalis
flore purpureo albus.
II.
Hÿacinthus Orientalis
flore niveo.
IV.
Hÿacinthus parvus
ſtellatus vernus.
III.
Hyacinthus Orientalis
flore cinereo albus.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

HYacinthus Orientalis, flore purpureo albus, lineas obſcuras eminentes introrſum ducit, radijs ſex vel ſeptem multiplicatis, folijs latioribus porraceis, caule terete.

Germanicè, Mertzen-Blumen / oder frembder Hyacinth / mit veil-braunen weiſſen Blumen.

II

HYacinthus Orientalis flore albo: folia anguſta erecta, caulem rotundum producit longiorem.

Germanicè, Frembde Hyacinthen-Blumen gantz weiß.

III

HYacinthus Orientalis, flores mittit ex cineritio albos, verſus caulem angularem quodammodò obſcuriores, folia paulò anguſtiora craſſa.

Germanicè, Frembder Hyacinth / mit Aſchen-farben weiſſen Blumen.

IV

HYacinthus parvus ſtellatus, Vernus: foliola florum ſex mittit candida, ad quælibet, in interiore parte exurgit capillamentum cæruleum, cum piſtillo, in medio floris cujuslibet, erecto, coloris obſcurè azurei.

Obſervantur præſcripti Hyacinthi
à Dodon. fol. 216.
Lobel. Adverſ. 48.
Append. Adverſ. alterâ parte, fol. 408.
Cluſius, fol. 175.
Horto Camer. 76.

Germanicè, Blauer Stern-Hyacinth / der Kleinſte.
Germ. Matthiol. Camer. 368.
Tabernæmont. fol. 314. lib. ſecundo.
Durante. 460.



III. *Hyacinthus Orientalis mixtus.*

I. Ornithogalum minus.

II. *Hyacinthus Orientalis variegatus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

ORnithogalum minus , ſeu Leucanthemon : anguſtis folijs , præter flores candidos , tranſcendentibus , & reflexis , naſcitur imbricatis : bulbo , cum multis minutis agnatis , capilloſis , cirratis , deſcendente &c.

Cluſ. Append. 258.

Germanicè , Weiß Stern-Blumen / die Kleinſte.

### II

HYacinthus Orientalis , variegatus , polyanthos , cubitalis : ſuperbit folijs erectis viridibus : inter quos medij caules , floribus peramœnis oppoſitis , antè quidem Phœniceis , exterioribus reflexis oris , ſubtus verò rubentibus caliculis , ſunt donati.

Germanicè , Orientaliſcher Braun-rother Hyacinth.

### III

EÂdem elegantiâ hic Orientalis Hyacinthus ornatur , in hoc differens , quòd floribus , ad oras retorſis , anterius quidem albeſcentibus , aversâ verò parte purpuraſcentibus , ſuavem odorem ſpiret.

Germanicè , Blau-und weiß-gemiſchter Orientaliſcher-Hyacinth.

Repetantur huc Autores , quorum in Orientalium Hyacinthorum , ordine ſecundo vernalium folio 4. mentio facta eſt.


III
Hÿacinthus Orientalis
argenteo colore.
II
Hÿacinthus Orientalis.
V.
Tulipa præcox.
I
Bulbus ſÿlvestris seu
Ornithogalum luteum.
IV
Tulipa præcox

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

BUlbus ſylveſtris anguſtifolius, & Ornithogalum tertium luteum, floribus ſtellatis, exterius herbaceis, verſus ſtamina luteis, quæ capilloſa corpuſcula habent rotunda, radicibus tuberoſis, oblongis.

Dodon. fol. 222.
Lobel. Adverſ. 56.
Lugdunenſ. 1583.
Cluſ. Rariorum plant. lib. ſecundo, fol. 188.
Germanicè, Feld-oder Acker-Zwiffel.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 321.
Fuchſ. 60.

### II

HYacinthus Orientalis, floribus obſcurè purpuraſcentibus, interius albicantibus, conſtat.

Germanicè, Orientaliſche-Braun-Hyacinth-Blum.

### III

HYacinthus Orientalis, floribus colore argenteis.

Dodon. fol. 216.
Lobel. Obſervat. fol. 54.
Adverſ. fol. 48.
Lugdun. fol. 1508.
Cluſius, fol. 174.
Matth. Epitome Camerarij, fol. 800.
Germanicè, Silber-farbe Hyacinthen-Blum.
Camerar. Matth. fol. 368.

### IV

TUlipa præcox, floribus rubeis, in album & luteum langueſcentibus.

### V

TUlipa præcox, ex albo in luteum lineis oblongis rubeis.


II.
Hÿacinthus Serotinus facie orientali.
V.
Hÿacinthus Anglicus colore amethÿstino.
I
Hÿacinthus Anglicus
III.
Hÿacinthus Anglicus flore incarnato.
IIII
Hÿacinthus Anglicus colore violaceo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HYacinthus ſerotinus Anglicus, uberiore florum proventu creſcit cœruleorum, in caulibus nudis, erectis: quos tria aut quatuor circumdant porrecta, cum venis, carinata folia: bulbus, qui aliorum eſt Hyacinthorum, forma idem.

Germanicè, Blauer/ſpater Engliſcher-Hyacinth.

### II

HYacinthus, ſerotinus, ob flores albicantes, inter Orientales cenſetur & æſtimatur.
Germanicè, Spater weiſſer Hyacinth.

### III

ANglicus, Belgicus Hyacinthus, ab alijs hujus generis, flore incarnato, differt.
Germanicè, Leibfarber Engliſcher-Hyacinth.

### IV

SImili ratione, florum nimirum colore Ianthino, alius eſt hic Anglicorum Hyacinthorum unus, equidem lætior.

Germanicè, Amethyſten-farber Engliſcher-Hyacinth.

### V

SEquitur in ordine quintus, floribus obſcurè violaceis.

Autorum Botanographorum ſolertiſſimus,

Lobelius, horum Hyacinthorum meminit.
Adverſ. fol. 48.
Et alterâ Adverſ. appendice, fol. 487.
Caroli Cluſij Appendice alterâ.
Germanicè, Bleich Viol-brauner Engliſcher-Hyacinth.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 314.



III. *Palma Christi flor: purpur:*

I. Hyacinthus ſtellatus peruanus.

II. *Orchis minor flor: incarnato.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

HYacinthus Stellatus, Polyanthes, ex Peru: Exoticus, Rarus: Anno 1611. Menſe Majo, in viridario Illuſtriſſimi noſtri Principis Eyſtettenſis, è vivo Naturæ typo effigiatus, oriebatur, ad turbinem conglomeratis floribus, centum & octoginta quatuor numerum excedentibus, purpuracœruleis: ſtamina cuilibet florum foliolo inſidebant purpurea: in quorum medio capitulum, azurei coloris: his ſubſiſtebat caulis craſſior, nudus, herbaceus, folijs anguſtè mucronatis, circumroſis, craſſioribus, latè imbricatis, prope humum fuſis: firmabatur autem bulbo grandi, fuſcè albo, in infima parte craſſioribus fibris diffuſo.

Cluſius lib. ſecundo, fol. 182.
Lobel. Adverſ. alterâ parte, fol. 487.
Germanicè, Stern-Hyacinth auß Peru.

II

ORchis minor, folia fert latiuſcula, flores in cauliculo ſpicatos, ex albo incarnatos: pro radice, præter fibras extenſas, ſubſunt duo bulbuli oblongi, quorum unus altero major eſt, vegetior & ſucculentior.

Cluſius lib. ſecundo, fol. 268.
Epitome Camerarij, 622.

Germanicè, Klein Knaben-Kraut.

Fuchſ. cap. 216.
Tabernæmont. Buch 2. Blat 352.

III

PAlma Chriſti, Satyrij ſpecies, Serapias paluſtris: folia producit Plantaginis venoſa, herbacea: flores ex rubro purpuraſcentes: radices palmares, plenitudine & ſoliditate differentes.

Lobel. Obſerv. 92.
Lugdun. fol. 1562.
Epitome Camerarij, 626.

Germanicè, Händlein-Wurtz.

Tabernæmont. Buch 2. Blat 357.



III. *Muſcari flore obſoleto ni-gro.*

I. Hyacinthus Botryoides Maior.

II. *Muſcari flore obſoleto albo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HYacinthus Botryoides Major: ex albis bulbis, facilè ſe multiplicantibus, ſubtus fibris tortilibus, ſeſqui pedalis erigitur: folijs junceis, erectis, in ſummo ſtriatis: intra quæ cauliculi teretes, cum floribus, botrum æmulantibus, ex purpurâ cœruleis, altius & rectà tolluntur.

Hyacinthus hic, ob magnitudinem inſolitam & odorem, ſi quæ alia, pulchior exhibetur, Planta.

Dodon. 217.
Lobel. Obſerv. 55.
Lugdun. 1513. & 1511.
Germanicè, Groß Viol-braun Hyacinth.
Tabernæmont. fol. 316. lib. ſecundo.

### II

MUſcari, ſeu Hyacinthus Botryoides Chalcedonicūs, Dipcadus, ſuavioris odoris, & fragrantiæ aromaticæ, flore, obſoletè albo, graphicè delineatur.

Germanicè, Grau-weiſſer Biſam-Hyacinth.

### III

MUſcari, in foliorum benè virentium, faſtigiatorum, craſſorum, caule oblongo, rotundo, nudo, priori ſimili, terrâ tollitur: ſicut & floribus (ut urceoli) ſummitati caulium racematim affixis, qui ex colore pullo, & obſoletè cinereo, nigreſcunt, muſchum & aromatica ſpirantes.

Dodon. fol. 217.
Lobel. Obſerv. 55.
Lugdunenſ. 1513.
Cluſ. 179.
Epitome Matth. Camerarij, 373.
Matth. Caſp. Bauhini, 452.
Germanicè, Dunckel-grauer Biſam-Hyacinth.
Tabernæmont. fol. 315. lib. ſecundo.



III
*Ornithogalum me„ dium.*

I
Hÿacinthus ſtellatus Italicus.

II
*Hyacinthus Comosus Bizantinus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HYacinthus Italicus ſtellatus, ex tribus ſubtus capilloſis bulbis tres elidit caules, glabros, tenues, ſuperiore parte ſtellatis floribus ornatos. Quilibet autem florum petiolos ſuos habet protenſos: ex horum apicibus explicantur dicti floſculi radiati, colore cœruleo, inſitis ſtaminulis & capitello ex viridi luteis. Folia caules commitantur, dena plerúnque ſtriata, porracea, tenuia.

Germanicè, Italianiſcher Stern-Hiacinth.

### II

HYacinthus Byzantinus Comoſus, ex gradiore bulbo, tunicis ſuis adaucto, folijs carinatis, liliaceis, in acumine reflexis, quaternis aut quinis, caule rotundo, viridi, eóque nudo, altior aſſurgit. Ultra medium, floſculi, aſpergillum referentes, tintinnabulorum inſtar, in ambitu ſciſſorum, petiolis affiguntur, exteriùs quidem colore ſubfuſco obſoleto, interiùs verò albicantes, capitellis ad fundos eorundem nigricantibus.

Lugdun. 1512.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 180.
Germanicè, Dunckel-grauer Conſtantinopolitaniſcher-Hyacinth.

### III

BUlbi ſylveſtris Dodon: Deſcriptioni, hujus Ornithogali medij hiſtoria quadrare videtur: nititur enim cæparum figuram æmulo bulbo, capillamentis ſparſis ſuffulto: aſſurgentibus folijs anguſtis, longis, mucronatis, reflexis, viridibus. Ex caulibus evaginantur flores ſuis cum pediculis, foliolorum ſex numero explicatorum, interiùs candidorum, cum ſtaminibus ſpiſſis, ex viridi palleſcentibus: exteriùs verò floribus vireſcentibus.

Germanicè, Wittlart Stern-Blumen.



III. *Hyacinthus Hiſpanicus flore incarnato.*

I Ornithogalum Nea, politanum.

II *Hyacinthus Hiſpani, cus flore violaceo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ORnithogalum, Neapolitanum vocatum, Cluſio in Plantarum Appendice ſecundâ, vegetum, bulbo preſſiore, multis annatis & appendicibus albeſcente, folijs anguſtis, ſurrectis quodammodò, carinatis, viridibus, tollitur: Caule terete, glabro, ſex ordinum floribus conſpicuo. Flores, quia duplices, ſicque innati, erant pandi, externâ parte quidem ex flavo vireſcentes, internâ candidi: in quorum meditullio alter eſt floſculus cojens, cum ſtaminulis & ſtylo albis, apicibus flaveſcentibus.

Cluſius in ſecundâ Appendice.

Germanicè, Neapolitaniſche Stern-Blum.

### II

HYacinthus non ſcriptus, Hiſpanicus, Orientalis, Polyanthos, ſuaves & janthinos gerit odoratos flores, caulem graventes: folijs porraceis latis & carinatis: bulbo terete cæpaceo.

Lugdun. 1507.
Lobel. Obſerv. 53.

Germanicè, Liecht-braun Orientaliſcher Hyacinth.

### III

HYacinthus Hiſpanicus Polyanthos, ex rotundo proſilit bulbo: folijs flavo virentibus: caule oblongo, porrectis utrinque floribus, colore incarnatis.

Dodon. 216.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 177. Append. alterâ,
ad caput 25. aſſignatâ.

Germanicè, Leibfarb Blumen voll Spaniſch-Hyacinth.



II. *Muscari luteo flore.*

I. Muſcari obsoleto albo flore.

III. *Hyacinthus ſtellaris Bizantinus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

MUſcari majoris, Tibcadi Turcarum, Chalcedonenſis raritudo quædam eſt, atque ob id, de facie iſtâ, non omnibus innotuit: elegans utique exotica & nobilis planta, vomitoria: floribus albis obſoleſcens, qui, ut urceoli ampliores, cum ſuis pediculis, nudo cauli, coacervatim affiguntur, exterioribus roſæ formâ crenati, dilutè lutei: Anno 1611. quinquaginta numerum excedentes. Ita prope bulbum, tunicis atroluteis, vel luridis, amictum, à terrâ elevantur folia latiora, carinata, craſſiora, intensè viridia.

Germanicè, Chalcedoniſch-groß Trauben-Hyacinth.

### II

SUccedit huic, Muſcari, floribus palleſcentibus, ex Hyacinthorum ſeriè, pediculis Venetis, caulem glabrum racematim circumdantibus: foliis anguſtioribus: tabeſcentes flores aromaticum & Benjuoinum, quid fragrantius ſpirare incipiunt.

Dodon. 217.
Lobel. Obſer. 55.
Lugdun. 1513.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 178.
Epitome Camerarij 378.
Tabernæmont. 372.

Germanicè, Frembt Trauben-Hyacinth.

### III

HYacinthus hic Byzantiacus, ſtellaris, foliis adhuc latis, erectis, craſſis, viridibus, effertur ſeſquipedalis, ex parum oblongiore pullo bulbo. In caulibus uno atque altero tenuibus, utrinque ex ſuis petiolis flores cœrulei, radiatim diſpoſiti, explicantur, qui, ut folia habent decidua, relinquunt globulos poſt ſe palleſcentes acuminatos.

Lobel. notare hunc voluit Adverſ. alterius partis appendice, fol. 486. quamvis hic magnitudine excedat.

Germanicè, Conſtantinopolitaniſcher Stern-Hyacinth.


I
Hyacinthus candidiſſimus pleno flore.
II
Hyacinthus Orientalis ſeroti= nus erectis candidis floribus.
III
Hyacinthus Orientalis ſerotinus erectis et cæruleis floribus
IV.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno.
V
Hyacinthus Orientalis ſeroti= nus mixtus

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

QUòd tot ſpecierum, copioſâ ſobole, Hyacinthi quot annis varient, & multiplicentur, patet in præſentibus effigiatis utique perraris, qui parùm vel omninò non, ab indefeſſis Botanicis conſignati reperiuntur: ſicut in hoc primo videre licet, qui, cum Orientalis ſit, in caule exili, alto tamen & vireſcente, depromit florem foliolis cumulatum & plenum, totum candicantem, nutantem, aſpectu perjocundum & gratiſſimum.

Germanicè, Gefüllter weiſſer Orientaliſcher-Hyacinth.

II

NUmerum Orientalium adauget ſecundus hic Serotinus, floribus quidem niveis eſt erectis, mucronatis & ſubtilioribus.

Germanicè, Weiſſer/ Edler Orientaliſcher-Hyacinth.

III

ALius Orientalis ſerotinus Hyacinthus, caule ſurrecto pandens flores hilares & vividos, colore cœruleos.

Germanicè, Später Orientaliſcher Hyacinth/ mit blauen aufrechten Blumen.

IV

COngener ſequitur Orientalis alius, floribus etiam luxurians cœruleis & cyaneis, verùm plenis & refertis, unico cauli, tribus inſidentibus.

Germanicè, Blauer Orientaliſcher gefüllter Hyacinth.

V

HYacinthus Orientalis ſerotinus, mixtus & variegatus: exteriora enim florum folia & horum apices albeſcunt, parte, quâ pediculo adhæret, rubeſcente.

In hoc, ut in cæteris & prioribus, exigui momenti exiſtit diverſitas, quo ad colorem & formam, caulium, foliorum & bulborum, ſed ut plurimùm ſibi invicem conſimilia ſunt & eadem.

Germanicè, Orientaliſcher Hyacinth gemiſchter Farben.


Hyacinthus Orientalis
violaceo colore albis lineis
II.
Hyacinthus Orientalis flo
re duplici.
IIII.
Crocus vernus albus
fundo violaceo.
III.
Hyacinthus Orientalis reflex
folijs, colore violaceo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

EX Orientalium Hyacinthorum familiâ, Germanus hic, foliorum porraceorum, imbricatorum, pinguium, oritur bulbo cæpaceo, lentore ſuccoſo, uno caule, copioſos proferens flores, lætè purpureos & janthinos: ſummitatibus reflexis, virguliſq; obſcurioribus, ejuſdem coloris, ſignatos.

Germanicè, Orientaliſcher Veil-brauner Hyacinth mit duncklen ſtrichen.

### II

HYacinthus Orientalis, ubertate florum donatus, quos inſitos duplices gerit cœruleos, inferioribus ad pediculos partibus parùm virentibus.

Cluſ. in Curis poſterioribus, fol. 18.

Germanicè, Doppelter Orientaliſcher-Hyacinth.

### III

ALius Hyacinthus Orientalis, miram fagrantiam ſpirans, reflectitur floribus purpureis floridioribus violaceis, quilineis albicantibus dorſalibus rarâ venuſtate diſtinguuntur.

Germanicè, Satbrauner Orientaliſcher-Hyacinth geſtraifft.

### IV

INter verſicoloris Crocos vernos, ex duobus albis bulbulis, folijs gramineis, protenſis, viridibus: ſtrijs candidis depictis, & ex albido flore Hic exurgit, fundo amethyſtino.

Cluſ. lib. fol. 204.

Germanicè, Weiß Früling-Saffran mit Veil-braunen Boden.



II. Viola flammea maior violaceo colore mixta.

Hyacinthus ſerotinus maximus.

III. Viola flammea maior pallido colore mixta.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HYacinthus ſerotinus maximus, Cluſio à loco natali, unde miſſus fuit, Hiſpanicus dictus. Radix ei ſeſſilis, bulboſa, ex multis albeſcentibus tuniculis conſtans, rotunda, ſubtus plurimùm fibroſa: quæ emittit folia admodum longa, carinata, ſuccoſa, pallidi viroris, ſummitatibus mucronatis ſuis in gyrum flexibilia: è quorum medio bini ſurgunt cauliculi, ultra pedalem altitudinem, graciles, nudi, exhibentes quandoque flores ordine inæquali, per intervalla, juxta ſtrictiſſimas folioſas appendices, è pediculis brevibus deorſum nutantes, ſenis folijs preditos: externis quidem ſurſùm reflexis, interioribus verò quaſi intubulum coeuntibus. Color illorum valdè obſoletè ſpadiceus eſt, qualis plerumq; cervis eſſe ſolet, unde etiam vulgariter Hirſch-farbichte Blumen ejus flores indigitantur. Semen nondum videre licuit, alijs Hyacinthis par eſſe ferunt.

Videatur Cluſius lib. ſecundo plantar. hiſt. 177. C. 26.

Phytropin. Caſp. Bauhini, fol. 74.

Germanicè, Hirſch-farbe Blumen-Hyacinth.

### II

VIola flammea major violaceo colore mixta. Ex radiculâ parvâ, fibroſâ, caules plurimi emergunt, pedales, anguloſi, multùm ramoſi: veſtiti per intervalla inæquali ſitu, folijs laceæ ſeu Violæ tricoloris; viridibus, craſſis, rarius crenatis, & apophyſibus, ſecundum exortus ſuos valdè laciniatis: juxta quos laterales virgæ tenues in extremitatibus florem odoratum duplo vulgari majorem ſuſtinent, quinis folijs, quorum ſuperiora purpureo violacea; bina alia è latere umbilici extremis tantum oris ſuis hoc colore tincta ſpectantur, non ſecus ac folium inferius, quod cæteris latius eſt. Media verò pars luteo pallida umbilicotenus, tenuibus purpureis radijs notatur: Semen puſillum ſubrotundum, fuſcum, in capitulis laceæ vulgaris, maturitate in tres angulares particulas dehiſcentibus prodit, genus ſuum non denegans.

Vide Cluſ. lib. tertio, C. 13. fol. 310.

Germanicè, Groß welſch wol-riechend Freyſamkraut/mit bräunlichten geſprengten Blumen.

### III

VIola flammea major pallido, colore mixta. Superiori non diſpar, niſi folijs oblongioribus & flore flavo, oris foliorum purpuraſcentibus, & umbilicotenus radijs purpureis inſignita.

Vide Camer. in Hort. Med. fol. 178. ſub titulo Violæ montanæ grandifloræ.

Caſp. Bauhini. Phytopin. fol. 376.

Geſn. d. hort. pag. 256.

Meminit & ejus Camerar. in Matth. Germ. fol. 413.

Germanicè, Groß Welſch wol-riechend Freyſamkraut mit gelblichten Blumen/ ſo mit Purpurfarb vermiſcht.



I. Hÿacinthus Comoſus ſpurius.

II. Hÿacinthus Anglic, Cinericeus.

III Palma Chriſti maculata.

IIII. Dracunculus Aquatilis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I.

HYacinthus comoſus ſpurius. Hyacinthus comoſus major Lobel. & Cluſ. Tantùm non cubitalem attingebat altitudinem, à radice bulbaceâ, turbinatâ, foris tunicâ ſubrubente involutâ, & circum ſedem craſſè fibrata: folia terna prolixa, craſſa, ſucculenta, porraceis folijs latiora, & aliquantùm carinata, ac ſummitatibus ſuis anguſtioribus reflexa, aliqua parte caulem medium exeuntem amplectuntur, herbaceum, lævem, rotundum, quem à ſuperiore parte, uſque ad faſtigium comoſum, oblongiuſculi turgentes in pediculis circumdant floſculi, oris extremis leviter denticulati, cœruleo-purpurei, quibus tandem ſubnaſcitur in membranaceis capitulis ſemen rotundum, exiguum, nigrum.

| | | |
|---|---|---|
| An. Dodon. 218. | Epit. Matth. Cam. 798. | Trag. cap. 71. lib. 2. Fuchs. 325. |
| Lobel. Obſ. 55. | Hort. Med. 76. fol. | Tab. 314. libro ſecundo. |
| Clus. 179. lib. ſecundo. | Matth. C. Bauh. 745. | Cam. Matth. Germ. 368. |
| Lugdu. 1512. | Germ. Groß Mertzen-Hyacint. | Durant. 459. |

### II.

HYacinthus Anglicus cinereus. Radix bulbacea, turbinatæ formæ, avellanæ minoris magnitudine, ſeſſili parte craſſè fibrata, albeſcens, folia erigit aliquot lætè virentia, graminea, anguſta, atque inter hæc caules dodrantales, in ſummo racematim flores nutantes cineracei coloris ferentes, qui effigiem minorem Hyacinth: Hiſpan. aut orientalis affectant, ſeu albi non ſcripti Dodon. cujus etiam ſemina referant.

Germ. Aſchenfarber Engliſcher Hyacinth.

### III.

PAlma Chriſti maculoſa. Radices pulpoſæ, bifidæ, geminatæ, paucas annexas craſſas fibras è capite emittentes, caulem ſurrigunt arctè obſeſſum folijs ternis, è latitudine ſenſim in acutum deſinentibus, diluto virore ſplendentibus, & ſuperiùs ſaturatè purpureo-ſanguineis maculis infectis: flores cucullati ſunt, folia bina ſurſùm exerentes, purpurei coloris, quaſi aliquot punctis notati, denſam oblongam ſpicam conſtituentes, quibus ſemina, ſcobis inſtar, in oblongis capitulis ſubmittuntur.

| | |
|---|---|
| Fortè Dodon. 240. Satyrij Baſilici fœminæ (nomine. | Matth. C. Bauh. 638. |
| Lob. Obſ. 90. Adv. 63. | Germ. Purpur-farb Händlein-Wurtz. |
| Epit. Cam. 626. | Fuchs. 271. |

### IV.

DRacunculus aquatilis. E ſingulis radicis repentis, & ſubtùs per intervalla tenuiter fibratæ articulis, pediculi aliquot teretes, fungoſi, folia cyclaminis, è rotunditate in perbrevem mucronem finientia, attollunt: fructus in alio pediculo pari, eminentiore tamẽ, è ſinu folij paulò ſuperiùs elevatur, racematim compactus, viridis, exilibus candicantibus ſtaminulis circumquaq; obſitus, & baccis maturitate rubeſcentibus turgens, ari baccis paulò minoribus, in quibus ſingulis ſemen rugoſum, paulò oblongum, craſſo ſucco, contentum.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodon. 329. Cœſalpin. lib. 5. c. 40. fol. 229. Lobel. Obſ. 328. Adv. 261. | Lugdunens. 163 Epit. Matth. Cam. 362. Matth. C. Bauh. 446. | Germ. Klein Waſſer Schlangen Kraut. Fuchs. c. 86. Tabern. 417. lib. ſecundo. | Matth. Cam. 191. Durant. 333. fol. |

*TERTIUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.



II

Narciſsus totus luteus, monta, nus, minimus.



III.

Colchicum Vernum, flore purpureo plenum.



I.

Narciſſus totus luteus montanus maior.



III

Hÿacinthus Botryoides cœruleus.



IV

Hyacinthus Botrÿodes floribus albis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

NArciſſus ſylveſtris montanus, ad vivum expreſſus, ab alijs Pſeudonarciſſus nominatur. Major quidem, altiùs aſſurgit, folijs Porri ſimilitudine parùm latioribus, duobus, aut pluribus, ex uno bulbo albo enatis: floribus in cacumine caulis palleſcentibus, in ſex folia, decuſſatim ſtellata, dividuis, quorum centro calix tubulatus, protenſus oris reflexis, explanatis, totus luteus exit.

Lobel. Obſerv. 61. Adverſ. 51.
Lugdun. 1523. Cluſ. lib. ſecundo, fol. 65.
Germanicè, Der groß gelb Joſeph-Stab / oder Hornungs-Blumen.

### II

HUic ſuccedit Pſeudonarciſſus minor, montanus, ab alijs Hiſpanicus dictus, folijs, bulbo & flore, idem cum priore, verùm multò minoribus, calice auroluteo.

Lobel. Obſerv. 63.
Cluſius ut ſuprà.
Germanicè, Klein / gelber Berg-Joſeph-Stab.

### III

COlchicum Polyanthos Majus, paucis cognitum, nedum delineatum, ex bulbo albido, annotato ſibi annexo, convolutis folijs, in ſuperiore umbone flores edit multiplices, ex cœruleo purpuraſcentes, ſtolonibus & filamentis ſubcroceis.

Germanicè, Groß Purpur-farb gefüllter Erüling-Zeitloß.

### IV

HYacinthorum ſpuriorum unus, Minor vulgaris, racemoſus, Dipcadus Italis indigitatus, flore cœruleo.

Lugdun. 1511.
Germanicè, Gemein Trauben-blauer Hyacinth.
Fuchſ. 225.
Tabernæmont. lib. ſecundo, 315.

### V

NOn aliâ differt ratione, hic Hyacinthus Botryoides ab alijs, niſi quòd florum colore candicet.

Dodon. 217.
Germanicè, Weiß Trauben-Hyacinth.



II. Narciſsus medio luteus.

I. Narciſſus maximus medio purpureus.

III. Narciſsus medio purpureus.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

NArciſſus Maximus, medio purpureus, aut cœruleus, latifolius, Hiſpanicus dictus: ex pullo, ſicut duo ſequentes, bulbo aſcendit ſeſquipedalis, folijs praſinis craſſiuſculis, intra quæ teres caulis, ſuperius vaginatus, emittit pediculum & florem, ex cœruleo albicantem, ſex foliorum, quorum medio, membrana argentea, colore, cum fimbriâ crocoaureâ, ſtolonibus ſeſſilibus luteis, annexa eſt circularis.

Germanicè, Spaniſch groß Narciſſen-Röslein.

### II

NArciſſus, calice luteo tenerior, intra ſua folia porracea, latiora, ex duobus caulibus geminos protrudit flores candidos, qui in calicis medio, orbiculo & ſtolonibus luteis, glandulas repræſentantibus, tribus plerunque adornatur. Hujus odor fragrat ſuavis & feriens.

Germanicè, Gelb wol-riechende Narciſſen-Blumen.

### III

PRimum hujus Numeri, Narciſſus iſte æmulatur colore, inſuper latifolius: floris mediâ parte purpureus, quo etiam multiplicatur: ſic enim gemini caules, geminos cum petiolis augent flores, ex vaginâ enatos, calicibus parùm repandis, oris elatis ſubcroceis.

Dodon. 223.
Lobel. Obſerv. 60.
Adverſ. 50.
Lugdun. 1517.
Cluſ. 156.
Camerarij Epitome 951.
Matth. Caſp. Bauhini, 858.



III
*Narciſsus Juncifolius luteus flo: pleno.*

I.
Narciſſus maior flore multiplice.

II.
*Narciſsus ſylveſtris ſtellatus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

IN floribus medio purpureis, ex membranaceo caulis ſolliculo enatis, fœcunda hæc Planta cubitalis, uberiùs multiplicatur Narciſſus Major, medio calicis melino colore: caulibus erectis: folijs oblongis, carinatis, craſſioribus: bulbo, cum annatis, pullulante.

Dodon. fol. 224.
Lobel. Obſerv. 61.
Lugdun. 1520.
Cluſ. 161.

Germanicè, Groß gefüllt Narciſſen-Roſen.

### II

QUi decuſſatis florum folijs, uno caule, prodit acutioribus, ſubluteis, Narciſſus ſylveſtris & ſtellatus hic nominatur, inodorus: habens oblonga, carinata, rotundiora & anguſta folia: bulbum cæpaceum.

Dodon. 227.
Lobel. Obſerv. 62.
Adverſ. p. alterâ, 489.
Lugdun. 1523.

Germanicè, Gefüllt Stern-Joſeph-Stab / gelb.

Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 306.

### III

ELegantior ſurgit hic Narciſſus, luteis, odoratis, duobus & pluribus, ex unico caule prodeuntibus, ijsque plenis floribus: folia longa, juncis flexibilitate, levore & colore, æmula efferens.

De hoc Narciſſo

Autorum copiam videre licet, in quartâ tertij Ordinis Vernalium iconum ſequente Narciſſorum juncifoliorum ſerie.


I.
Narciſſus maior Iunci, folius.
II
Narciſſus Iuncifolius la, tiore calice.
III
Narciſſus minor Iunci folius
IV
Narciſſus minimus Iun, cifolius.
V
Pſeudo Narciſſus Iuncifo, lius.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CAule unico, rotundo, erecto, erumpit Narciſſus Major Juncifolius, interfolia (ſicut & ſequentes Narciſſi) juncis levore, flexibilitate, virididatéque ſimillima: Polyanthos autem eſt, floribus totus luteis, odoratis, circinatis, effuſus: ejus Bulbus major, cum altero, & alijs pluribus annatis, atque capillamentis deorſum ſparſis, pulliginis eſt colore.

Germ. Bintzenblätterichte groß Narciſſen-Röslen/ mit vilen gelben wolriechenden Blumen.

### II

LÆtus æquè exurgit Polyanthos hic Narciſſus Major Juncifolius, luteus, Alius quidem, quòd mucronata & longiora florum folia, calicem latum elatum ambiant, mirâ ſuavitate ſpirantia.

German. Bintzenblätterichte vil-tragende gelbe Narciſſen-Röslen mit einem braiten Kelch.

### III

TRium pluriúmve florum Narciſſus Minor, ex folijs itidem juncos imitantibus, flexibilibus, uno cauliculo, & ſuperius membranaceâ vaginâ proſilit, luteus totus, odorus.

Germanicè, Das kleinere Bintzenblätterichte gelbe wol-riechende Narciſſen-Röslein.

Horum Narciſſorum genuinam hiſtoriam, potius noſſe qui deſiderabit, adire poterit Coryphæos hóſce.

Dodon. fol. 226.
Lobel. Obſerv. 62. Adverſ. 51.
Lugdun. 1520. Cluſ. 159.
Tabernæmont. 303.

### IV

QUi minimus dicitur, Juncifoliorum Narciſſus, cum ſuo bulbulo terrâ ſe exerit, folijs haud humum ſparſis, at carinatis, rotundis, exilibus: Flore & calice paulùm elato & patente, luteo, citreus fragat gravius.

Lobel. Adverſ. ſecundâ parte, fol. 492.
Cluſius appendicis fol. 257.

Germanicè, Bintzenblätterichte kleine gelbe Narciſſen-Röslein.

### V

IUncifoliorum Minorum Ordini, adſignatur hic Pſeudonarciſſus Montanus: Flore quidem luteo, odorato, alato, fimbriato, turbinis inſtar, oris ampliato: ex cauliculo, ad floris conum, membranaceo involucro longius exporrecto.

Lobel. Appendice, fol. 461.
Lugdun. fol. 1521.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 166.

Germ. Wild/falſch Bergbintzel-blätterichte Narciſſen-Röslein/mit groſſen überlängten Kelch.


I.
Narciſſus Septentrionalis flo pleno luteo.
II.
Narciſsus Septentrionalis calice luteo pleno, duplicatis folijs.
III.
Narciſsus Septentrionalis calice pleno luteo, oris incisis.
IV.
Pseudo Narciſſus minor luteus repens.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

PSeudonarciſſus, alijs Septentrionalis dictus , flore pleno & multiplici congeſto, caule rotundo protenſo oritur : ob gravitatem pendulus flos eſt, multifidus, foliola ultra triginta habens miſta , loco calicis , ſummè lutea ſunt , criſtata , quæ alijs folijs pallidioribus , aliquibus etiam herbaceis expanſis circumdantur , involucro membranaceo exeuntibus &c.

Lobel. Adverſ. alterâ parte , fol. 489. primâ fol. 51.
Cluſius , lib. ſecundo , fol. 165.
Item , Curarum poſteriorum fol. 13. 14.
Germanicè , Groß vermengter gefüllter Joſeph - Stab.

### II

HUic non abſimilis Pſeudonarciſſus , Septentrionalis alius , niſi quòd ſtellatim habeat in flavo flore duplicia foliola , ſubtus poſita , acuminata : calice intenſè croceo compacto , & aliquot crenatis involucris conſerto , attamen tubulato.

Germanicè , Gelb gefüllter Joſeph-Stab / mit einem bleichen gelben doppelten Stern.

### III

PSeudonarciſſus vulgaris , Septentrionalis , pleno calice dictus , ex quatuor folijs imbricatis, caule glabro , in membranaceum tegmen deſinente , nodóque emergit , folijs florum reflexis , & circinatim circumeuntibus pallidioribus : calice prominet multiplici , tubis aliquot inſertis , in fimbriâ inciſuris crenatis &c.

Cluſ. appendice alterâ.
Germanicè , Mit zwey und dreyfachen Kelch gelber Joſeph-Stab.

### IV

INnotuit & hic in Narciſſi ſpeciebus, Pumilio Narciſſus Minor, rarior, humi repentium unus, qui ex florum folijs repandis porrigit caliculum , oris ſciſſis benè luteum.

Cluſ. lib. ſecundo , fol. 165. Lobel. Obſerv. 62. Adverſ. 61.
Epitome Camerarij, fol. 953. Matth. Caſp. Bauhini , 861.
Germanicè , Kleiner und nidriger gelber Joſeph - Stab.
Matth. Camer. 442. Durante , 632.



III. *Pſeudo Narciſſus aureus præcox.*

I. Pſeudo Narciſſus pallidus calice amplo.

II. *Pſeudo Narciſſus ſimplex Belg*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

NArciſſus hic depictus bipedalis eſt, odoratus, caule ſtriato, non rotundo, latiore, in marginibus linea tenui depreſſa ſignato: bulbo, folijs lineatis, imbricatis, viridibus, maximus, ſicut & florum folijs, ſtellatim ordinatis, flavis: calice minus alto, ampliore, crenato, ſtolonibus parvis, albis, pediculo, piſtillo æmulo, albicante.

Cluſius: Appendice alterâ & curæ poſter. fol. 21.
Germanicè, Groß frembd gelber Narciß mit einem weitern Kelch.

### II

EX Pſeudonarciſſis Belgarum, nominatur iſte ſimplex major, Codianus, ſuis caulibus, inſiſtente flore oblongo, flavo: calicibus tubulatis, ſimplicibus, crenatis, luteis, protenſis.

Cluſ. lib. ſecundo, fol. 165.
Germanicè, Der Niderländer groß gelber Joſeph-Stab.

### III

PRæcocium numero adſcribitur hic Narciſſus, tribus caulibus latiuſculis, viridibus, ſummâ parte membranaceis involucris, nodulos cum floribus excipientibus. Flores eminent inde lutei: calice crenato, ſciſſuris altioribus, diverſè laciniato, æquè luteo croceo: propriè expreſſi.

Cluſ. lib. ſecundo, fol. 164.
Epitome Camerarij, fol. 953.
Matth. Caſp. Bauhini, 861.
Germanicè, Gantz hoch-gelber geflammter Joſeph-Stab.
Matth. Camer. fol. 442.



III. Pſeudo Narciſsus luteus.

I. Frittillaria.

II. Narciſsus Juncifolius præcox maior.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

FRittillaria, ſpecioſè depicta, ſeu Meleagris, Lilium variegatum vulgò, ſeſquipedalis, caule exili, folijs intensè viridibus & incurvatis, ſine ordine annexis : ſicut tota planta flexuoſa creſcit : floribus obſcurè purpuraſcentibus, nutantibus, qui quadratis areolis, decuſſatim poſitis, & tam exteriore quàm interiore parte expreſſis, ornantur : in quorum medio piſtillus cum ſtolonibus luteis exeritur : radice orbiculatâ, albâ, cæpaceâ, depreſsâ, nitens.

Dodon. fol. 233. Lobel. Obſerv. 65.
Lugdun. fol. 1530. Cluſ. fol. 152.

Germanicé, Braun-geſcheckte Narciſſen-Lili.

### II

NArciſſus, juncifolijs præcocibus, Major hic atque luteus odoratus annumeratur, folijs craſſis, ferè carinatis, & mollibus: caule rotundo, in ſummitate, membranaceo (quod plæriſque commune eſt Narciſſis) ſuos proferens flores auroluteos, calice ampliato, non ſine feriente odoris ſuavitate.

Dodon. 226. Lobel. Obſerv. 61. Adverſar. 51.
Lugdun. 1521. Cluſ. 158. & 159.

Germanicè, Wolriechende Bintzen / gelbe / frühe / groſſe Narciſſen-Röslein.

### III

NArciſſi montani, ſeu Pſeudonarciſſi vulgaris hæc eſt effigies, qui, in ſingulis caulibus, florem promit, è vaginulâ prorumpentem, totum luteum, ex cujus medio calix oblongior protenditur, fimbriatus amplius, & crenatus: caules circumdantur folijs porraceis, anguſtis, carinatis, elatis; bulbo multiplici tunicâ obtecto, albicante.

Dodon. 227. Lobel. Obſerv. 62.
Appendice, 51.
Lugdun. 1526.
Epitome pag. 953.
Matth. Bauhini, 861.

Germanicè, Gelb Joſeph-Stab / oder Hornungs-Blume.

Matth. Camer. fol. 442.



II.
Fritillaria flo: pleno.

I.
Meleagris flos maximus
Italicus.

III.
Fritillaria Alba.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

FRittillariæ, ſeu Meleagridis ſpecies, cum flore gemello propendente, colore obſoletè purpuraſcente, teſſellulis ſegmentato, intra quatuor folia, in ſummitate caulis diffuſa, flos ſerotinus maximus dictus eſt Italicus: caulem viridem, obſcurè purpureum, folia carinata oppoſita ambiunt, ſaturatè virentia, quem quidem prope radicem totum circumveſtiunt. Hunc excipit radix bulboſo, ſuperius & inferius depreſſa, circinatis ſparſis fibris & capllamentis colore ſuaſo.

Germanicè, Braun abhang Narciſſen-Lili/ mit mehr Blumen.

### II

QUamvis minori, ejuſdem formæ, radice, & caule exilibus, folijs ad radicem membranaceis involucris obductis, ſine ordine expanſis vireſcentibus, Fritillaria hæc oriatur: uberior tamen fundebatur Anno 1610. Menſe Martio, pleno flore purpureo, decuſſatis quadratis lituris & notulis. Nutabat autem (ſicut aliæ) ſtolonum appicibus luteo pictis.

Germanicè, Braun abhang Narciſſen-Lili/ mit groſſer Blumen.

### III

PRæ alijs elegantior Fritillaria iſta, caule, folijs, & bulbo depreſſo minor, geſtat florem pendulum, totum niveum, ſine emplemate evidenti.

De his Cluſius Appendice primâ, fol. 257.

& Appendice alterâ.

Lobel. Adverſar. alterius partis appendice, fol. 495. & ſeq.

Germanicè, Schnee-weiß abhang Narciſſen-Lilien.



I.

Fritillaria pyrenæa obſoleto luteo colore.

III.

*Fritillaria polyanthos lutea*

II.

*Fritillaria minor, obſoleto colore, inodora*

Tertius Ordo , Fol. 9.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

HÆc Fritillariæ ſpecies gracili rectóque vireſcente caule erigitur ſeſquipedalis: cum folijs, parum junceis, cauli inordinatè appoſitis, cujus in ſummitate flores teſſulati dependent diluti coloris lutei, quadratis rubentibus maculis, haud inordinatis, aſperſi, formâ oblongâ, globoſâ, abſque odore: Fritillaria Pyrenæa aliquibus dicta.

Germanicè, Braun in gelb-geſcheckte Narciſſen-Lilien.

### II

FRitillaria, Aquitanicæ non diſſimilis, ex oblongo protenſo caule, folijs indiſcriminatim affixis, paulùm latioribus, ſubviridibus, naſcitur: florum levigatorum reflexis oris luteis, interioribus ſubfuſcè purpureis, in quibus nulla tamen inſignis Fritilli pictura animadverti poſſit.

Germanicè, Gelb-geſcheckte Narciſſen-Lilien.

### III

EX omni parte lætior prodit Fritillaria hæc, pluribus floribus ornata nutantibus, qui virentes lutei ſunt, in oris reflexi, undique lituris, obſcurè rubentibus, ijsdémque quadratis oblongiuſculis, diſtincti: caulem gerit craſſiorem, quem protenſa oppoſita folia, certis intervallis diſſita, ambiunt herbaſcentia.

De his pleniora recenſent:

Lobel. Adverſar. alterâ parte, fol. 495.

Cluſius lib. ſecundo, fol. 153. Curar. poſteriorum fol. 10.

Germanicè, Vil-tragende gelb-geſcheckte Narciſſen-Lilien.


I
Fritillaria iuncifolijs.
II
Allium Vrſinum.
III.
Tulipa viridis coloris.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

INter Fritillarias, tenuibus folijs junceis, & exili caule, aſſurgit hæc numerata: bulbo rotundo depreſſo: & flores laxat, ſex foliorum luteos, rubicundis quadris variegatos: ſtolonibus & capitello æquè luteis.

Germanicè, Bintzen-bletterige geſcheckte Narciſſen-Lilien.

### II

ALlium Urſinum, ex folijs planis Lilii convallium conſtat protenſis, longioribus pediculis, ex bulbo ſpicato & annatis, emergentibus. Flores ſtellati ſunt, in umbellâ candicantes, cum capitellis virentibus, ſparſi & diffuſi.

Dodon. fol. 672.
Lugdun. fol. 1546.
Lobel. Obſerv. fol. 80.
Adverſar. fol. 59.
Matth. Caſp. Bauhini, 422.

Germanicé, Beer-Knoblauch.

Matth. Camer. fol. 173.
Durante, 31.
Fuchſ. 282.
Trag. 286.

### III

TUlipa erecto & glabro caule tollitur, cujus ſummitati inſidet flos totus herbaceus & viridis, oris acuminatis, introrſum flexis.

Germanicè, Tulipa gantz grün.



II.
Narciſſus Orientalis medius to,
tus albus polyanthos.

I.
Narciſſus Orientalis maior
polyanthos totus albus.

III.
Narcissus Orientalis polyanthos
minor totus albus.

Tertius Ordo, Fol. II.

# CELEBERRIM EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

NArciſſum hunc Orientalem Majorem quidam indigitant, quòd cubitalis latifolius ſit, caule protenſo, in cujus cacumine, ex membranaceo involucro, flores fuſi & copioſi albeant, odore fragrantes, perampli, ſinguli cum tribus ſtaminibus luteis, brevibus.

Germanicè, Groß weiß Orientaliſche wol-riechende Narciſſen-Röslein.

### II

HUjus collatione medius hic Orientalis Narciſſus dici meruit, non minus plurium florum odoratorum, albicantium, copiâ ſtipatus, quàm quòd bulbo, folijs & reliquis paulò minor videatur.

Germanicè, Mittelart weiß Orientaliſche Narciſſen-Röslein.

### III

EOdem pacto, minor Orientalis, Narciſſus iſte vocandus erit: florum multitudine, figurâ, colore & odore, præſcriptis haud inæqualis.

Dodon. fol. 224.
Lobel. Obſerv. fol. 60.
Adverſar. fol. 49.
Cluſius lib. ſecundo, fol. 15.
Lugdun. fol. 1519.

Germanicè, Klein weiß Orientaliſche Narciſſen-Röslein.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 302.



II. Narciſsus Orientalis medio croceus maior.

I. Narciſſus Orientalis medio croceus calice pleno.

III. Narciſsus Conſtantinopolitanus minor, calice fimbriato, medio croceus.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

EXhibet hæc Icon Orientalem Narciſſum vernum, pluribus acuminatis albicantibus floribus conſtantem, qui palleſcentibus pediculis oblongantur, & calice, pluribus tortilibus foliolis pleno aureóque, conſpiciuntur, in caule unico, ex folijs poraceis pluribus prodeunte.

Germanicè, Orientaliſche Narciſſen-Röslein mit gelb-gefüllten Kelch.

### II

SImplicibus, ſed majoribus, tubulatis, rotundis & auroluteis, prodit Narciſſus iſte Orientalis calicibus: floribus multiplicibus odoratis albis: caule glabro, viridi: folijs latioribus, prolixis.

Germanicè, Weiß Narciſſen-Röslein Orientaliſch/mit goldfarben Kelch.

### III

SUperioribus haud abſimilis viſitur hic Narciſſus minor, dictus Conſtantinopolitanus: cingitur autem floribus niveis, peramœnis, in quibus mediat calix, croceo colore fimbriatus, odore fragrante.

Dodon. fol. 225.
Lobel. Obſerv. 61.
Lugdun. fol. 1518.
Cluſius lib. ſecundo, fol. 156.

Germanicè, Kleines weiß Narciſſen-Röslein/mit Saffranfarben verborten Kelch.
Tabernæmont. fol. 301.


IV.
Pseudo Narciſsus
minimus Juncifolius
au reus.
I.
Narciſſus albus maximus calice luteo brevi.
II.
Narciſsus albus medius calice luteo brevi.
III.
Narciſsus totus luteus oblongo ca, lice & reflexis folijs.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ALbicat florum folijs ſex, virgulâ notatûs, Narciſſus maximus, cum tubuloſo luteo calice, cœteroquin alijs magnitudine, folijs, caule & bulbis, major.

Germanicè, Conſtantinopolitaniſche Weiß Narciſſen-Roſen mit einem gelben Kelch.

### II

NArciſſus medius, odoratus, ſeſe exerit bulbo & folijs oblongioribus, erectis, duobus caulibus, quibus flores ſtellatim folijs ſunt impoſiti, ex pallore albentes, in medio, protenſo & parùm crenato luteo calice.

Germanicè, Weiß geſternt Narciſſen-Röslein / mit einem gelben Kelch.

### III

IN hoc Narciſſo erumpunt folia porrecta, tortilia florum melina, protento quoque altiùs calice auroluteo: fimbriâ crenatâ.

Dodon. fol. 225.
Lobel. Obſerv. 60.
Lugdun. fol. 1518.
Cluſius fol. 156. lib. ſecundo.

Germanicè, Narciſſen-Röslein / mit hochen gelben Kelch / und gewundenen Blättern.

Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 302.

### IV

QUi Pſeudonarciſſorum minimus eſt, ſurrectis, tenuibus funditur folijs, quorum medio cauliculus exilis gerit florem pyramidalem, herbaceo pallidum, niſi quòd calix aureus, evidentiùs crenatus, extuberet longiùs.

Lugdun. 1521. Cluſ. lib. ſecundo, fol. 166.

Germanicè, Kleiner Bintzenblätterichter gelber Joſeph-Stab.



II. *Narcissus de Argiers Polyanthos totus luteus*

Narciſſus nobilis Orientalis polyanthos mixtus.

III. *Narciſsus Orientalis albus, odoratus, calice ſtellato.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

SUavem odorem ſpirat Narciſſus Nobilis , multorum & plenorum ſeptem nimirum florum Orientalis , ab alijs in hoc mutatus , quòd pluries decuſſata & radiatim juxta ſe habeat diſpoſita folia albentia , in quorum meditullio , loco calicis , cumulentur complicata & conglomerata foliola , amplius diffuſa , alternatim alba & lutea , mirâ ſedulitate picta : pediculi ſunt virentes : caulis ex folijs pallore viridibus , carinatis , prodiens , nudus , rotundus , porraceus.

Germanicè , Orientaliſcher gantz gefüllter weiſſer Narciß.

### II

SUccedit ab Algier oriundus Narciſſus , qui craſſioribus & latis folijs ſuperbiens eſt , floribus luteis duodenis & pluribus , depreſſo quidem caliculo , crocei coloris , ambientibus foliolis ex albo pallentibus.

Germanicè, Egyptiſcher gelber Narciß mit mehr Blumen.

### III

STellaribus Narciſſis annumerandus hic venit Odoratus , amœnus , albus : ſic enim flores cum ſuis pediculis , ex membranaceo tegmine prominent exalbidi , quorum medio , ſtellas æmulantes ſtolones , ſeu ſtamina , radiatim concentrati ſunt aurolutei.

Germanicè, Gantz weiß Stern-Narciß auß Orient.



III.
*Narciſſus Polyanthos Orien-
talis medio luteus minor
odoratus.*

I.
Narciſſus Polyanthos Ori-
entalis calice medio luteus.
odoratus maximus.

II
*Narciſſus Polyanthos Orienta-
lis medio luteus odora-
tus maximus*

R.C.S.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

INter Codianos Narciſſos, Orientales tamen, cenſeri volunt hos ſequentes, quòd calices habeant majores & minores, verùm campanulæ inſtar, in medio flore, unius coloris luteos, amplos, minus tamen aureos: à præcedentibus Narciſſis, eâ calicum figurâ cavâ & amplitudine differentes: odorem ſpirant jucundum cum fragrantiâ. Hilares inſuper & florum explanatorum, ex uno caulis involucro omnium evaginatorum, numeo luxuriant elati & multiplices.

Germanicè, Groß I. Mittelart. II. Kleinere. III. Orientaliſche-Narciſſen / mit nidern holen Kelchen / alle gantz.



I
Lilio Narciſſus Hemero, calli diſfacie.

II.
*Gnaphalium Montanum suave rubens.*

III.
*Gnaphalium Montanum variegatum*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

NArciſſus hic Indicus Matthiolo eſt Conſtantinopolitanus, propriè Lilionarciſſus dictus, facie Hemerocallidis, Ornithogali vel Pancratij: ſic enim nititur bulbo robuſto cæpaceo, ſubfuſco, baſi, capillamentis ejuſdem coloris cincta frequentibus. Ex eo producitur & aſcendit, intra ſeptena vel plura herbacea folia, caulis ſeſquipedalis unus, pluribus floribus onuſtus, quorum ſinguli ex pediculis oblongis virentibus ſex conſtant folijs albicantibus: Calicis loco, corpore quodam ſtellato, laciniato mediante: diffuſis ſtaminibus luteo viridibus.

Cluſius lib. ſecundo, fol. 168.
Lobel. Adverſar. alterâ parte, fol. 502.

Germanicè, Conſtantinopolitaniſche Lilgen-Narciſſen.

II III

SIve inter Filagines, ſive Piloſellas, recenſeantur ſequentes duo Centunculi molles & Gnaphalia, ſanè tomentoſa ſunt, cauliculis & folijs incanis, radicibus circumferentia perreptantibus. II. Prius tamen Montanum, quòd roth Engel-Blůmlein germanico idiomate innotuit, erigitur floribus glomeratim poſitis, ex albo ſuaviter rubentibus. III. Alterum verò Montanum etiam, Germanicè, Beſprengt Engel-Blůmlein / variatur florum colore, albis & rubeis foliolorum oris & apicibus.

Lugdunenſ. 115. Dodon. fol. 68.
Lobel. Adverſ. 201. Cluſ. lib. tertio, fol. 329.
Tragus 125. Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 107.



I

Narciſſus iuncifolius po-
lÿanthos albus.

III

*Leucoium Bulboſum minus*

II.

*Lilio Narciſsus Bononienſis.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I.

AD crebriores ſoboles Juncifoliorum Narciſſorum refertur præſens, multorum quoque florum Narciſſus, quo ad folia & tubum candore nitidus, medio tamen emicantibus certis quibusdã luteis ſtaminulis, inconditè poſitis.

Cluſius poſter. curar. fol. 12.

Germ. Weißer Narciſſen vieler Blumen/und mit Bintzen Blätteren.

### I I.

TEnuioris & inflexi caulis, cum folijs ex cinereo-herbaceis, hæc eſt Tulipa Appenninea, Bononienſis &c. in qua uni atque alteri partito, flores cum ſtaminibus mediô croceis inſident lutei, ſuaveolentes, parûm laciniati, & in his folia quædam recurva: bulbus illi eſt obſcurè phœniceus, oblongior.

Lobel. obſerv. 63. Adverſar. 51.
Clus. lib. ſecundo fol. 151.
Camerarij Epitome, fol. 958.
Germ. Gelb wol-riechend Tulipan.
Tabernæmont. 309.

### I I I.

LEucoium bulboſum, in uno caule protenſo, ex membranaceo involucro, plures profert flores pendulos, colore lacteos, quorum apices maculâ quâdam ſubvireſcente inficiuntur. Bulbus (uti aliorum) priori cæpaceo tegumento, cum capillamentis fuſcus eſt, cæteris & interioribus verò panniculis albicans.

Germ. Klein ſpäte Hornungs-Blumen viel tragend.

*QUARTUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.




V.
Tulipa lutea, in medio conifor. macula rubens.

III.
Tulipa lutea irrorata ex cinnaba, ri rutilis maculis.

I.
Tulipa lutea virgulis oblong ad latera, colore cinnabaris.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

VErſatilium & verſicolorum plantarum eſt Luxurians Tulipa, Latinis Lilionarciſſus, florum folijs potiſſimùm maximéque ambiguus. Ducentarum enim ſpecierum numerum ſuperare depræhenſum eſt, ita ut earum ordinem & modum venantem ferè effugiant; quod vel hoc ſolo manifeſtum fuit, quòd cum paucis ab hinc annis bulbi dubiæ iſtarum, & mixtæ ſpeciei, in hortum aliquem translati fuiſſent, ſequenti anno unius coloris, & ſimplicis, conſpicerentur florere degeneres: his verò Illuſtriſſimi noſtri Principis Hortis evaderent, floribus & magnitudine magis conſpicui, variegati, ſplendidiores.

Dilucida Tuliparum hiſtoria, & deſcriptio legi poteſt, apud indefeſſos Botanicos, & accuratiſſimos:

Cluſium lib. ſecundo, fol. 138. & ſeqq.
Lobel. Obſervat. fol. 65. & ſeqq.
Adverſar. 52.
Dodon. fol. 231.
Lugdun. 1528. & ſequenti.

Rariſſimæ viſu, & ſingulares, in florentibus viridarijs, Illuſtriſſimi Domini, Eyſtettenſis Principis, præfatis, ſubſequentes erant.

I

TUlipa lutea, in medio foliorum lineam rectam dorſalem viridem ducit, prope latera, oppoſitas maculas oblongas, rubeſcentes: labris, ex luteo vireſcentibus, terminatur. Germanicè, Gelb Tulipani/mit grünen Streiff/und hoch-rothen ſeiten Streimen.

II

EXplicatur florens Tulipa alba, fundo & ſtolonibus luteis: purpura rubente ad medium floris folij pertingente circulo: cæteroquin floribus albeſcentibus.
Germanicè, Gantz weiß/mit gelben Boden/und um denſelben mit eim Roſin-rothen Circkel.

III

TUlipa ſummè lutea, conglobata rubedine, uſque ad ſummitatem folij rutilat, figurâ flam̃eâ coniformi. Germanicè, Gelb mit Feuer-rothen geſprengt.

IV

REgina Tuliparum, quibuſdam ampliatur albicans, aſperſis oblongis & indifferentibus purpuraſcentibus rubeis maculis & virgis, extremitatibus labrorum inciſis, atque in apicibus foliorum laciniatis. Germanicè, Gantz weiß mit Roſin-rothen vermengten/und gemiſchten/auch zertheilten Blättern.

V

LUtea folijs eſt hæc Tulipa ex viridi, in medio tincta coniformi maculâ, Cinnabaris colore, folijs in extremis oris laciniatis.
Germanicè, Gelb mit Cinnober-rothen getheilten Blättern.



I. Tulipa albicans margine coccineo.

II. Tulipa flavide pallens oris coccineis.

III. Tulipa ex albo marginibus ru„ bescens.

IV. Tulipa ex flavo rubescens.

V. Tulipa lutea ex rubro viridi coccineo variegata.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

Tulipa ſerotina, quæ ex bulbo, cum ſuis capillamentis, inferioribus flexuoſis, latiori, ſubfuſco, tollitur, ex pleno, rotundo, exili lanugine aſperſo, caule virente evaginato, cum folijs amplis imbricatis, incurvis, ex cœruleo viridibus: flore cum apicibus vario, uno alteri incurſante colore: ſic enim albicans flos, luteis in directum ductis lineis, oris coccineis gaudet.

Germanicè, Weiſſe Tulipa / mit Roſin-farben Enden / und gelben Streiffen.

### II

Tulipa præcox, bulbo porrecto prodit: folijs florum parùm ſciſſis, ex florido luteis, mixtis, intercurſantibus lineis & marginibus ex coccino lucidis.

Germanicè, Liecht-gelb und weiſſe Tulipa / mit Roſin-farben Enden und Streiffen.

### III

Tulipa præcox, folijs mucronatis, ornatur flore niveo, exteriora verſus, paulatim flaveſcente, oris cinnabarim colore imitantibus.

Germanicè, Tulipa weiß mit gelben Enden / vornenher mit Cinnober-rothen und Roſin-farben Streiffen.

### IV

Tulipa ſerotina albicans ex flavo purpureo, folijs florum mucronatis, prope calicem luteis unguibus conſtat.

Germanicè, Gelb Roſin-farbe und braune Tulipa / in einander vermengt / mit einem gelben Boden.

### V

Tulipa verſicolor, ſerotina, folijs florum apicibúſque reflexis notatur byſſinis, in quibus medium floridum purpureum, virgis oblongis, alterum verò roſeum lineis vividis viridibus tingitur.

Germanicè, Gantz gelbe Tulipa / die drey mittleren Blätter Cinnober-roth geſprengt / die andern Roſin-roth und grün geſtreimt.


Tulipa V. Coccinea
albescentibus oris.
III.
Tulipa lutea, margine roseo.
I.
Tulipa lutea maculis aſpersa
minutis
II.
Tulipa candida lineis viridibus.
IV.
Tulipa miniata linea viridi

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa, ſicut plæræque aliæ, ſtriatis folijs, cæpaceo bulbo ſignatur, floribus luteis, miniatis virgis etiamnum latioribus ſplendeſcit: unguibus in ſinu nigris, capitulo virente.

Germanicè, Tulipa gantz gelb / mit Cinnober-rothen Streimen / und ſchwartzen Boden.

### II

TUlipa Nobilis, præcox, candida, ſuper nervum florum foliorum, lutea linea, ad acumina uſque deducta, bulbo oblongo.

Germanicè, Tulipa gantz weiß / in der Mitte deß Blats grüne Strich.

### III

LUtea & hæc exurgit, tenera, præcox Tulipa: floribus ex viridi ſplendidè luteis: extremitatibus roſeis.

Germanicè, Gelbe Tulipa mit Roſin-rothen Enden.

### IV

TUlipa rarior præcox, paulo acuminatis florum folijs, reflexis, ijsque rubro miniatis ornatur, cum lineâ viridi ad ungues finiente, qui lutei ſunt.

Germanicè, Tulipa Roſin-farb in roth geſprengt / mit gelben Boden / außwendig mit grünen und weiſſen Streimen.

### V

TUlipa ſerotina, coccinei coloris, ad album diffluens foliorum florum oris: fornice flavo.

Germanicè, Tulipa Roſin-roth / mit weiſſen Enden und gelbem Boden.


IV.
Tulipa explicata florum candido-
rum linearum rubearum
II.
Tulipa albicans, maculis latis
rubentibus.
III.
Tulipa diversi coloris, alba linea ru-
bente, calice citrini coloris.
V.
Tulipa ex luteo citrini coloris florum
lineis dorsalibus viridibus.
I.
Tulipa lutea lituris aureis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa caule flexuoſo , ex folijs carinatis evaginato , floribus emicat luteis , virgulis latis ad apicem , magis magíſque aureis , obductis : uſque adeò undulatis : bulbo ſerotinis proprio.

Germanicè , Gantz gelbe Tulipa / mit Golt-farben Streimen.

### II

HÆc ex folijs imbricatis præcox , calice florum luteo , præter oras albicantes , mediâ parte ſaturatè rubente luxuriat.

Germanicè , Tulipa Kirſchen-farb mit weiſſen Enden / und gelbem Boden.

### III

ISta Tulipa, ſimiliter diverſiculor , explicatur florum folijs alternatim albis & argenteis, quæ à calice ad apicem pinguntur mediâ lineâ rubente : calix eſt luteus , radiatus in circumferentiâ colore cœruleo.

Germanicè, Tulipa drey Blatt verwechſlet mit Silber-farb / und drey Blat weiß mit rothen Strichen / auch einem gelben Boden / und um den Boden ein blauen Stern.

### IV

PAnditur hæc Tulipa albis floribus , virgulis longis rubeis , ad foliorum ſumitates pertingentibus , fornice luteo.

Germanicè , Tulipa / gantz weiß / mit hoch-rohten breiten Streimen und gelben Boden.

### V

TUlipa conglobata, folijs florum amplioribus cavis naſcitur , qui ex luteo citrini ſunt coloris, per medium lineis viridibus ſignati.

Germanicè , Gelbe Tulipa mit grünen Streimen.


V.
Tulipa ex purpura roſea perſica.
II.
Tulipa aurei coloris.
IV.
Tulipa parte media viridibus signaturis, altera vero rubra.
III.
Tulipa lutea prope calicem radio rubro.
I.
Tulipa lutea maculis rubens.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa præcox, flore variat luteo, maculis aſperſo, & virgulis rubrominiatis.

Germanicè, Tulipa Hoch-gelb / mit rothen Streimen und Flecken.

### II

TUlipa ſerotina flore conſtat in totum aurei coloris.

Germanicè, Tulipa ſchön Gold-farb.

### III

TUlipa præcox floribus explicatur luteis, prope fornicem ex rubro tinctis, calice rurſus luteo.

Germanicè, Tulipa mit gelben Boden / und Cinnober-rothen Streimen.

### IV

TUlipa ſerotina, verſicolor, bulbo fuſco prodit, & latioribus carinatis folijs: Florum folia exteriora repanda, ex coccino ſunt rubea: quorum medietas ex minio rubet, alterâ lituris & virgis viridibus delibutâ exiſtente.

Germanicè, Tulipa / gantz liecht Roſin-roth halbirt / auch Cinnober-roth mit grünen Streimen.

### V

TUlipa præcox, pumilio, tenerorum foliorum, floribus erigitur ex purpurâ roſeis.

Germanicè, Tulipa gantz liecht Roſin-roth.


V.
Tulipa argentei & albicantis coloris.
III.
Tulipa lutea, lituris miniatis.
I.
Tulipa ex albo ruffa margine rubente.
IV.
Tulipa fulvo sulphurei coloris mar-gine amplius rubente.
II.
Tulipa sulphurei coloris oris rubeis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipæ color florum acuminatorum eſt helvus, inter album & ruffum medius: viridi venâ ad dorſum ſecundum longitudinem excurrente: labris ſaturatè purpuraſcentibus.

Germanicè, Tulipa weiß-roth / mit hoch-rothen Enden.

### II

TUlipa ex dubijs & mixtis una: ſulphurei nimirum vel melini coloris, floribus mucronatis eſt prædita, juxta dorſum ſurſum utrinque excurrentibus radijs herbeis, flammæ figurâ, oris rubentibus.

Germanicè, Tulipa Schweffel-farb / mit Roſin-rothen Enden / und grünen Streimen.

### III

TUlipa lutea, miniatis in longum & ad latera ſparſis lituris, ſtaminibus purpuraſcentibus, umbilicum circumſeptis, dilatatur.

Germanicè, Tulipa hoch-gelb / mit hoch-rothen Enden.

### IV

TUlipa pumilio, florum folia gerit in trigonum acuminata, ſubtus non in calathi formam, ſed depreſſa, colore melino: ad oras, prope ungues inſuper latius ſaturatè rubentia.

Germanicè, Tulipa / Schweffel-gelb / mit breit-rothen Enden.

### V

TUlipa præcox, ſex florum folijs, exterioribus quidem tribus acuminatis, argenteis, interioribus tribus parùm orbiculatis, albis, notatur, ſingulorum dorſis venâ rubicundâ protenſis.

Germanicè, Tulipa mit drey Silber-farben Blättern / und drey Leibfarb ſchillerten.



V. *Tulipa purpurea calice pallescente.*

IV. *Tulipa ex pallido tota vi„ rescens.*

III. *Tulipa florib, ex ſulphureo co„ lore pallescentibus, lituris pro„ pe apices roseis flammiformib.*

II. *Tulipa florib, reflexis, inferi„ miniatis, exterius herbaceis margine ex cinnabari ru„*

Tulipa niuei coloris, o„ ris rubeo purpurascen„

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa ſerotina effertur floribus, quorum eximia eſt candicantia, iiſque ad oras utrinque aſperſis lituris, ex rubeo purpuraſcentibus.

Germanicè, Tulipani hoch-weiß / mit roth Purpur-farben Enden.

### I I

TUlipa præcox Polymita, florum folijs fathiſcit, vario & mixto colore imbutis. Interiora enim reflexorum ſunt miniatis coloris, marginibus auroluteis: exteriora verò rubent.

Germanicè, Tulipa vermiſcht mit Cinnober-roth und gelb / und auf den Enden Goldt-farb.

### I I I

HUjus Tulipæ flores explicati, ex citrino vel ſulphureo colore palleſcunt: ſtolonibus & capitulis viridibus: rutilis autem, flammarum inſtar, faſtigiatis maculis tingitur, apices ferè foliorum conis ſuis tangentibus.

Germanicè, Bleich-gelbe Tulipani / mit Roſin-rothen Feuer-Streimen.

### I V

TUlipa conglobatur, florum ex luteo ſaturatè virentibus folijs.

Germanicè, Tulipa gantz gelb-grün.

### V

SIc iſta Tulipa, hiare incipit, floribus rubeo purpuraſcentibus, calice luteo.

Germanicè, Tulipani Purpur-farb mit gelben Boden.


V.
Tulipa ſumme miniata calice luteo.
I
Tulipa lutea miniate punctata.
III
Tulipa alba maculis roſeis.
IV.
Tulipa roſea, venis luteis.
II.
Tulipa alba, unguibus luteis.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa præcox, floribus auroluteis, punctis miniato colore irroratis.

Germanicè, Tulipa Goldt-farb mit Cinnober-rothen Pünctlein.

### II

TUlipa præcox alba pumilio, explicatur floribus, ſinu luteo, ſtaminibus purpureis, capitello viridi.

Germanicè, Tulipa weiß/ mit gelben Boden und braunen Sträimen.

### III

TUlipa præcox alba, floribus explanatis, maculis coccinoroſeis aſpergitur, fornice luteo, cum ſtaminibus purpuraſcentibus.

Germanicè, Tulipa weiß mit Roſin-rothen Flecken und gelben Boden.

### IV

TUlipa roſei coloris flore humilior, venâ in longum à ſummo ad imum ductâ, ſicut & unguibus luteis.

Germanicè, Tulipa Roſin-farb/ mit gelben Streimen und gelben Boden.

### V

TUlipa floridè coccineis conſtat floribus, unguibus & calice luteis, bulbo (ſicut præcedentes & aliæ ferè omnes) pullo fuligineo.

Germanicè, Tulipa Cinnober-roth mit gelben-Boden.



I. Tulipa Miniata pleno flore

II. *Tulipa Nivea oris purpurascente.*

III. *Tulipa flore pleno, tota lutea.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa ſerotina, flore pleno miniato producitur: folijs ſtriatis, tornatis, per medium fiſſis, tenuibus: ( id quod commune ferè Tulipis, quæ flore pleno naſcuntur.) Bulbus cum appendice, latior, depreſſus.

Germanicè, Doppelte rothe Tulipa mit gefüllter Blumen.

### II

TUlipa ſerotina, nivei coloris, oris florum per totum ex rubro purpureis, phalærata eſt inſuper, in caule, ſuperiore folio viridi vivido, mediâ parte, ex albedine roſeo, in ſummo biſulco.

Germanicè, Schnee-weiſſe Tulipa mit Roſin-farben Enden.

### III

TUlipa ſerotina, flore duplici plenis, erigitur luteis vel citrei coloris: caule craſſiore: folijs, quæ ſuperiora ſunt, in longum ſciſſis: conſtat bulbo amplo, cum annato colore pullo.

Germanicè, Gelbe gefülte Tulipa.



III.
*Narciſsus medio purpu, reus minor.*

I.
Tulipa serotina po, lÿanthos.

II.
*Leucoium Bulbosum ſerotinum.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

TUlipa rarior, ex pluribus caulibus ramoſa, bulbo dilutè ſpadiceo, capillamentis ſubfuſcis, enitebat hæc floribus phæniceis, ſinu cœruleo, ad centrum flaveſcente, quod cum ſtolonibus luteum erat.

Dodon. 231.
Cluſi. 144. lib. ſecundo.
Lugdun. 1529.
Lobel. Obſerv. 66.
Adverſ. 62.

Germanicè, Roſin-roth von vilen Blumen Tulipani.

II

MUltorum florum Leucojum hoc exurgit, quod alijs Narciſſolyrium pratenſe videtur, flores habet majores, nivei coloris, propendentes, quorum ſinguli etiam pluribus quàm ſex conſtant foliolis, ad caliculum affixis, in cujus medio ſtamina pullulant lutea: caulis & folia carinata ſunt viridia: bulbus & capillamenta pullo picta.

Dodon. 230.
Lobel. Obſerv. 64.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 171.

Germanicè, Groſſe ſpäte vil-blumichte Hornungs-Blumen.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 308.

III

INter minores Narciſſos, medio purpureos, florum albedine magis eſt elegans, & candicat, texturâ ſimplici, quorum medio orbiculus eſt auroluteus, ſtamina flaveſcentia: ex bulbo cæpaceo fuſco prodeunt cauliculi, & junci potius, quàm folia, vireſcentes.

Dodon. 223.
Lobel. Obſerv. 60.
Cluſ. 156.

Germanicè, Weiß klein Narciſſen-Röslein.
Matthiol. Camer. 442.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 304.



II
*Tulipa globosa serotina aureo co,
lore punctata.*

I
Tulipa globosa ſerotina cin,
nabrio colore.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

TUlipa globoſa, patula, biflora conſpicitur, florum folijs ex cinnabari ſanguineis, unguibus trigonis obſoletè purpureis, ad circulum flavum concentrantibus, capitello luteo, & ſtaminum apicibus purpuraſcentibus.

Germanicè, Tulipani von hoch Cinnober-rothen Farben und ſchwartzen Boden.

### II

SErotina alia Tulipa globoſa, hilaris, lutea, ex coccino aureis notis & punctiunculis ſignata & depicta, pullo & cæpaceo bulbo, filamentis cineracei coloris, extollitur.

De hac Lobel. Obſerv. 66.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 143.
Epitome Matth. Camer. 955.
In horto Medico Camer. 175.
Matth. Caſp. Bauhini, 859.

Germanicè, Goldt-farb ſpate Tulipani/ hoch-roth geſprengt.

Matthiol. Camer. 442.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 309.



III. *Tulipa Perſica non aperta.*

I. Tulipa polyanthos præcox roſea colore mixta.

II. *Tulipa Perſica aperta.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

EX caule, ramoſo medio virente, præcox hæc cubitalis Tulipa protendit multiplices flores mucronatos, aliquatenus repandos, purpura roſeos, ſtigmatibus & lineis luteis frequentioribus ornatos.

Germanicè, Vil-tragende Roſin-rothe Tulipa mit gelben Strichen.

### II

PRopagatæ ſunt hæ Perſicæ Tulipæ, floribus dorſo roſeo, quod in exterioribus folijs, oris mucronatis ternis obſervabatur. Cæteris tribus interioribus niveâ albedine ſplendentibus, oris obtuſis: unguibus purpureis: capitulo luteo, & ſtaminulis cineritijs: caule gracili, erecto: folijs ſtriatis, junceis & flexuoſis.

Cluſius Curarum poſteriorum fol. 9.
Icon: horti Regij Galliarum: Robini.

Germanicè, Offene und zugethane Perſianiſche-Tulipa.



III. *Victorialis longa.*

I

Tulipa Serotina ſtellata.

II. *Molÿ latifolium flore flavo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

OB eximiam floris venuſtatem, rara hæc ſerotina Tulipa, haud immeritò ſtellata appellatur: cujus folia ſex mucronata, decuſſatim concentrantia, latiora ſe pandunt, candore albeſcentia: quorum centro tollitur capitulum luteum, ſtolonum apicibus purpuraſcentibus.

Lobel. Obſerv. 66.
Adverſar. 52.
Lugdun. fol. 1529.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 144.
Germanicè, Stern-Tulipa.

### II

MOly montanum, quamvis ab accuratiſſimo Cluſio graphicè delineetur, differt tamen, quòd hoc, folia latiora & profundius carinata, pluraque quàm bina habeat erecta: intra quæ caulis enodis & glaber, in ſummo floſculos luteos, ſtellatos, porrigat: bulbus verò, cum ſuo bulbulo annato & capillamentis, pulli ſint coloris.

Cluſius in Appendice alterâ cap. 37.

### III

EX Gentianæ majoris, vel Hellebori albi, folijs virentibus, nervoſis, evaginatur caulis, hujus Victorialis longæ, Allij Alpini, Serpentini &c. qui prope florem vireſcit, inferiore verò parte radicem verſus dilutè purpuraſcens: in faſtigio ornatur multâ florum albedine lacteorum ſtellatorum turmâ: ſtaminulis luteis: radicem ſortita eſt oblongam, cortice fibroſo, reticuli inſtar obtecto, capillamentis variè ſparſis, ſubfuſcis.

Dodon. fol. 210.
Lobel. Obſerv. 81. Adverſar. 59.
Lugdun. 1547.
Cluſius lib. ſecundo, fol. 189.
Matth. Caſp. Bauhini, 422.
Matth. Epitom. Camer. 392.
Germanicè, Allpen-Knoblauch/ oder Sig-Wurtz/ das Männlein.
Matth. Camerarij, 173.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 192.
Durante 32.

# *QUINTUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.



Corona Imperialis
Polyanthos.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

QUæ verè Corona Imperialis Polyanthos mirandæ & luculentæ magnitudinis dici meruit, claruit Anno 1611. Aprili Menſe, floribus nutantibus & ſubmiſſis quadragenis, colore ex croceo rubentibus, plerunque ſex folijs uno conſtante, in margine purpuraſcentibus quibuſdam venis & oris: ſupra quos confertim fundebatur coma viridior, folijs anguſtioribus, tenuibus, ſparſis: caulis ad craſſitiem trium unciarum ſupra terram aſſurgebat, ſuperans cubitos cum ſemiſſe duos, levis & minus rubeo purpureus: quò propior ſolo, eò folijs arctioribus, ſaturo virentibus, inflexis, repandis, craſſioribus, mucronatis in longum & reflexis, circundabatur circulariter.

Cluſius, lib. ſecundo, fol. 128.

Germanicè, Vil Blumen-tragende Käyſers-Cron.

Tabernæmont. fol. 325.



1. Corona Imperialis.

Quintus Ordo, Fol. 2.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

**I**

CORONA Imperialis ſerotina: Turcarum Turſai: Chalcedonicum Lale: bicubitalis: caput efferens ſub criſtâ comoſâ, ex folijs exilibus, mucronatis, adornatâ: dependent flores nutantes, nolarum inſtar, phœniceo rubentes, ſex plerunque folijs: in quorum calice interno, ſingulis folijs appreſſa ſunt tubercula ac uniones, aquam in ipſo meridiano fervore ſtillantia limpidam, dulcem: ex meditullio calicis porriguntur ſtolones albicantes, cum piſtillo nigricante, trifido: poſt flores, fructus, formâ triquetrâ, iíque non niſi fœcunda ferentes ſemina, tolluntur ſurſum: caulis rotundis inferius excipitur folijs latioribus, ſaturatè virentibus, circumflexis, amplis.

Bulbus magnus, ſolidus, cæpaceus, ſquamoſus, trium librarum pondere, feriente, ſicut & tota planta, herboſo, fœtido, tetróque ſubſtat odore: craſſis, longis, ejuſdem cum bulbo coloris, pallido atris filamentis.

Dodon. fol. 202.
Lobel. Obſerv. 86. Adverſ. alterâ parte, 513.
Lugdun. fol. 1495.
Cluſius lib. ſecundo, fol. 128.

Germanicè, Goldt-farbe Käyſers-Cron.
Tabernæmont. 2. Buch/325. Blat.



Corona Imperialis florum claſſe duplici.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

E Luculentis duorum Ordinum floribus conſtat hic Coronæ Imperialis, Turcici Turſai potiúſve Turfanda ſcapus cardinalis. Prior enim ſeries circulariter ſubijcitur ſupremis totius plantæ ſparſis & fuſis foliorum capillamentis, quem alius atque alius circumfluentium herbaceorum foliorum radius in glabro caule ſuccedit: floribus, ex cinnabari miniatis pendulis, ſubnexis. Ab uno latere hujus effigiei conſpicitur explicatus flos, cum ſuis tuberculis, inſtar unionum, ſtylo luteo trifido.

Altero verò margine exhibetur hexagonon ſeminiferum erectum caput, cujus ſunt ſemina ſubrufa, contiguo ordine juxtà recondita.

Lobel. Adverſar. alterâ parte, 512.

Cluſius, lib. ſecundo, fol. 125.

Germanicè, Roth feuer-haar-farbiche Käyſers-Cron / mit doppelten Blumen / Abſatz / und Crantz.


III
Chamæiris
anguſtis folijs
minor.
II.
Iris tuberosa.
IV.
Bulbus lilij Persici.
I.
Lilium Perſicum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

LIlium Perſicum , quod apud alios ſingulare & ſolum , ſic horto iſto celebri , quâ videtur formâ , naſci ſategit cultior natura : cubitos tres ſcapus uſque ad bulbum ſuperat: floribus, ut nolæ appenſæ , ex rubro purpuraſcentibus, quorum ſtamina lutea. Ad bulbum uſque , in caule exeunt folia anguſta, longa , multum ſtriata, diſſita tamen, & circulari ordine , ut in Coronâ Imperiali.

Dodon. fol. 220.
Lobel. Obſerv. 86. Adverſar. ultimâ parte , 512.
Lugdun. fol. 1495.
Cluſius , fol. 130.
Germanicè , Perſianiſche-Lilien.
Tabernæmont. lib. ſecundo , fol. 324.

### II

IRis Tuberoſa, rarior, anguſtis, triquetris, longiſſimis conſtat folijs, ſaturatè viridibus : ſupra caulem,ex quo vaginatim , labellis obſcurè violaceis, juxta quæ luteo viridia acuminata folia , flos exurgit jucundè odorus : radix non ex bulbis bulbulisve, ſed tuberibus oblongis & nodulis , cinere nigricantibus, in longum protractis , terræ ſe inſinuant.

Dodon. fol. 249. Lugdun. fol. 1613.
Lobel. Obſerv. fol. 51. Adverſ. fol. 363.
Germanicè, Lang-knöttichte Schwertl.

### III

CHamæ Iris ſylveſtris Minor, Anguſtifolia: oblonga, inſtar gladiolorum, benè virentia habet folia, ſupra radicem nodoſam , ſubrufam : flores ex geniculatis caulibus exurgunt plures violacei , odore chryſomalorum.

Dodon. fol. 247. Lobel. Obſerv. fol. 34.
Lugdun. fol. 1611. Cluſius , lib. ſecundo , fol. 229. & 230.
Matth. Camer. Epitome, fol. 3.
Germanicè , Klein blaue Schwertl.
Matth. Camer. fol. 2. Bauhini, fol. 334.
Tabernæmont. lib. ſecundo , fol. 334.



I. Lilium cruentum flore pleno.

II Viola erecta flore cæruleo.

III Viola erecta flore albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

EX ſolertiâ luxuriantis Naturæ, provenit Lilium Cruentum Puniceum, uberiore flore & pleno dictum: Anno 1612. florum folia, ſexagenarium ſuperabant numerum: niteſcunt ea ex miniato crocea, punctis ſaturatis, variè flexa & contorta: ſtaminibus rubentibus, apicibus verò obſcurius. Piſtillus huic erat unicus trifidus, luteus: caulis pro florum amplitudine tenuior, folijs tortilibus: radice bulboſâ, ſparſis capillamentis latius diffuſis, ſubnigricantibus.

Germanicè, Gefüllt Golt-farbe Lilien.

II　　　III

QUia caulibus firmis, rectis, cubitalibus protendantur, & humi non repant Violæ hæ: Aſſurgentes à Dodonæo, ab alijs Erectæ nominantur: folijs gaudent latis, acuminatis, ad margines utrinque ſerratis & denticulatis: non niſi florum colore differentes ſunt, ſimplices tamen, nec uti lateæ tricolores.

Secunda ex cœruleo purpuraſcentes habet flores.

Germanice, Hoch-aufrechter blauer Wertzen-Veil.

Tertia ex Cyaneo albeſcit floribus.

Germanicè, Hoch-aufrechter weiſer Wertzen-Veil.

De his legi poſſunt

Dodon. fol. 160. Lobel. Obſerv. 334. Adverſar. 266.
Caſp. Bauhini in Dioſcor. fol. 823.
Epitome Matth. Camer. fol. 911.



II.

*Lilium purpureum maius Do=donei.*



I.

Scapus cum bulbo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

GRatioſum elegantium florum Croceopurpureum Lilium exhibetur, Herbariorum Hemerocallis, quæ bulbo, ſquammis nucleatim contexto, pallore, albente, procerum protrudit ſcapum, folijs carinatis, ſaturatè viridibus, circumcircà radiatim ſeptum: ſuprà medium potiſſimùm alæ occurrunt, ſuis ſingulæ donatæ floribus, qui, dum effuſi ſunt, ad aureum colorem coruſcatione rubent repandi: ſtaminibus & piſtillo colore hiſce reſpondentibus. Flores verò latentes, & nondum dilatati, in apicibus vireſcunt, aliàs rubedine remiſſiores: at ij, qui minores, & ex alis jam inde ab initio enaſcuntur, orbiculi oblongi, toti ſunt virides.

Dodon. 198. Lobel. Obſerv. 84. Adverſ. 60. & 61.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 136. Lugdun. 1493.
Epitom. Camer. 616. Hort. Camer. 89.
Matth. Caſp. Bauhini, 600.

Germanicè, Roth groß Golt-farbe Lilien.

Fuchſ. cap. 137.
Matth. Camer. 285.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 328.



I. Lilium cruentum bulbiferum.

II Scapus cum radice.

III. Centaurium flor. luteo

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

Liliorum purpureorum, cruentum hoc bulbiferum Martagon lætius & altius grandeſcit, cubitos duos, cujus & ſcapus cum bulbo depictus exhibetur, longitudine ſua excedens. Panditur alatum, punicei aurei coloris floribus: ad ſingulas alas, quibus dicti flores inſident, bulbilli vireſcentes incumbunt ceu gemmæ, plures quidem & majori numero, ubi folia virentia cauli radiatim adnaſcuntur: radix, quæ bulbis ſquammoſa terrâ conditur, ex luteo albeſcit.

Dodon. fol. 199.
Lobel. Obſerv. 84.
Lugdun. fol. 1949.
Cluſius, lib. ſecundo, fol. 137.

Germanicè, Roth Gold-farbe Lilien mit Zwiffeln.

### III

EX floribus Citrioluteis peramœnis, appingitur Centaurium luteum, folijs quidem caulem cingentibus, Perforatæ figurâ erectis tamen, per quæ caulis tranſvehi videtur ex pallido luteus.

Dodon. 134.
Lobel. Obſerv. 219.
Adverſ. 173.
Lugdun. 1290.
Cluſius, lib. ſexto, fol. CLXXX.
Epitom. Camer. 427.
Horto ejuſd. 37.
Matth. Bauhini, 488.

Germanicè, Klein Tauſſendgulden-Kraut mit gelben Blumen.

Fuchſius 145.
Matth. Camer. 214.
Tabernæmont. lib. ſecundo, fol. 456.
Durant. 275.



I. Lilium cruentum polyanthos

III Centaurium minus flore albo.

II. Centaurium minus flore rubro

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

SCapo unico & præalto extollitur Lilium puniceum hoc,rarum, Majeſtatem præ ſe ferens,cruentum , liris ſtriato , ſaturatè Citrio , quem plurima folia mucronata , ejuſdem coloris , confuſo ordine amplexantur. Hujus ſummitate numeroſa florum ſoboles propagata aggregatur , cæſtus inſtar : erant enim Anno 1611. miro naturæ ſpectaculo , & culturæ merito , 84. numerati : Cluſius ſexagenorum meminit : colorem Sandycis æmulantur omnes ; ſtaminum rubentibus apicibus ; piſtillo quadrifido luteo emergente.

Germanicè , Bolt-farbe Lilien mit vilen Blumen auf einem Stengel.

### II

CEntaurium minus , fel terræ , exiguâ durâ radice , caules ſuos porrigit , ex folijs oppoſitis quadantenus enatos , hanc namque Perfoliatæ formam gerit , ſicut ſequens , & Lychnidis modo flores erectos habet pallidè rubentes.

Dodon. fol. 334.
Lobel. Obſerv. 218.
Lugdun. fol. 1789.
Epitome Camer. 426.
Horto Camerarij , pag. 37.
Matth. Caſp. Bauhini , 488.

Germanicè , Klein Tauſſendgulden-Kraut mit rothen Blumen.

### III

VEgetius floribus albeſcentibus erigitur hoc Centauriorum minus , altioribus inſuper caulibus , qui in oppoſitum cinguntur folijs , priore parùm latioribus ; innotuit Lobel. in monte Trinitatis Nerviorum Obſerv. fol. 218.

Germanicè , Klein Tauſſendgulden-Kraut mit weiſen Blumen.



II. *Lilium Byzantinum flore multiplici*

I. **Lilium album.**

III. *Scapus Lilij.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

Lilium Binzantinum flore multiplici, & venuſtate, & raritate, aliud ſuperius deſcriptum ſuperat. In reliquis par illi reperitur, folijs in ambitu ſubhirſutis, inordinatè caulem, purpuraſcente viriditate præditum, ſtipantibus. Flores quoque conveniunt, niſi quòd foliorum convolutorum numero duodenario & ſtaminum multitudine, quâ eundem exæquant, diſcrepent. In radice & ſeminibus alioquin nullum diſcrimen offertur.

Germanicè, Doppelte rothe Türckiſche-Bünd / oder Käyſers-Lilien.

### II

VUlgaris notitiæ quidem hæc planta eſt, ſed quàm Salvatori noſtro præferre placuit omni gloriæ pompæque regis Salomonis, ſolio inſidentis. Hæc illa ipſa eſt, quæ Sceptris Francorum auſpicatiſſimum Symbolum præbuit; quam ex lacte effuſo Junonis dum Poëtæ ortam putant, Roſam Junonis indigitare voluerunt. Cujus florem tam exactè fragilem humanæ noſtræ naturæ conditionem exprimere, præter alios, D. Baſil. & Theocritus autores ſunt. Quæ hîc apponitur, valdè procera eſt, & ſæpius uſque ad bicubitalem altitudinem pervenit. A radice turbinatâ, & è craſſis ſquammoſis nucleis albis ſurſum ſpectantibus conpactâ, in caulem elevatur firmum, carnoſis, latis & levibus, ac læto virore ſplendentibus folijs (quæ unicâ coſtâ medio ſui per longitudinem excurrente notantur) ſtipatum, eaque ſenſim uſque ad ſummitatem ejus attenuantur, ubi pulchri, candidi, nitentes, magni, odorati & ſtriati flores in ramulis aliquot copioſè prodeunt, calathum quaſi efformantes, ab anguſto ortu in latitudinem laxatum, ex ſenis plerunque folijs, & quæ ſummis labris reflexa, conſtantes: in medio illorum ſtylus craſſus, triangularis, ſtaminulis pulverulentis quibuſdam croceis cinctus, eminet. Semen Martagi ferè in pyriformibus toroſis capitulis, intrinſecus alveolis quaſi ſeptum, profert, ſubrotundum, compreſſum, & obſoletè rubeſcens, quod omninò à vulgo poſthabetur.

Brunfels. pag 45. tom. 2. Raps. 13.
Dodon. de ſtirp. coronar. in octa. editione, fol. 121. cap. 32.
Lobel. Obſerv. pag. 83.
Icon. 163. Adver. 60.
Cœſalp. lib. decimo, cap. 33. fol. 419.
Lugdun. lib. 15. fol. 492.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 600.
Camer. Epitom. 570.
Hort. Camer. 88.

Phytopin. Caſp. Bauh. fol. 109.
Germanicè, Weiß Lilien.
Tabernæmont. fol. 326. lib. ſecundo, cap. 17.
Matth. German. Cam. lib. ſecundo, cap. 78. fol. 284.
Trag. cap. 85. fol. 301.
Fuchſ. cap. 137.
Durant. fol. 522.



II. *Veronica recta cærulea.*

I. Sultan Zambach Mar,
tagon Conſtantinopoli,
tanum flore albo.

IIII *Bulbus Sultan Zambach
cum inferiori parte caulis.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

AUri ſacra fames ſeriò Turcarum animos corruptos, inter alias ſtirpes compluri-mas, & hanc, quam hîc unà cum ſcapo ſuo bulboſo exhibitam voluimus, nobis prodere coëgit. Sultan Zambach, quaſi Sultanæ Lilium à Cluſio, à Lobelio verò Martagon album ſeu Lilium candidum Byzantinum appellatur. A Lilio noſtro non valdè diſcrepat, quâ folia & flores, quâ bulbum & caulem, præterquam quòd folia rariora & paulò minora ſint, æquè ac flores, qui aliàs colore pares non minus odorati reperiuntur.

Cluſius nonnullas hujus plantæ radices tantæ molis ſe vidiſſe memorat, ut vix utrâque ma-nu compræhendi poſſent. Idem addit, unam illarum in plano, & tres unicas ferè lato, caule plures quàm ſexagenos flores protuliſſe.

Lobel. Obſerv. pag. 85.
Icon. pag. 163.
Cluſ. plant. hiſt. lib. ſecundo, cap. 5. fol. 135.
Caſp. Bauhin. in Phytopin. fol. 109.

Germanicè, Weis wol-riechende Türckiſche Käyſers-Lilien.

### II

VEeronica recta quorundam Lobel. quam poſt formæ ſimilitudinem etiam ſemine ſe prodit, licet à plurimis Herbariorum in Lyſimachiarum claſſem referatur; veluti & ei-dem Lob. Lyſimachia cœrulea hortenſis nuncupatur. Caule prædita eſt cubitum alto, folijs contrario ſitu in illo poſitis Veronicæ erectæ I. Cluſ. ſed anguſtioribus & magis ſerratis, viri-dibus: floribus in ſummis ramulorum virgis ſpicatim congeſtis cœruleis, eidem Veronicæ aut Gamandreæ non abſimilibus: ſemina in planis bifidis membranaceis marſupiolis compreſſa, lutea, minuata. Radix ſubeſt non profunda, fibroſa, in lateribus ſe valdè propagans.

Dodon. fol. Gall. pag. 58. lib. primo, cap. 50.
Lobel. Obſerv. pag. 186.
Adverſ. 145.
Icon. pag. 344.
Lugdun. lib. nono, fol. 1060.
Cluſ. quò ad Iconem plant. hiſtor. lib. quarto, fol. LII.
Phytopin. Caſp. Bauhin. fol. 469.
Germanicè, Blauer aufrecht-ſtehender Ehren-Preiß.
Tabernæmont. lib. ſecundo, cap. 27. fol. 99.



IIII. Palma Christi.

I. Ornithogalum ſpicatum flore lacteo.

II. Ornithogalum Pannonicum.

III. Palma Christi

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

ORnithogalum, ex albâ, ſquammatâ, bulboſâ, ſeſſili parte, cum capillamentis, radice, profert folia magna, craſſa, carinata, erecta; in quorum medio caulis exurgit, explicatus alis, & pediculis, quilibet florem ſuum dilatantes: exteriùs flos ſex foliolis panſus eſt ſaturatè viridis, interiùs colore lacteſcit, viridibus ſtaminibus, capitulis alboluteis: à quibusdam Ornithogalum Monſpellienſium, lacteum, ſpicatum nominatur.

Dodon. fol. 222.
Lobel. Obſerv. 47.
Lugdun. 1583.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 187.
Epitome Camer. 315.
Matth. Caſp. Bauhin. fol. 413.

Germanicè, Fremd Feld-Zwiffel mit weiſen Blumen.

II

ORnithogalum hoc, à Dodonæo ſcribitur eſſe Aſphodelus bulboſus Galeni Pemptad. 11. lib. 11. fol. 209. Attamen non tam raros habet caulis flores, ſed ijsdem benè veſtitus, ſpicatum quidem dicier promeretur: color florum eſt viridi lacteſcens, nervulo ſcilicet vireſcente, dorſa peragrante. Pannonicum eſt Ornithogalum, Raro Cluſ. lib. 2. fol. 187.

Lobel. Adverſ. 46.
Lugdun. 1582.

Germanicè, Ungariſche Feld-Zwiffel grünlecht Blumen.

III

PLantæ hæ Palmæ Chriſti dicuntur. Prior floribus donata purpureis & incarnatis: alijs Baſilicum majus.

Germanicè, Händlein-Wurtz / Creutz-Blumen / Leibfarb.

IV

ALtera folioſa, ex floribus toto candidis naſcitur.

Germanicè, Händlein-Wurtz / mit weiſen Blumen.

Luculenter hàſce memorant:
Dodon. 240. Lobel. Obſerv. 93. & 49.
Lugdun. fol. 1562. & 1563.
Epitome Camer. 626.
Matthiol. Caſp. Bauhini. 637.
Germanicè, Matthiol. Camer. 303.
Fuchſ. 271.
Tabernæmont. 356.



II. Scabioſa Sylveſtris minor cærulea.

Ornithogalum Arabicum.

III. Geniſtella Tinctorum

Quintus Ordo, Fol. 12.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ORnithogali elegantior præpollet hæc ſpecies Arabica, Hyacinthi Orientalis æmula, parùm ab eo differens. Lacteo florum colore prædita eſt, ſtaminibus æquè candidis, apicibus luteis, cùm foliolorum extremitates acuminatæ quoque luteæ ſint: capitellum porrò in medio floris protrudit nigricans: caule protenſo lucidè viridi: ſicut & folijs carinatis, ex bulbo cum ſuis annatis & capillamentis candicantibus emiſſis.

Dodon. Pempt. 2. lib. ſecundo, fol. 221.
Cluſ. lib. ſecundo, fol. 186.

### II

SCabioſam Minorem flore cœruleo Agreſtem quidam hanc indigetant, quæ anguſtis, tenuibus & leviter criſpatis conſtat folijs, cauliculos habet protenſos, rotundos, mediâ ſuâ parte nudos. Horum ſummitati inſidet flos conglomeratus, figurâ conglobatâ, cœrulei coloris, qui paulatim preſſior dilatatur.

An correſpondeat deſcriptioni
Lobel. Adverſ. 232.
Lugdun. ſub nomine Aphyllantis 1. fol. 864. lib. 7. cap. 36.
Phytop. Caſp. Bauhin. fol. 528.
Caſp. Schvvenck. lib. 1. ſtirp. Sileſ. fol. 192. ſub nomine ſtebes minoris.

Germanicè, Wild Apoſtemen-Kraut / mit hoch-blauer Blum.
Tabernæ Icon. pag. 162. Herbario lib. 1. pag. 548.

### III

GEniſtella infectoria, tinctoria, folijs anguſtis, acuminatis, numeroſis, virentibus ſurgit, floribus ad faſtigia copioſis, & ſiliquis ſummè luteis.

Dodon. fol. 751.
Cluſ. lib. primo, fol. 102.
Lobel. Obſerv. 531.
Adverſ. 407.

Germanicè, Ferb-Blumen / Häiden-Schmuck.



III. *Polygonatum maius.*

I. Ornithogalum Hispa-nicum spicatum.

II *Polygonatum vulgatius.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ORnithogalum Hiſpanicum, non ſcriptum, in ſpicam tranſit, & attollitur floribus lacteis candidis, cauliculũ levius virentem ambientibus. Bulbus huic eſt parvus, non cæpaceus, nec ſquammoſus, albicans tamen, affixis fibris inferiùs capillaribus. Folia protendit anguloſa ferè triquetra, aliquantùm carinata, herbacea.

An congruat cum ſolertiſſimi Cluſij deſciptione,
L. 11. fol. 188. edita?

Germanicè, Spaniſche Stern-Blumen.

### II III

SAlomonis ſigilla, ſive Polygonata, duarum ſpecierum hîc effigiantur, ſic dicta potiſſimùm, quòd multùm geniculatis radicibus nitantur, ex quibus cauliculi ſatis tenues emiſſi, per intervalla diſtincti, latioribus, nervoſis, porraceis folijs adornantur: quæ ſingulos ſuos affixos habent floſculos albos dependentes. Floribus protruſis & annatis globuli ſuccedunt virides, qui in majori Polygonato tandem nigricant. Differunt aliàs hæ duæ ſpecies in hoc evidentius, quòd Majus Polygonatum pluribus, craſſiore tamen radice, geniculis careat, lætioribus nihilominus folijs, binóque florum ampliorum numero gaudeat.

Dodon. fol. 343.
Lobel. Obſerv. 361.
Adverſ. 283.
Lugdun. fol. 1623.
Cluſ. fol. 276. lib. ſecundo.
Camer. Epitom. 693.
Matth. Caſp. Bauhin. fol. 678.

Germanicè, 1. Weiß-Wurtz. 2. Groß Weiß-Wurtz.

Fuchſ. cap. 223.
Trag. 150.
Matth. Camer. 325.
Tabernæmont. lib. 11. fol. 430.
Durante fol. 778.



II Ornithogalum lacteum maxi mum.

I. Hyacinthus Serotinus obſoleto colore.

III Ornithogalum Spicatum maximum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

REſpondet hic Hyacinthus ſerotinus deſcriptioni diligentiſſimi Cluſij, L. II. Rarior. Plant. fol. 177. exaratæ, niſi quòd erecta habeat folia, imbricata, ſaturatè viridia, eaque duo potiſſimùm, in quorum divaricatione aſcendit cauliculus rotundus, ex utroque latere floribus ſubfuſcis vel obſoletis ornatus.

Germanicè, Später Hyacinth.

### II

RArioris & inſolitæ aliàs magnitudinis, eſt Ornithogalum lacteum ſpicatum maximum, in hoc perquàm celebri horto, bicubitale proſiliens: caule multùm erecto, rotundo, ex folijs protenſis, ſuperiùs flexuoſis, anguſtioribus, porraceis. Supra medium caulis, flores, ad cacumina uſque, radiatim prodeunt, quilibet, ex ſuis pediculis unicas longis, ſoli: ſex foliolis interiùs, lacteis, exteriùs verò lacteo herbaceis conſpicui, capitulo luteo, ſtaminibus purpureis. Bulbus ex cæpaceis tegumentis & tunicis albicantibus, filamentis craſſioribus, pro plantæ magnitudine robuſtis, circumſparſis, nutrimentum humi petit.

Germanicè, Weiſe groſſe Feld-Zwiffel.

### III

ORnithogali lactei ſpecies Major (comoſum quis dicere poſſet) ex duobus bulbis connatis, cum ſuis capillamentis, effunditur folijs anguſtis, craſſis, porraceis, reflexis; caulibus aſſurgentibus, prope ſuperiores partes, floribus lacteis undique ſtipatis, medicati odoris, quorum ſtamina cum luteis apicibus ſunt purpurea.

Germanicè, Ein andere Art der groſſen weiſen Acker-Zwiffeln.

Pleniorem horum qui deſiderat delineationem, Autores conſulere poteſt, quorum in præcedenti Ornithogalum adumbratione facta eſt mentio.

# SEXTUS ORDO

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.



II. *Trifolium Acetosum flo: albo.*

I. Roſa Damaſcena flore pleno.

III. *Trifolium Acetosum flo: flavo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ROſa Damaſcena flore pleno albo. Palmarem venuſtatis & odoris gratiam, ſupra cæteros ferè flores omnes, veterum ſimul & recentiorum tàm ſacris quàm profanis elogijs Roſa obtinuit, populos deſiderio ſui etiam ad plura diſcrimina indaganda permovens, quæ Theophraſto & Plinio potiſſimùm, multitudine, aſperitate, levore, colore, odore foliorum, & locis natalibus æſtimare placitum fuit. Noſtra in Damaſcenarum odoratiſſimarum cenſu ponenda videtur. Caulis altitudo eſt binorum cubitorum, qui variè ramoſus, purpuraſcens, hamatis ſpinulis obſidetur: folia vulgares roſas æmulantur, oblonga, & paulò minora, modicè circumſerrata, ac unicæ coſtæ, quinario aut ſeptenario numero, æqualiter & utrinque conjugatim affixa, præter ſuperioris partis virorem, infernè albicantia: flores pari ſpecie & formâ vulgare genus referunt, multiplici foliorum alborum conglomeratione in orbem collecti, ſuaviſſimi odoris Moſchati fragrantiâ placentes: ſemina & radix vulgatiori genere parùm diſcrepant.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. fol. 187. in textu. | Hort. Med. Cam. 144. fol. | Tabern. 787. lib. 3. |
| Lobel. Obſ. 618. Adv. 446. fol. | Matth. Caſp. Bauh. 167. fol. in textu (ner Röslein. | Matth. Cam. Germ. 55. fol. in textu. |
| Lugdunenſ. 425. | Germ. Gefüllt Biſen oder Muſchcate/auch Damaſce- | Durant. 852. |

### II

TRifolium acetoſum, Oxys Pliniana, Alleluja & Panis cuculi, Oxytriphyllon, flore albo. Radicula brevis, ſubrufa, compactili ſquamarum albeſcentium coagmentatione ſe humi diffundit, erigens ſingulis longis pediculis folia tripartitâ ſerie ſimul juncta, ſi nubus externis ſpecies cordatas referentia, viridia, mollia, guſtu acida, veſpere aut pluviâ iminente, ut Clariſſ: Cluſius de Oxy luteâ loquitur, in umbonis quaſi figuram ſe complicantia: flores ſingulatim ſimilibus ſtylis ſuffulti, quinis folijs albis, tenuibus, ac aliquot, minutis in medio ſtaminulis donantur: capitula pentagona ſubnaſcuntur, exili, copioſo, ruſo ſemine referta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodon. 568. | Hort. Med. Cam. 114. | Trag. 197. fol. cap. 178. lib. | Durant. 1012. fol. |
| Lobel. Obſ. 495. Adver. 381. | Matth. C. Bauh. 608. & 609. | Fuchſ. 213. cap. | Qui præter Fuchſium & Tragum, etiam ſequentis, ijsdem |
| Lugdunenſ. 1355. | Phytopin Bauh. 656 (der Buchklee. | Tabern. 224. lib. ſecundo. | locis, mentionem faciunt. |
| Epit. Matth. Camer. 584. | Germ. Sauerklee/Buchampffer o- | Cam. Matth. Germ. 292. | |

### III

OXys corniculata repens flore flavo, Trifolium acetoſum corniculatum. Figurâ ac foliorum ſerie prædicto reſpondet, anguſtiora tamen ſunt, & ſubhirſuta, pallidè virentia: ramulos habet multos, quandoque ſubrubentes, rotundos, tenues, humi fuſos, ac geniculatim ſe crebris radiculis capillaribus firmantes: floſculi quinque folijs flavis ſtellatim emicant, Vulgatiore minores, aliquot ſimul juncti: ſemina ferunt ſuccedentia, acuminata, angularia, ſurſum verſa cornicula, quæ matura levi attactu laterum hiantium oſculis granula minuta, rufa, rugoſa, ſubrotunda & compreſſa ſucceſſivè expuunt & ejaculantur, conniventibus viciſſim oſculis: radix tenuis, ſubrufa, in capillamenta abit.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 569. ſine deſcriptione Iconem | Cluſ. lib. 6. fol. CCXLIX. (Blumen. | Reliquos Autores ſuperiùs vide. |
| Cœſalpin. lib. 15. c. 2. fol. 564. (poſuit. | Germ. Mälerkraut oder Sauerklee mit gelben | |


IIII.
Rosa lutea maxima flore pleno
III.
Rosa provincialis flore in„ carnato pleno.
I.
Rosa centifolia rubra.
II.
Rosa prænestina variegata.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

ROſa centifolia Batavica rubra. Æmulatione foliorum latiorum, vireſcentium, vulgari Provinciali præſtat, pariter ac fortioris & gratioris odoris fragrantiâ, colore magis rubro, amplitudine & ſtipaturâ florum multiplicium: cætera affinitatem cum dictâ Provinciali abundè fatentur. Noſtra ducentenorum foliorum numero adprimè placebat.

Vid. Cluſ. 113. lib. 1.

Germanicè, Groſſe Holländiſche-Roſen / von hundert Blättern / mit rothen Blumen.

II

ROſa Præneſtina variegata plena. Folijs & caulibus à prædictâ non multùm recedere videtur, flores expanduntur in folia dimidiatim rubeſcentia, vel ſtrijs rubris exarata, aut, ut Cluſ. habet, tertiâ duntaxat parte alba, ſeu nunc integra alba, modò integra rubra, inter ſe commixta, pari luxuriâ, quâ Caryophylli quidam hortenſes, mirificè variant.

Vid. Cluſ. loco ſuperiùs citato.

Germanicè, Gefüllte geſprengte rothe oder leib-farbe Roſen.

III

ROſa Provincialis flore incarnato pleno. Roſa Perſica quorundam. Alabandicæ Plinij ſimilis Dodon. Virgarum pallidè virentium, & hamatis aculeis horrentium altitudine ſatis attollitur: folia lata idem nervus, ab exortu in bifidas lacinias laxatus, quinquepartitis diviſuris porrigit: flores alabaſtra turbinata quodammodò ſuſtinent, multiplici pallidè rubentium foliorum texturâ odóreque ſuaviſſimo ſuperbientes, ſtaminulis meditullij quam plurimis capillaribus flaveſcentibus donatos: ſemina ovalibus capitulis & per maturitatem rubentibus latent, alba, dura, inæqualia, lanugine condita: radix, pariter dura & lignoſa, hinc & inde divaricatur.

Dodon. 187. & 189. fol.
Lobel. 446. Adv.
Lugdunenſ. fol. 425. in textu.
Hort. Med. 143.

Matth. Caſp. Buhin. 167. in textu.
Germanicè, Leibfarb Provintz- auch Ulmer-Roſen mit gefüllten Blumen.
Tabern. 786.

IV

ROſa lutea, ſeu flava, maxima, flore pleno. Foliorum, quæ virentia ſunt, minora, & inordinata, ſitus idem eſt; virgæ non parùm ſpinoſæ. Flores frequentiſſimi, confertiſſimâ foliorum numeroſorum, flaveſcentium, & ultra centenarium numerum progredientium, fœturâ blandiuntur, prædictæ amplitudine proximi, qui tamen æſtatibus pluvioſis facilè, antequàm planè dehiſcant, à madore corrumpuntur.

Cluſ. Append. alt. f. 1. later. 2. Curis poſter. 6. & 7. f. Germ. Groß doppelte oder gefüllte gelbe Roſen.



IV.
Rosa provincialis flore albo.



III.
Rosa Milesia flore rubro pleno.



II.
Rosa alba flore simplici.



I.
Rosa flore albo pleno.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ROſa flore albo pleno. Pleriſque hortis noſtratium familiaris eſt, & ſæpiùs culturæ neglectu in ſimplicem degenerare ſolet.
Vide Autores ſuperiùs deſignatos.

Germanicè, Weiß gefüllte Roſen.

### II

ROſa alba flore ſimplici. Vulgatioris notitiæ eſt, atque paſſim terrarum cognita, & tantùm foliorum numerum pauciore à præcedenti variat.

Germanicè, Weiſe einfache Roſen.

### III

ROſa Mileſia rubra flore pleno. Coloris nitore tantùm à cæteris recedit, quantùm reliquâ facie ſe illis affinem probat: vulgò Roſa Fina dicitur.

Germanicè, Doppelt gefüllte geſampte Roſen.

### IV

ROſa provincialis flore albo. Folijs vernat lætioris coloris latioribus, ac florum multiplicium gratiore fragrantiâ, nec non aſpectu nivei candoris oculis blanditur, præter cæteras notas, quibus ſe prædictis aſſociat.

Germanicè, Weis Provintz- oder Ulmer-Röslein.



IIII.

*Rosa Damascena flo: sim-plici.*



III.

*Rosa rubicunda Sacchari-na dicta.*



II.

*Rosa lactea Camerarij.*



I.

Rosa ex rubro nigricans flore pleno.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ROſa, è rubro nigricans, flore pleno. Trachinia Plinij habetur Camerario, cui aliquid violacei diluti admixtum in illâ obſervatum; amplo eſt flore, & holoſericum eiuſdem coloris imitatur, aliàs prædictarum ſocietatem nullatenus abnegat.

Germanicè, Gefüllte Kol-Roſen.

### II

ROſa Lacteola Camerarij, Uratiſlavienſium hortis copioſè culta. Quantùm amplitudine reliquis congeneribus cedit, tantùm recompenſat denſiſſimâ numeroſorum parvorum foliorum congerie, quæ, ut Camer. verbis utar, ſingula, ſi evellantur, candida ſunt; cum verò ſimul calici inhærent, in flore adhuc integro, videtur quidam dilutus rubor emicare. Prædictorum claſſe digniſſima.

Germanicè, Weis Preßler-Röslein.

### III

ROſa rubicunda, Saccarina dicta. Græcula Plinij Camerar. Denſo & firmo umbilici meditullio conſtat, folijs latioribus, nec minùs odoratis floribus, & à ſaccaro Roſarum, cui deſtinatur, nomen ſumit. Alioquin relinquarum conſortio ſe inferendam offert.

Germanicè, Zucker-Röslein.

### IV

ROſa Damaſcena flore ſimplici. Præcox eſt præ ſuperiore, quæ flore pleno nitet, & aliquantùm ad puniceum colorem vergit, obſervante eodem Camer. qui Neſrin vel Neſrin Avicennæ & Serapionis putat. Folia magis acuminata ſunt, cæteroquin prædictis addicenda eſt.

Germanicè, Einfache Damaſcener-Röslein.



IV.

*Rosa præcox ſpinoſa flor. albo.*



III.

*Rosa rubra præcox flor. ſimplici.*



II.

*Rosa Cinnamomea.*



I

Rosa lutea flore ſimplici.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ROſa lutea flore ſimplici. In Geniſtæ ſcapum inſitam talem florum colorem mutuare, Scriptores rei ruſticæ tradunt. A cæteris differt foliorum viriditate, nitore, parvitate, odóreque beneolenti, quibus ſpinarum frequentiâ ſe adjungit: flores lutei ſunt, & quinis latis folijs inodoris, ambitu cordis ſpecie ſinuatis, conſpicui, conſortio cæterarum digni.

Germanicè, Einfache gelbe Roſen.

### II

ROſa Cinnamomea floribus plenis. Formâ quidem & foliorum cohærentijs cognatæ familiæ reſpondet, minorum tamen, ſupernè vireſcentium, infernè albeſcentium. Caules purpuraſcunt, minutis ſpinulis armati: flores denſâ foliorum, dilutè rubentium, ſtipaturâ farciuntur, odoris remiſsioris: radix vivacibus virgis emiſſis ſe latè ſpargit. Bis floret annuatim.

Germanicè, Doppelte rothe Zimmet-Roſen.

### III

ROſa rubra præcox flore ſimplici. Rubro florum colore, parùm odore valentium, & folijs latioribus, â prædictâ diſcernenda venit.

Germanicè, Einfache rohte Frühe-Röſlein.

### IV

ROſa præcox ſpinoſa flore albo. Foliorum odoratorum, Pimpinellam Sanguiſorbam minorem referentium, parvitate cæteris ferè omnibus cedit, floribus Roſam Cinnamomeam refert, cujus etiam more quinis folijs conſtat, umbilicum medium ſtaminibus luteis obſitum cingentibus: caulis bicubitum attingit, rubens, & denſiſſimè ſpinulis horrens, æquè ac ramuli, frequenter inordinatâ ſerie ab illo prodeuntes: fructus folijs florum deciduis ſuccedit rotundus, parvæ nucis Avellanæ magnitudinem æquans, à viriditate per maturitatem nigricans, refertus ſemine anguloſo, inæquali, candido, copioſo (quod Theophraſto Knikôdes dictum) radix variè divaricatur.

Germanicè, Weiſe Frühe-Röſlein.



IV.
*Rosa Eglenteria.*



III.
*Rosa Milesia rubra flore ſimpl:*



II.
*Rosa Sÿlveſtris flore rubro.*



I.
Rosa ſÿlveſtris odorata incarnato flore.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ROſa ſylveſtris odorata incarnato flore. Folijs hortenſium Roſarum eſt, ſed minoribus; caulis aculeis rigidis, firmis, aduncis obſidetur: flos ſimplex carnei coloris, & quandóque ad dilutam rubedinem tendens.

Germanicè, Wol-riechendes Dorn-Röſlein.

### II

ROſa ſylveſtris flore rubro. Majoribus tantùm folijs floribúſque rubentibus conſtat, germanum genus alioquin non deſerens.

Germanicè, Rothe Feld-oder Hecken-Roſen.

### III

ROſa Mileſia flore ſimplici rubro. Roſa Fina. Caulis, ſpinulis armatus, & folijs amplioribus veſtitus, faſtigiatur in flores ſimplices, ſenis aut octonis folijs præditos, intensè rubentes, etiam arefacti hunc colorem, unà cum odore ſuo, ſatis pertinaciter retinentes, quâ gratiâ etiam ad uſum officinarum Pharmacopoeis paſſim expetuntur.

Germanicè, Rohte einfache Gefeint-Roſen.

### IV

ROſa Eglenteria, Eglenterium Gallorum Ruellij. Spina Mariæ. Folijs Pimpinellam Sanguiſorbam affectat, ſylveſtri ſpinoſâ præcoci paulò majoribus, glabris, odoratis, ſplendentibus: Roſæ ſemiplenæ Cinnamomeæ magnitudine albicabant: ſeminum capitula lanoſis floccis granula parva angularia ſervantes, cognatam familiam referebant.

Germanicè, Fremd Pimpernellen-Roſen. Aglantier Roſen genandt.

De roſis ſingulis & pleriſque vide
Dodon. 186. 187. &c. fol. Cœſalpin. lib. 3. cap. 10. fol. 95.
Cluſ. 113. 114. 115. &c. fol. Lobel. 618. Obſ. Adv. 446.
Lugdunenſ. 124. 125. 126. fol. &c. Epit. Matth. Cam. 98. 99. fol.
Hort. Med. Cam. 143. 144. 145. &c. Matth. C. Bauh. 166.

Germanos:
Fuchſ. 255. cap. Tabern. 786. 787. &c. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 55. fol. Caſt. Durant. 853. fol.



III. *Meliſsa Fuchſij.* I. Pæonia flore pleno incarnato. II. *Ophiogloſsum.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia flore pleno incarnato. Pæonia ex albido pleno flore major Cluſ. Folia ſupernè virentia, ſubtùs ferè cæſia, Smyrnij more, ut de Pæon. fœmina Dioſcorides habet, vel Libanotidis albæ inſtar, ſingulis pediculis craſſis & carnoſis particulatim com̄ittuntur, quos fulcit caulis æquè carnoſus & ſeſquicubitalis, cujus ſum̄itates florem, confertis foliorum, ad dilutè roſeum colorem vergentium, glomerationibus ſtipatum ſuſtinent, plenæ vulgatioris Pæoniæ magnitudine, qui pertinaciter folia retinet, ætatis ſucceſſu albeſcentia: radices ſubſunt variè contortæ, craſſæ, fuſcæ, in gracileſcentes oblongas Aſphodelinas nodoſas appendices deſcendentes: cornicula ſeminum molitur quidem, ſed parva, & plerunque ſine totali granorum abſolutione marceſcentia.

Germanicè, Leibfarb gefüllte Gicht-Roſen.

### II

OPhiogloſſum. Lingua ſerpentina aut vulneraria Cordi. Eneaphyllum, & Lancea Chriſti Herbar. Radicula densè fibrata, adnatis tenuibus ſe propagans, cauliculum fulcit, in oblongum, ſurrectum, pingue, & nullis nervis liratum folium deſinentem, Plantaginis aquaticæ adhuc recentioris æmulum, è cujus ſinu ſtylus attollitur pallidus, herbaceus, cacumine ſuo ſerpentis linguam referentem ligulam, modò ſingularem, bifurcatam, aut rariùs trifurcatam, particulatim utrinque tenuiter denticulatam, erigens, è quâ poſtmodùm ſemen tenue pulveraceum diſpergitur.

Dodon. 139.
Cœſalpin. lib. 16. cap. 17. fol. 600.
Lobel. Obſ. 471. Adv. 360.
Lugdunenſ. 1047. fol.
Epit. Cam. 364.
Hort. Med. 110.
Matth. C. Bauh. 447.

Germanicè, Natter-Zünglein.
Trag. cap. 106.
Fuchſ. 219.
Matth. Cam. Germ. 194.
Tabern. 519.
Durant. 673. & 674.

### III

MEliſſa ſeu Meliſſophyllum Fuchſij. Lamium Pannonicum 1. albeſcente flore Cluſ. Herba ſacra Agrippæ quorundam. Multi ab unâ radice, plurimùm fibratâ, è fuſco nigricante, caules cubito breviores, quadrati, hirſuti ſurgunt, quibus adverſis ſubindè pediculis affiguntur folia, Meliſſophyllo vulgari ampliora, longiora, atroviridia, pariter hirſuta: ſinubus pediculorum emittuntur utriculi, promentes ſingulatim florem, Lamijs ſeu Calaminthæ montanæ præſtantiori majorem, oblongum, ſuperiori parte albeſcentem, inferiore ſaturatè purpureum: ſemina condunt ijdem utriculi nigricantia, inæqualia.

Lobel. Obſ. 277.
Cluſ. XXXVII. lib. quarto
Lugdun. 958. fol.

Hort. Med. 99. fol.
Phytopin. C. Bauh. 438.
Germ: Meliſſen deß D. Fuchſen.

Trag. cap. 3. lib. I.
Fuchſ. 190. cap.
Matth. Cam. 289. fol.



II. *Sedum minus flo: rubente.*

I. Pœonia polÿanthos flore rubro.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia Polyanthos flore rubro. Folia cognati generis more quaſi ramoſa, pluribus oblongis venoſis ſegmentis conſtantia emittit, ab unâ radice divaricatâ, craſsâ, & in glanduloſas, carnoſas, amplas appendices divisâ: caules cubitales ſunt, & paribus folijs rariter cincti, vertice tenus ſingulatim attollentes amplos flores, hilari rubore perfuſos, & densâ numeroſiſſimorum foliorum congerie farctos, adeò ut Camerar. in uno flore quandoque quingenta folia, majora & minora, ſe numeraſſe refert: ſuccedunt cornicula, exteriùs hirſuta, lata, in quibus ſeminum rudimenta apparent.

Germanicè, Rothe-gefüllte Päonien-Roſen / oder Gicht-Roſen.

### II

SEdum minus flore rubente. Folia emittit crebra, pinguia, ſubhirſuta, & in quàm plures orbes agminatim coacta, vulgari Sedo conformia, ſed multò minora, radicibus flexuoſis, carnoſis, prolificis, & ſubtùs capilloſis, ſuffulta: inter hæc caulis, dodrante plus minus altior, erigitur, ſucciplenus, rubeſcens, & pariter anguſtioribus ac mucronatis folijs ſeptus, ſupernè in ramulis proferens flores, è rubro purpuraſcentes, radiatos, folijs duodenis, & totidem capituli orbiculati corniculatis angulis, meditullium, ſtaminulis exilibus undique circumdatum obſidentes.

Cluſ. lib. quarto, cap. 43. fol. 64.

Phytopin. C. Bauh. 554. fol.

Germanicè, Kleine Hauß-Wurtz mit röthlechten Blumen.



II. Aſarum

I. Pœonia peregrina flore coccineo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti , Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia peregrina flore coccineo. Radicibus Aſphodelinis fœminam multiplicem æmulatur , ſicuti & folijs viridibus , & ſupernè ſub cæſijs : flos octonis folijs, à rubro ad coccineum colorem vergentibus, placet:ſemen cognatam familiam refert.

Germanicè , Fremd Päonien / von hoch Pommerantzen-farben.

### II

ASarum. Nardus agreſtis , quia vim Nardi habet , Plinio atteſtante. Vulgago Macri. Sanguis Martis, Bacchara. Radices numeroſæ, odoratæ, graciles , obliquatis multiplicibus fibratis proceſſibus ſummâ tellure diffunduntur : folia venoſa, atroviridi colore ſplendentia , lævia, pinguia, magnitudine æquè ac circinatâ rotunditate hederam æmulantur , auriculæ ſignaturam Spagyricorum indicio obtinentia : flores ſub folijs conduntur , longis uti folia ſubvecti pediculis , obſcurâ fuſcedine purpuraſcentes , Cytinorum Hyoſcyami æmuli, qui deindè rotunditate magis intumeſcentes , ſemina anguloſa , vinaceis acinis ſimilia proferunt.

Dodon. 354. fol.
Cœſalpin. lib. 9. cap. 36. fol. 389.
Lobel. Obſ. 328. Adv. 262.
Lugdunenſ. 914. fol.
Epit. Matth. Cam. 19. fol.
Hort. Med. Cam. 22. fol.
C. Bauh. Matth. 37. fol.
Phytopin. 368. fol.

Germanicè , Haſel-Wurtz / quia ſub corylis creſcere gaudet.

Trag. cap. 20. lib. I.
Fuchſ. cap. 3.
Tabern. 424. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 9. fol.
Durant. 100. fol.



III. Sanicula.

I. Pæonia mas flore purpureo.

II. Alchimilla.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

PÆonia mas flore purpureo. Vix ulli cæterarum cedere videtur floris amplitudine, qui è rubore ad purpureum colorem multùm vergebat, ac folijs octonis, ſtaminulíſque plurimis, quorum apiculi aurei, geminata, & nonnihil lanuginoſa corniculata quaſi nucamenta, aut capitula, apice craſſo, rubeſcente, nutante faſtigiata, orbiculatim circumcircà ambiebant. Capitula autem illa per ætatem in majorem extumeſcere ſolent magnitudinem, maturitate dehiſcentia, lunatim ſe contrahendo, interni corticis membranam foris vertunt, pulchrâ rubedine ſuffuſam, ac granis cæſio nigricantib⁹, ſubrotundis, Ochri magnitudine, aliíſque oblongis, nondum abſolutis, coccineo colore tinctis, ſubindè intermiſtis, obſita cernuntur.

Germanicè, Purpur-roth einfache Gicht-Roſen.

II

ALchimilla ſtellaria. Pes Leonis, Droſium Cordi. Radiculæ craſſæ, ſubrufæ, obliquæ, & ſubtùs plurimùm fibratæ, ſobole laterali emiſsâ, in diverſa tendunt, tenuibus longis & ſubhirſutis pediculis erigentes folia rotunda, Malvarum ritu, dilutè virentia, & aliquantùm ſub cæſia, carinata, & initiò quaſi complicata, atque per ſenos vel octonos angulos denticulatos circumſerrata: inter illa caulis erumpit tenuis, ſubhirſutus, inæqualiter ramoſus, paucis per intervalla alijs folijs minoribus cinctus, qui in ſummo ſuſtinet floſculos faſciculatim ſparſos, tenues, numeroſos, ſtellarum ſpecie (unde etiam planta denominata eſt) coloris ex herbaſceo palleſcentis.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 140. fol. | Epit. Matth. Cam. 908. | Trag. lib. I. cap. 174. |
| Cœſalp. lib. 14. c. 24. fol. 557. | Hort. Med. 9. fol. | Fuchſ. 234. cap. |
| Lobel. Obſ. 378. Adv. 298. | C. Bauh. Matth. 819. fol. | Tabern. 308. lib. I. |
| Cluſ. lib. v. fol. cviii. | Phytopin. 640. fol. | Matth. Cam. Germ. 411. |
| Lugdunenſ. 1281. fol. | Germ. Sinau/oder Löwen-Tatzen. | |

III

SAnicula mas Fuchſ. Diapenſia & Sideritis tertia Dioſcorid. Fabij Columnæ. Folia quaſi vitiginea, lævia, obſcurè virentia, quinquepartitim diviſa, per ambitum ſerrata, oblongis tenuibus pediculis ſubvehuntur, à radice craſsâ, nigricante, & æqualiter protuberante, inferiúſque fibratâ: caulis cubitum æquat, quandoque ſubrubeſcens, cujus ſum̃itates in umbellam quaſi abeunt, floſculos candicantes muſcoſos ſuſtinentem: ſemina parva, aſperiuſcula ſequuntur, veſtibus adhæſitura.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 140. | Hort. Med. 152. | Trag. cap. 173. lib. I. |
| Cœſalp. lib. 14. c. 22. fol. 556. | C. Bauh. Matth. 720. & 722. in textu Bauh. | Fuchſ. 260. cap. |
| Lobel. Obſ. 378. Adv. 297. | Phytopin. 639. | Tabern. 302. lib. I. |
| Lugdunenſ. 1268. | Germanicè, Sanickel. | Matth. Cam. Germ. 353. |
| Matth. Epit. Cam. 763. | | Durant. 895. fol. |



I.
Pæonia mas maior flo-
re incarnato.

II.
*Polÿgalon flore rubro pur-
purascente.*

III.
*Polÿgalon flore cæruleo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia mas major, flore incarnato. Reliquas congeneres florum amplitudine ſuperat, alioquin illis parùm diſpar, foliorum herbaceorum particulis paucioribus, majoribus, vireſcentibus, ab unâ coſtâ hærentibus, conſtat.

Germanicè, Die gröſte leibfarbe Gicht-Roſen.

### II

POlygala, ſeu Polygalon flore è rubro purpuraſcente. Flos crucis, Flos Ambarualis. Pluribus, & ſtatim ab exortu diverſis, ex eâdem radice oblongâ, tenui, lignoſâ, reſtibili, fruticat virgis, crebris folijs viridibus, anguſtis, Hyſſopi, Lentis, aut Geniſtæ humilioris æmulis, inæqualiter onuſtis: flores è rubro purpurei, in ſummitatibus virgarum dependentes, aperti, aviculas, abſque capite expanſis alis ſe ad volatum librantes, referunt, vel ſi mavis crucis effigiem: ſemina theculis ſeu valvulis latent, Thlaſpeos modo.

Germanicè, Rothe Creutz-Blumen.

### III

POlygalon Tragi flore cœruleo. Coloris ratione vulgatius eſt, & unicè à prædicto diſcernendum.

Dodon. 253.
Lobel. 228. Adv. 179.
Lugd. Onobrychid. ſecundæ titulo, fol. 491.
Phytopin. C. Bauh. 406.

Germanicè, Blaue Creutz-Blümlein.

Trag. lib. I. cap. 169.
Tabern. 501. ſecundo lib.



II. *Pÿrola minima.*

I. Pæonia mas flore incar, nato.

III. *Pseudochamæbuxus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia mas flore incarnato. Majoribus & latioribus foliorum ſegmentis & ſubtùs exalbidis variat, floribúſque ad carneum colorem vergentibus.

Germanicè, Leibfarbe Päonien / das Männlein.

### II

PYrola minima. Radiculæ tenues & parvæ plurimùm diffunduntur, folia ſunt Pyrolâ vulgari longè minora, & rotundiora, in ambitu modicè crenata, inter quæ pediculi aliquot graciles ſingulatim extollunt florem album, quinque folium, Hepaticæ albæ Cordi æmulum, ſuaviter odoratum, ſtaminulis vireſcentibus medijs capitulum protuberans ambientem, & ſtylo, exertâ coronulâ faſtigiatim exornato, Cluſianam Pyrolam quartam referentem.

Vide Cluſ. lib. 5. fol. CXVIII.

An Alſinántemon Thal. Harcyn. Saxono Thuring. fol. 14.

Phytopin. C. Bauh. 358.

Germanicè, Klein wol-riechend Wald-Mangolt.

### III

ANonymos flore Coluteæ ſeu Pſeudochamæ buxus quorundam. Radix tenuis, lignoſa, obliquatis proceſſibus, ſubtùs fibratis, per telluris ſuperiora vagatur, quâ nituntur plurimi obſequioſi, dodrantales, & fractu contumaces, foliiſque denſis, viridiuſculis, Pervincâ aut potius Buxo anguſtioribus, & magis acuminatis, ſepti ramuli, in quorum ſummitatibus flores alati aliquot Coluteam affectant, albeſcentes, quà folia ſurſum erecta; quà verò in longitudinem prominentia, lutei coloris, aut per vetuſtatem (ut Cluſ: habet, à quo graphicè deſcribitur) purpuraſcentis vel rubeſcentis; quibus ſemen in compreſſis ſiliquis Thlaſpeos ſubſequitur.

Vide Cluſ. lib. 1. fol. 105.

Anonymos fortè Pervincæ folio, Camer. 17. fol.

Germanicè, Falſcher kleiner wilder Buchs-Baum oder Winter-Grün.



II
Cyclamen Vernum.

I.
Pæonia Mas flore albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia mas, flore albo ſimplici. Radice cognata genera æmulatur, anguſtioribus tamen & oblongioribus glandularum appendiculis: folia, è pluribus particulis commiſſa, infernè pubeſcunt: flores, diluto aliquantùm rubore ſuffuſi, albicant, ſimplici octo foliorum ſerie conſtantes. Quidam ad marem, quidam ad promiſcui generis cenſum ſeu familiarem referunt.

Lobel. Obſ. pag. 390. paucisſ. verbis attingit.
Cam. Hort. Med. pag. 115.
C. Bauh. in Matth. recogn. in textu, fol. 656.
in Phytopin. fol. 647.

Germanicè, Einfache weiſe Gicht-Roſen.

### II

CYclamen vernum. Radice tuberosâ vulgare refert; folia minora hederacea oblongis pediculis hærent, &, marginibus ſuis quaſi circumroſa, in mucronem procedunt, ſuperiùs albidis maculis, inferiùs purpuraſcenti colore tincta: flores vulgaris ſpeciem affectant, intenſiùs rubentes, vel omninò albeſcentes, odore magis præſtant.

Cluſius fol. 265. lib. ſecundo.
Append. ſecundo cap. 59.
Lobel. Adverſ. 264. ad illud alludere videtur.

Germanicè, Schweins-Brot / welches im Frühling blühet.



V.
Borago flore cæruleo.



IIII.
Borago flore albo.



II.
Pæonia Bizanthina Minor.



I.
Pæonia Bizanthina Maior.



III.
Pæonia pum

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia Byzantina major. Pæoniæ multiplici, caule & radicibus non abſimilis eſt, folijs craſſioribus varians: flos ſingularis in vertice emicat, octo aut pluribus folijs, pulchrè rubentibus, conſtans.

Germanicè, Groſſe Bitzantiniſche Päonien-Roſen.

### II

PÆonia Byzantina minor. Folia rariùs erant laciniata & ſurrecta, flores minores, magis diluti ruboris, & pauciorum foliorum, Cluſianæ Byzantinæ ſecundæ quadantenus reſpondere videbatur.

Germanicè, Kleine Bitzantiniſche Päonien-Roſen.

### III

PÆonia pumilis. Folia brevioribus, oblongis licet & tenuioribus ſectionibus diviſa habebat, atrovirentia, venoſa; caulis unico flore purpuraſcente, cæteris minore, ſuperbiebat.

Germanicè, Päonia / ſo die kleinſte iſt / derohalben das Zwerglein genannt.

### IV

BOrrago flore albo. Planta, algoris impatiens, folijs prædita Bugloſſo vulgari brevioribus & latioribus, hiſpiditate aſperis, venoſis, viridibus, in caule ſucculento, ramoſo, hiſpido, diverſo ortu ſitis: flores faſtigiatim locantur, Bugloſſo ampliores, & folijs mucronatis, albis, particulatim ab unâ baſi cohærentibus, placent, quorum umbilicus pyramidali ſpecie acuminatur, coronis fuſca eſt: radicibus nititur oblongis ſingularibus; ſemina Bugloſſum æmulantur.

Germanicè, Weiſe Burretſch / oder Borragen-Blumen.

### V

BOrrago flore cœruleo, quo colore nuſquàm non in acetaria & officinarum uſum venit.

Dodon. 616. fol.
Cœſalpin. lib. 11. cap. 3. fol. 433.
Lobel. 309. Obſ. Adv. 246. fol.
Lugdunenſ. 578. fol.
Epit. Matth. Cam. 914.
Hort. Med. Cam. 29.
Matth. C. Bauh. 825. fol.

Phytopin. Bauh. 493.
Germ. Weiſe Burretſch oder Borragen-Blumē.
Trag. 78. lib. 1.
Fuchſ. 51. cap.
Tabern. 126. lib. ſecundo.
Matth. Germ. Cam. 340. fol.
Durant. 149. fol.




I.
Pœonia rubra flore sim-
plici.

II.
Gratiola flor: albo et Gratia Dei.

III.
Acetosa Vesicaria peregrina.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PÆonia rubra flore ſimplici. Vulgatiſſima eſt omnium Pæoniarum, etiam infimæ plebi cognita. Stolones novelli erumpentes ſaturatè rubent, ſucceſſu temporis in caules ſingulares, cubitum altos, abeuntes, quorum pediculi craſſi foliacea oblonga, ſupernè viridia, inferiùs ſubcæſia ſegmenta quaſi ramoſa ſuſtinent: flos unicus cacumen obſidet, Malvâ Roſeâ amplior, eleganter rubens, octo plerúnque foliorum, quæ decidua tres ſiliquæ excipiunt, condentes ſemina, initiò hilarè rubentia, & per maturitatem nigricantia, Ochri magnitudine: radices craſſæ in oblonga tubera, Aſphodeli more, deſinunt.

Dodon. 193. & 194. fol.
Cœſalpin. lib. 15. cap. 36. fol. 588.
Lobel. Obſ. 390. Adv. 350.
Lugdunenſ. 855. 856. &c. fol.
Epit. Matth. Cam. 656. fol.
Hort. Med. 114. fol.
C. Bauh. Matth. 655. fol.
Phytopin. 646. fol.
Germ: Rothe einfache Päonien-Roſen.
Trag. cap. 200. lib. 1.
Fuchſ. 75. cap.
Tabern. 416. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 313. fol.
Durant. 687. fol.

### II

GRatiola, ſive Gratia Dei, flore albo. Gratiola Centauroides C. Bauh. Radices geniculatæ plurimùm diffunduntur; caules crebri, dodrantem alti, æquali poſitu folia ſuſtinent, Lyſimachiæ galericulatæ non abſimilia, oblonga, ac ambitu crenata, mucronibúſque finientia, è quorum ſinubus pediculi tenues emittunt flores, eandem Lyſimachiam ſpecie affectantes, albidos: capitula rotunda, parva, acuminata, minuto ſemine ſcatent.

Dodon. 358. fol.
Cœſalpin. lib. 6. cap. 65. fol. 265.
Gratia Dei alterius titulo, ex plac. C. Bauh.
Lobel. 238. Obſ. Adv. 185. fol.
Lugdunenſ. 1085. fol.
Epit. Matth. Cam. 464. fol.
Hort. Med. 69. fol.
C. Bauh. Matth. 517. fol.
Phytopin. 547. fol.
Germ: Wild Aurin.
Tabern. 83. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 426.
Durant. 431.

### III

ACetoſa veſicaria peregrina. Acetoſa Americana annua quorundam. Radix annua eſt, caulis dodrantem æquat, plus minúſve altior, variè brachiatus, & quandoq; ſupernè rubeſcens, cui inhærent, longis craſſis ſubvecta pediculis, folia Acetoſæ vulgaris propemodùm æmula, craſſa, mollia, & guſtus acidioris; atque in ſurrectis quaſi ramulis longo ordine floſculi, Acetoſis majores, è pallore herbaceo tantillùm rubentes: ſuccedunt veſicæ tenues, ſeu mavis thecæ foliaceæ angulares, deorſùm dependentes, ſubindè rubentes, obvolventes ſemen unum atque alterum, triangulare, fuſcum, Acetoſarum more.

Germanicè, Fremd Ampffer mit aufgeblaſſenen Schöttlein.

*SEPTIMUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.



I. Onobrÿchis Belgarum.

II. Phalangium ramoſum.

III. Trifolium Paluſtre.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ONobrychis altera Belgarum Lobel. Campanula arvenſis minima Dodon. Radix exigua eſt, inutilis, annua, gracileſcens; caules palmo altiores, circa quos folia multa, Ciceris foliorum magnitudine, leviter crenata: flores in ſummis ramulis exeunt in puniceo purpurei, quinque partitim plicati, qui aperti in latiora quina folia expanduntur, quibus deinde oblongæ angulares ſiliculæ ſuccedunt, in ſummo anguſtis longis quinis foliaceis alis coronatæ, intrinſecus ſemine minuto, copioſo, fuſco, ſplendente, refertæ.

Dodon. 168. fol.
Lobel. Obſ. 228.
Lugdunenſ. 490.
Phytopin. C. Bauh. 407.
Germanicè, Unſer Frauen Spiegel.
Habernæ, ſub Violæ arvenſis, fol. 18. lib. ſecundo:
& Violæ Pentagoniæ titulo, Icon. 316. fol.

### II

PHalangium ramoſum. Radices tenacibus, albeſcentibus, longis fibris, frequenter demiſſis, ſe firmant, promentes folia multa pallida, anguſta, graminea, atque caulem teretem, cubitalem, ramoſum, compluribus floribus, ſex folijs oblongiuſculis candidis conſtantibus, ornatum, quibus ſequuntur capitula rotunda, Aſphodeli modo, ſeminibus nigricantibus inæqualibus gravida.

Dodon. 106. fol.
Lobel. Obſ. 27. fol.
Lugdunenſ. 852. fol.
Epit. Cam. 580. fol.
Hort. Med. 123. fol.
Matth. C. Bauh. 607. fol.
Phytopin. C. Bauh. 58. fol.
German: Weis Widerthon/oder Erd-Spinnen-Kraut/Graß-Lilgen.
Tabern. 685. lib. 1.
Matth. Germ. Cam. 195.

### III

TRifolium paluſtre. Menianthes Theophraſt. Dalechamp. Radix longa variè ſub ceſpitibus ſpargitur, geniculis multis intercepta, & fibris longis lateralibus firmata; egrediuntur inde pediculi craſſi, poroſi, ſubindè ſubrubentes, qui ſuſtinent folia oblonga, lata, viridia, tripartitâ ſerie diſterminata: caulis ſimiliter è latere, aut è medio foliorum exurgit, craſſus, poroſus, pedalis, faſtigiatus quaſi in thyrſum brevem, floribus ſubtùs rubeſcentibus, intùs albis & villoſis elegantibus prægnantem: ſemina in oblongis mucronatis folliculis ſubnaſcuntur.

Dodon. 570. fol.
Lobel. Obſ. 496.
Lugdunenſ. 1020.
Germanicè, Waſſer- auch Biber-Klee.
Tabern. 220. lib. ſecundo.



III. Sparganium. I. Orobanche. II. Cicuta maxima.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ORobanche Limodoron. Orobanche minùs ramoſa. Cauliculus ſingularis, craſſus, carnoſus, fiſtuloſus, foliorum rudimentis obſcurè ſubrubentibus, concoloribus ſeptus, in ſummitate Orchidum aut Lamiorum ſpecie ejusdem coloris albicantes, aut palleſcentes emittit floſculos: radices carnoſarum ſquamarum compactili ſerie fuſcam quaſi turbinatam effigiem referunt.

Vide de Orbanch. Dodon. 543. fol.
Cluſ. 271. fol.
Lobel. Icon. 269. fol.
Lugdunenſ. 485.
Matth. Epit. Cam. 311. fol.
Thal. Hercyn. Saxono Thuring. 80. f.
Matth. C. Bauh. 409. fol.
German: Erven-Würger.
Tabern. 358. lib. ſecundo.
Matth. Camer. Germ. 166.
Durant. 683.

### II

CIcuta maxima quorundam. Caule conſtat viridi, lævi, ſeſquicubitali, inani, odorato, folijs, in multa tenuia, anguſta, & ambitu ſerrata ſegmenta digeſtis, viridibus, veſtito: flores tenues, è virore albeſcentes, umbellam ſpecioſam conſtituunt: radix multis denſatis fibris in limoſis aquis hæret, hortis illata nonnunquàm in turbinatam formam extuberare fertur.

Dodon. pro Sio altero habet, fol. 579.
Ut & Lobel. Obſervat. fol. 105.
Lugdunenſ. 1094.
Phytopin. C. Bauh. 270. fol.
Germanicè, Groß Wütſcherling / oder Waſſer-Werck.

### III

SParganium ramoſum dictum. Platanaria Dodon. Phleos fœmina Lugdunenſ. Folia profert, Cyperi modo longiuſcula, anguſta, & dorſo elatiore, quaſi triangula; caulem cubitalem, rotundum, lævem, juxta foliorum ſinus ramulos obliquatos emittentem, quibus ſine ordine inſident rotundæ quaſi pilulæ, inter quas majores, amplitudinem nucis Avellanæ acquirentes, ſtaminibus tenuibus, albo pallidiuſculis, circumcircà vallantur: radices, craſsè fibratæ, alijs capillamentis, plumarum ſpeciem affectantibus, ſubindè obſidentur.

Dodon. 591. fol.
Lobel. 41. Obſ.
Lugdunenſ. 1017.
Epit. Matth. Cam. 732.
Matth. C. Bauh. 702. fol.
Phytopin. C. Bauh. 38.
Germanicè, Igels-Knoſpen.
Trag. cap. 37. lib. ſecundo:
Tabern. 687. lib. 1.
Camerar. Matth. Germ. 339.
Durant. 966.


III.
Nẏmphæa lutea.
II.
Nẏmphæa alba minor.
I.
Nẏmphæa alba maior.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

NYmphæa alba major. Nenufar, Lotus Ægyptia Proſp. Alpini. Folijs conſtat amplis, glabris, craſſis, tantùm non orbiculatis, vireſcentibus, & ad exortum pediculi ſinuatis, rotundi ſcilicet, & intus porosâ medullâ farcti, longiſſimi, altitudinem paludis ſeu ſtagni natalis excedentis, quali etiam ſinguli florum nituntur, numerosâ foliorum candidorum, acuminatorum congerie ſtamina meditullij ſtipantes: radix craſſitudine brachium ſuperat, ſcabra, nodoſa, longa, clavæ ſimilis (unde etiam planta Clavæ Herculeæ nomine indigitata fuit) intùs fungoſa, foris nigricans, crebris acetabulis, ſeu foliorum veſtigijs inſignita, oblongis fibris ſe in fundo limoſo firmans.

Dodon. 575.
Cœſalpin. lib. 15. cap. 7. fol. 569.
Cluſ. LXXVII.
Lobel. Obſ. 324. Adv. 257. fol.
Lugdunenſ. 1008.
Matth. Epit. Cam. 634.
C. Bauh. Matth. 643. & 647.
Phytopin. 361.
Germanicè, Groſſe weiſe See-Blumen / Haar-Wurtz.
Trag. cap. 48. lib. ſecundo.
Fuchſ. 203. cap.
Tabern. 413. fol. lib. ſecundo.
Camerar. Matth. Germ. 305. fol.
Durant. 659.

### II

NYmphæa alba minor. Nullatenus priori diſſimilis, niſi quòd omnia duntaxat minora habeat. German: Kleine weiſe See-Blumen.

### III

NYmphæa lutea, cujus flos Dioſcoridi Bléphara dicitur. Foliorum paulò oblongiorum florúmque (præter angulos) pediculis Nymphææ majoris albæ æmulatrix eſt: flores nonnihil minores, quinis rotundis, craſſis, luteis folijs ſingulatim capitula herbacei coloris, quodammodò Papaveris in morem turbinata, frequentibus concoloribus ſtaminulis coronant: radices priorum æmulatione foris intúſque canticant.

Autores priores, locis deſignatis conſulendi.

Germanicè, Gelbe See-Blumen / Waſſer-Wohn.


IV. Primula Veris Angustifolia rubra.
V. Primula Veris Angustifolia alb
I Bellis prolifera variegata.
II. Bellis minor flo. multiplici rubra.
III. Bellis minor multiplici flo. alba

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

BEllis prolifera variegata. Lætiori & habitiore vulgarium Bellidum facie prodit, radiculis tenuibus, & denſè fibratis, folijs virentibus, & in rotunditate oblongis, ac leviter circumcrenatis: floſculi numeroſiſſimo denſiſſimorum foliorum contextu orbiculos Chamæmeli multiplicis conſtituunt, ſingulis pediculorum graciliorum ſum̃itatibus impacti, eleganti ſtriarum rubore virgatim & maculatim variegati, laterali ſeptenâ vel octonâ ſobole, à centro caliculorum pediculis tenuibus porrectâ, & circa matrem diſpoſitâ, gravidi. Germanicè, Geſprengt gefüllte Maßlieben / mit vilen neben Blümlein.

### II

BEllis minor flore multiplici rubro. Totâ prædictâ minor eſt, ut & folijs virentibus, obſcurè crenatis: florum globuli rubore perfunduntur, aliàs ſe ab illius cognatione excludi non patitur. German: Gefüllte rothe Maßlieben.

### III

BEllis minor flore multiplici albo. Repræſentatione alterius congenerem ſe omninò, præter unicum floris candorem, prodit.

Vid. Dodon. 264. in textu.
Coeſalpin. lib. 12. cap. 26. fol. 493.
Lobel. Obſ. 253. Adv. 199.
Lugdunenſ. 854.
Epit. Cam. 656.
Hort. Med. Cam. 27. fol.
Matth. C. Bauh. 654. fol.

Phytopin. 506. fol.
Germ: Gefüllte weiſe Maßlieben.
Trag. lib. 1. cap. 52.
Fuchſ. 53. cap.
Tabern. 42. fol. lib. ſecundo.
Matth. Camerar. Germ. 313. fol.
Durant. 135. fol.

### IV

PRimula Veris anguſtifolia, flore rubro. Radicula, multùm & tenuiter fibrata, è capite ſuo quaſi orbiculatim per humum digeſta, promit folia craſſiuſcula, mollia, ſubtùs incana, & tenui farinâ obſita, ſupernè è virore pallentia, & ambitu leviter crenata, Bellidem minorem quadantenus, ſed multò oblongiore & glabrâ læviq; facie affectantia. Attollitur è medio illorum unus atque alter nudus cauliculus, dodrantem rarò ſuperans, qui quaſi faſciculo, ex uno centro umbellatim in orbem ſparſos profert floſculos, Primulæ Veris æmulos, & ab unâ baſi in quinque veluti cordatæ formæ extremis oris ſinuata folia diviſos, diluto rubori purpurâ intermiſtâ ſuffuſos: his deinde ſemina exilia in oblongis vaſculis ſuccedunt.

Cluſ. 300. lib. 30. (pinæ min. titulo. Lobel. Obſerv. 307. Saniculæ al-
Lugdunenſ. 887. Tabern. 38. Phytopin. C. Bauh. 462.
Germ: Klein ſchmal-blätterichte (rothe Schlüſſel-Blümlein.

### V

PRimula Veris anguſtifolia, flore albo: cujus colori unicè diſcrimen imputandum.
Germanicè, Weis ſchmal-blätterichte kleine Schlüſſel-Blümlein.



III.
*Gentianella minima verna flore cœruleo.*

I.
Caltha paluſtris flore multiplici.

II.
*Viola Martia Canin*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CAltha paluſtris flore multiplici luteo. Caules aliquot, nondum cubitales, ac in diverſa tendentes, glabri, læves, geniculati, folijs donantur, longis craſſis pediculis ſubnixis, venoſis, lævibus, pinguibus, virore nitentibus, propè circinatis, Chelidonio minori præter æmulationem multò amplioribus, ac modicè circumroſis: flores adnatorum ramoſorum ſummitates ferunt, auri ſplendore nitentes, & multiplicem numeroſiſſimorum luteſcentium congeriem quinis alijs folijs latioribus concoloribus orbiculatim ambientes, Ranunculum plenum majorem amplitudine & venuſtate ſuperant: radices crebris & craſſis fibris, ex uno capite denſè prodeuntibus, deorſum deſcendunt.

Cluſ. cxiv. fol.
Cam. Hort. Med. 33. fol.
Matth. Caſp. Bauh. 616.
Phytopin. Bauh. 540.
Germ: Gefüllte Dotter-Blumen.
Tabern. 423. lib. ſecundo.

### II

VIola Martia canina. Radicula rugoſa, oblonga, albida, & ſenſim gracileſcens, è capite ſuo mittit folia, vulgari Violæ Martiæ æmula, minora tamen, & magis in longitudinem producta, cui pallidorum quoque florum conformitate congruit, odore licet prorsùs deſtituatur.

Dodon. 156. fol.
Lobel. Iconibus 609.
Lugdunenſ. in textu, 978.
Thal. fol. 130. Hercyn. Saxono-Thuring.
Phytopin. C. Bauh. 274.
Germanicè, Wilde Hunds-Veil.
Trag. lib. 1. cap. 190.
Tabern. 18. fol.

### III

GEntionella minima verna, flore cœruleo. Oblonga fulveſcens radicula, ſurculoſa, & tenuiter fibrata, abit in cauliculos complures, pollice duplo altiores, ſubtùs denſè ſtipatos foliolis, è rotunditate oblongis, Centaurium luteum affectantibus, viridibus, aliquot nervis virgatis, quæ alia minora & rariora, mediam ex intervallis partem veſtientia, geminatim æquali ſitu ſequuntur: floſculi oblongis caliculis emittuntur, vivido colore cœruleum ipſum laceſcentes, è tubulis concavis in folia quina lata, & propè triangula, ambitu minutim crenata, dilatati, & ad umbilicum apophyſibus exilibus mucronatis à ſe invicem diſtincti: ſemina ſubnaſcente acuminato vaſculo latent.

Congruit cum Cluſian. 314. deſcript. & fol. 315. depictâ.
Lobel. Obſerv. 167. fol.
Phytopin. C. Bauh. 346. fol.
German: Klein blau Gentian / ſo im Frühling blühet.
Tabern. 400. fol. lib. ſecundo.


I
Testiculus Vulpinus.
II
Cÿanus Maior.
III.
Chamæpitÿs Austriaca
IIII.
Pentaphillon flor: albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

TEſticulus Vulpinus. Orchis Sphecodes diphylla Lobel. Folia erant Lilij albi ſpecie, pallidè virentia, lata, Orchidis bifoliæ vulgaris folijs ampliora, bina tantùm, & per longitudinem nervata: caulis quoque vegetior, geminabatur, nec flores diſſentiebant, cereo colore palleſcentes: radix ſub appendicibus longiuſculis, craſsè fibratis, napiformia oblonga tubercula, ſeu mavis bulbos, vel binos, vel rariùs unum, ut in noſtrâ illâ, emittere ſolet.
Lobel. Obſ. pag. 93. (Phytopin. Bauh. 120.) Germ: Groſſe Fuchshödlein oder Fliegen-Blumen.

II

CYanus major. Verbaſculum Cyanoides C. Bauh. Radices nigricantes, fibratæ, ſub terrâ divagantes, germinant caulibus pluribus, dodrante altioribus, folijs oblongis, Jaceæ ſeu Lychnidis, incano tomento nonnihil obſitis, arctè ſeptis; capitula ſummitatum turbinatam propè effigiem referunt, ſquamatim conſerta, flores vulgari Cyano ampliores, floccoſos, è cœruleo in purpureum colorem inclinantes, ac umbilicum brevem ſtamineum purpuraſcentem ambientes, expandentia.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 251. & 250. | Cam. Epit. Matth. 288. | Germ: Groß blau Wald-Korn-Blumen. |
| Lobel. Obſerv. pag. 296. | Matth. C. Bauh. 389. fol. | Trag. lib. 1. cap. 72. |
| Lugdunenſ. 437. fol. | Phytopin. C. Bauh. 535. fol. | Tabern. 536. |

III

CHamæpitys Auſtriaca, Cluſij. Radix, nigricantibus duriuſculis fibris multùm capillata, plurimos largitur cauliculos, quadrangulos, lignoſos, pedales, crebrò geniculatos, brachiatos, quibus inferiùs Ajugæ vulgaris modo folia, ex unâ baſi in lacinas aliquot tenues dirempta, inſident; his alia ſingularia, anguſta, mucronata, & in virore ſplendentia, ac Roſmarinum quadantenus æmulantia, ſuccedunt: folijs intermiſcentur rigidi, parvi caliculi, vertices ſupremos ramulorum cingentes, quibus effunduntur flores vulg: Ajugæ, præter magnitudinem Antirr: rub. floribus ſimiles, coloris ſaturatè purpurei, vel rubri dilutioris quandoque, &, ut Cluſ. habet, inferiore propendente labro, nonnihil candicante, ac ſanguineis guttis reſperſo: ſemina nigra, parva, ſplendentia, anguloſa, Hyſſopo majora ſunt.
Cluſ. CLXXXV. fol. (Phytopin. C. Bauh. 477.) Germ: Oeſterreichiſch Erdkiffer/ oder Schlag-Kräutlein/ oder Je länger je lieber.

IV

PEntaphyllum majus flore albo. Radix, ſuperiùs nonnihil ſquamoſa, è fuſco nigricans, diffunditur in caules dodrantales, ſeu potius oblongos tenues pediculos, exerentes folia Pentaphylli ſubviridia, & adversâ parte incana, in quinque cohærentias, oris extremis ſerratas, diviſa: flores ſimilibus pediculis obſequioſis ſuſtinentur, candidi, quinis folijs ſubrotundis, ac latiore ambitu ſinuatis, nitentes.

| | | |
|---|---|---|
| Cluſ. CV. | Phytopin. 650. | Tabern. 436. lib. primo. |
| Epit. Cam. 671. | Germ: Fünffinger-Kraut mit weiſen Blumen. | Matth. Cam. Germ. 353. fol. |
| Matth. C. Bauh. 711. & 722. | Fuchſ. cap. 238. | Durant. 823. |


IV.
Cyanus flore purpureo arvenſis.
V.
Cyanus arvenſis flore rubro.
VII.
Cyanus arvenſis flore albo fundo purpureo.
VI.
Cyanus arvenſis flore variegato.
I.
Cyanus aruensis flore cœruleo.
II.
Cyanus arvenſis flore incarnato.
III.
Cyanus arvenſis flore albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

CYanus arvenſis flore cœruleo. Baptiſecula Tragi. Papaver Heracleum Dioſcorid. & Theoph. Fabij Columnæ. Radix lignoſa, annua, oblonga, gracilis, lateralibus tenuibus fibris conſpicua eſt; caulis cubitum æquat, pariter lignoſus, anguloſus, & tenui araneosâ lanugine obſitus, brachiatus, ſeptus folijs plurimis oblongis, quorum inferiora aliquot ſegmentis utrinq; Scabioſarum vice laciniantur, ſuperiora integra & anguſtiora ſunt: capitula in ramulorum ſum̃itatibus cernenda, ſquamulis compacta, atq; è rotunditate faſtigiata, emittentia flores, ſenis, octonis, aut pluribus folijs concavis, & marginum oris inciſis, cœruleis, umbilicum concolorem, ex incurvatis tenuibus ſtaminulis conflatum, circumdantes: ſemina, ſuperiùs rigidis brevibus barbulis obſeſſa, albicantia, pilis obducta, in capitulis ſervantur.

Dodon. 250.
Cœſalp. lib. 13. c. 52. fol. 539.
Lobel. Obſ. 295. Adv. 236.
Lugdunenſ. 437. fol.
Cam. Epit. Matth. 289.
Hort. Med. 51.
Matth. C. Bauh. 389. & 391. in textu.
Phytopin. 534. fol.
Germ: Blaue Korn-Blumen.
Trag. 193. cap. lib. 1.
Fuchſ. 162. cap.
Tabern. 532. 533. 534. fol. lib. 1.
Cam. Matth. Germ. 153.
Durant. 305.

I I.

CYanus arvenſis flore incarnato. Abſque florum colore prorſus cum priori convenit.
Germanicè, Fleiſch-farb Korn-Blumen.

I I I.

CYanus arvenſis flore albo. Et hujus differentia tantùm floris colore conſtat.
Germanicè, Weis Acker-Korn-Blumen.

I V.

CYanus flore purpereo arvenſis. Germ: Purpurfarb Acker-Korn-Blumen.

V.

CYanus flore rubro arvenſis. Germanicè, Roth Acker-Korn-Blumen.

V I.

CYanus arvenſis flore variegato, ſeu fl. albo, apice è cœruleo rubeſcente.
Germanicè, Weiſe Korn-Blumen/mit rothen und blauen vermiſchten Putzen.

V I I.

CYanus arvenſis flore albo, fundo purpureo.
Germanicè, Weiſe Acker-Korn-Blumen/ mit Purpur-braunen Putzen.
Singulorum tantùm coloribus diſcrimina imputanda.



I. Fraga fructu magno.

II. Fraga fructu albo.

III. Fraga fructu rubro.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

FRaga fructu magno. Radix, numeroſis tenuibus fibris firmata, & gracilem viticularum ſobolem huc & illuc diffundens, folia profert, longis ſubhirſutis pediculis innixa, ſingulatim terna, ambitu ſerrata, & obliquis nervis lirata, nonnihil villoſa: inter hæc obſequioſi aſſurgunt cauliculi, floſculos aliquot, ſimul in pediculis junctos, in ſummo emittentes, quinis rotundis albis folijs, Pentaphylli ſylvatici ſeu Rubi æmulos: defluentibus his ſubnaſcuntur fructus aliquot pulpoſi, maturitate rubentes, cum pleriſque prunis magnitudine certantes, odore, guſtu & ſapore gratiſſimi.

Germanicè, Groſſe rothe Erd-Beer.

### II

FRaga fructu albo. Tantopere ſuperioribus affinia ſunt facie, ut tantùm foliorum viridium & fructuum albeſcentium parvitate unicè illis ſeponenda.

Germanicè, Weiſe Erd-Beer.

### III

FRaga fructu rubro. Strigoſiore tantùm, haud ſecus ac priora, variant habitu, & vulgatiori notitiâ; fructus, aſpectu & rubore eleganti oculorum ſpectaculum, ſapore delicatiorum palatorum blandimentum, mirificis viribus uſum medicinalem provocant.

Vid. Dodon. 561.
Lobel. Obſ. 396. Adv. 309.
Lugdunenſ. 614. fol.
Epit. Cam. 765.
Hort. Med. 61.
Matth. C. Bauh. 721.
Phytopin. Bauh. 653.

Germanicè, Rothe Erd-Beer.

Trag. cap. 170. lib. 1.
Fuchſ. 329. cap.
Tabern. 429. lib. 1.
Matth. Germ. Cam. 355.
Durant. 394.

*OCTAVUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.



IIII

Chamæiris latifolia biflora.



III.

Chamæiris latifolia minima.



I

Chamæiris latifolia

VIIII Cluſii.



II.

Chamæiris latifolia

X. Clusij.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CHamæiris latifolia purpureoflaveſcens. Craſſis ſuis radicum propaginibus obliquè ſerpebat, folia gerens in uno ceſpite plurima, dilutè viridia, Iridibus prædictis breviora; caulis è medio exibat dodrantalis, attollens flores ſingulares, folijs contra ſe curvatis, ſurrectis, è flavedine palleſcentibus, reflexis verò, ſaturatè purpureo colore ad nigredinem vergentibus, inſignes.

Germanicè, Breit-blätterichte kleine Schwertel/auß purpur-farben/ und bleich-gelben Blumen.

### II

CHamæiris latifolia altera purpurea. Radix nodoſa variè protuberabat, foliáque ſibi invicem implexa ex uno capite emittebat, pauciora quàm in priori & ſuperiùs pauló diſcreta, mucronata: caulis tantùm non pedalis erat, è faſtigio vaginarum unum atque alterum florem promens, violæ nigræ penè colorem dilutum æmulantem, caducum & inodorum.

Germanicè, Breit-blätterichte kleine Schwertel / mit purpur-farben oder vil-farben Blumen.

### III

CHamæiris latifolia minima. Radix pariter nodoſa eſt, & folia inferiùs ſe invicem amplectentia, flores minores in caule palleſcunt, quartæ Chamæiridi Cluſianæ æmuli.

Germanicè, Der kleinſte breit-blätterichte Schwertel / mit bleichen Blumen.

### IV

CHamæiris latifolia biflora. Radicibus craſſis, transverſis, aliorum modo ſe propagat, folia cæteris latiora habet, flores quoque majores, ſaturatè purpureos, ad nigro violaceum colorem accedentes. Bis floret ſingulis annis.

Germanicè, Kleine Schwertel-Wurtz / mit ſatten Viol-braunen Blumen.



III.

Chamæiris flore candido



II.

Chamæiris cœruleo & vio-
laceo colore



IV

Chamæiris flavo & purpu-
rascente flore



I.

Chamæiris flore argenteo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CHamæiris latifolia flore argenteo. Radix craſſa erat, transverſa, & multis tuberculis obſita, folia cognatis Chamæiridibus ſimilia, brevia, mucronata, conferta, caulis dodrantem excedebat: flores exalbido aut potius argenteo colore placebant.

Germanicè, Breit-blätterichter kleiner Schwertel / mit Silber-farben Blumen.

### II

CHamæiris latifolia cœruleis & violaceis florum folijs. Foliorum & radicum ſpecie à prædictâ non multum aliena eſt, flores in caule dodrante altiore, elevatâ parte violacei coloris, repandâ verò cœrulei blandimento conſtabant.

Germanicè, Breit-blätterichter kleiner Schwertel / mit braunen und blauen Blätteren.

### III

CHamæiris latifolia flore candido. Radicum craſſis & divaricatis tranſverſis propaginibus multiplicabatur, & ejuſdem formæ flores edebat, ſed omninò candicantes.

Germanicè, Kleiner breit-blätterichter Schwertel / mit gantz weiſen Blumen.

### IV

CHamæiris latifolia purpureo flaveſcens multiflora. Vegetioribus paulò floribus erat, quàm Chamæiris prima noſtra, & longè pluribus: foliorum quoque ceſpites denſiores & ſe magis propaginibus transverſis diffundentes.

Germanicè, Kleiner breit-blätterichter purpur- und bleich-gelb-farber Schwertel.

MIræ & mirificæ propè omnium in floribus varietates exactiſſimè à clariſſ: & ſagaciſſ: Cluſio Plantar. hiſt. lib. 2. cap. 47. fol. 224. 225. 226. 227. exprimuntur, poſt quem illis denuò examinatis actum agere non operæ precium eſſe duxi; atque hinc ad ejus trutinam benevolentem lectorem remiſſum volui.



I.
Iris pratensis maior.

III.
Viola matronalis flo. purpur.

II.
Viola matronalis flo. alb

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

IRis pratenſis major. Radices transverſim ſerpentes, nigreſcentes, denſum ceſpitem conſtituunt, è quo numeroſas fibras ſubtùs demittunt, capitibus ſuis edunt folia rigida, viridia, dura, longa, anguſta, acuta, atque inter illa caulem cubito altiorem, teretem, in ſummo ſucceſſivè unum atque alterum aut plures flores ferentem, Iridibus quidem cæteris ſtrigoſiorem, ſed non minùs elegantem, hilaris cœrulei coloris, cui venulæ verſicolores quædam, in repandis folijs intermixtæ, varietatem inducunt. Multùm accedit ad Iridem anguſtifoliam Cluſ. 11. fol. 229.

Germanicè, Himmel-blau Wieſen-Schwertel.

### II

VIola Matronalis flore albo. Radices vivaces, denſæ, craſſæ, multúmque fibratæ, folia ſubmittunt viridia, atque ab anguſtâ baſi è latitudine in mucronem ducta, ſubhirſuta, circumſerrata, plurima, inordinata, & graciliore ſerie caules virides ſesquicubitales ambientia: flores paſſim in ſummis ramulorum brachijs longo conferto ordine emergunt, quatuor folijs ſubrotundis albeſcentibus prædıti, odorem cinnamomi (veſperi maximè) referentes: ſequuntur anguſtæ corniculatæ ſiliquæ, oblongum atque è rufo nigricans ſemen condentes, Alliariæ ritu.

Germanicè, Winter-Violen mit weiſen Blumen.

### III

VIola Matronalis flore purpureo. Florum colore purpuraſcente tantùm variat, & ſubinde ad rubedinem tendit, cæteroquin prædictæ germana eſt.

Dodon. 161.
Lobel. Obſ. 175. Adv. 137.
Cluſ. qui tantùm ejus meminit fol. 297.
Lugdunenſ. 804.
Phytopin. C. Bauh. 379. fol.

Germanicè, Winter-Violen mit braunen Blumen.

Trag. lib. 1. cap. 194.
Fuchſ. 174. cap.
Tabern. 26. lib. ſecundo.



III. Iris Florentina.

I. Iris Calcedonica latifolia.

III. Iris Illyrica.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

IRis Chalcedonica latifolia. Iris Chalcedonica maxima variata Lobel. Suſiana 1. Cluſij. Delitias noſtras Botanicas etiam Cæſareorum Legatorum, è Turciâ redeuntium, munificentia per hanc elegantiſſimam & plus quàm amœnam plantam auctas voluit. Radicem nodoſam, gibboſam, propaginum ſobole & geniculatis proceſſibus diſtinctam, ac craſſis fibris ſubtùs firmatam obtinet, cujus caput excreſcit in folia ſurrecta, vulgatiori Iride breviora, anguſtiora, inferiùs ſe mutuò complectentia, ſuperiùs magis diſperſa, acuminata, vireſcentia: caulis, inter illa emiſſus, cubitalis eſt, vaginatim uſque ad floris initium involutus, qui novenis folijs congeneribus Iridibus reſpondet; ſed repanda, & his incumbentia, magis nigricantis coloris venulis, & maculis ſubinde purpuraſcentibus & candicantibus intermiſtis, ſuperiora ſurrecta minùs, virgatim tamen ac undulatim quaſi mirum in modum variata ſunt, ut, etiam abſque ullo odore, primam laudem & varietatis & raritatis, præter florum luculentam amplitudinem, cognatæ familiæ meritò ſuſtulerit.

Vid. Lobel. Obſ. 34.
Cluſ. lib. 2. fol. 21.
Lugdunenſ. 1616.

Germanicè, Veil-Wurtz von Conſtantinopel/ mit ſchwartz-geſcheckten Blumen.
Tabern. 334.

### II

IRis Florentina latifolia major, colore candidiſſimo. Ut prior venuſtatis, ſic illa odoris gratiâ, & niveo, ſeu mavis, lacteo colore commendabilis eſt. Radicè æquè gibboſâ conſtat, albeſcente, folijs latioribus, pallidè vireſcentibus: flores, è vaginulis albidis membranaceis emergentes, terni, aut rariùs quatuor, in uno caule plusquàm cubitali ſingulatim porriguntur.

Germanicè, Weiſe wol-riechende Veil-Wurtz.

### III

IRis latifolia major Illyrica. Craſſiore aliquantùm priori radice eſt, ſed pariter nodoſâ, & craſsè ſubtùs fibratâ: folia quoque latiora & longiora ſunt, pallido virore prædita, & gladij ſpecie mucronata: flores diluto cœruleo colore ad cyaneum palleſcentem accedunt, ac odorem remiſſiorem effundunt: ſemina anguloſa, rugoſa, caput triangulare ſubmittit.

Hort. Med. 79.
Germanicè, Himmel-blaue wol-riechende Veil-Wurtz.



III Iris latifolia maior variegata.

I Iris latifolia violaceo colore maior.

II Iris latifolia vulgaris cærulea.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

IRis latifolia, violaceo colore, major. Radix nodoſa erat, craſſa & fibrata, folijs longis latis ac mucronatis ad Dalmaticam accedebat: flores ampli, è membranaceis teneris albeſcentibus vaginis, ſe explicabant in folia aliarum Iridium ſpecie novena, quorum repanda, præter fimbriam, ad colorem ſaturatè violaceum tendebant, ſursùm elevata hilariore purpurâ nitebant, & propè Iridem major: latifol. v. ſive Aſiaticam purpur. Cluſ. referebant.

Vid. Cluſ. 219.

Germanicè, Groſſer blätterichter brauner Schwertel / oder Veil-Wurtz.

### II

IRis latifolia vulgaris cœrulea. Folijs & radicum craſſitudine non multùm recedebat à prædictâ; florum magnitudine inferior erat; color in elevatis ſeu ſurrectis folijs dilutè cœruleus, & propè cyaneus, ſeu aqueus erat; in repandis verò ſaturatiore ad violaceum vergebat.

De hac, uti etiam alijs Iridibus pleríſque,

Vid. Dodon. 231.
Cœſalpin. lib. 10. cap. 36. fol. 421.
Cluſ. 218. &c.
Lugdunenſ. 1610.
Cam. Epit. Matth. 1.
Hort. Med. 79. fol.
Matth. C. Bauh. 17. fol.
Phytopin. Bauh. 61.

Germanicè, Breit-blätterichter Himmel-blauer Schwertel.

Trag. 51. cap. lib. ſecundo.
Fuchſ. 119. cap.
Tabern. 331. 332. &c.
Matth. Cam. Germ. 1. fol.
Durant. 474. fol.


I.
Calceolus Mariæ.
III.
Iris Pannonica variegata.
II.
Iris Portugalica.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CAlceolus Mariæ. Helleborine recentiorum I. Cluſij. Helleborine ferruginea Dalechampij. Radices nigricantes, plurimùm fibratæ, longè ac latè tranſverſis proceſſibus ſub tellure diffunduntur, emittentes caules aliquot ſingulares, ſesqui dodrantales, alternatim arctè ſeptos folijs Plantaginis mediæ, ſeu Hellebori albi, per longitudinem nervatis; verticetenus longi nutantes pediculi, ſinu folij ſuperioris ſuſtinent florem unum ac alterum, quaternis oblongis mucronatis folijs, dilutè rubentibus (aut in quibuſdam obſcurâ purpurâ nigricantibus) conſtantem, qui è centro ſui oblongum ovalem concavum utriculum, exteriùs flaveſcentem, interiùs purpuraſcentibus venulis & punctis quaſi ſtriatum, affixum habet, ſupernè calceoli ritu patentem, atque verſus pediculum duplici anſulâ nonnihil obtectum: prout fuſius & elegantius à Clariſſ: & Rariſſ: Cluſio deſcribitur.

Dodon. 180.
Cluſ. 272. lib. ſecundo.
Lobel. Obſ. 162. Adv. 127.

Lugdunenſ. 1146.
C. Bauh. Phytopin. 343. fol.
Germanicè, Unſer L. Frauen Schuch.

### II

IRis Portugalica. Radix ſuperioribus Iridibus minor eſt, æquè tamen nodoſa, è lateribus ſobolem emittens, atque è capite caulem, ſenſim è medijs foliorum quaternorum, anguſtorum, pallidè virentium, ſinubus procedentem in florem unum atque alterum candicantem, ac ſecundum labra obſoletè purpuraſcentibus venulis eleganter undique diſtinctum, Irid. majoris latifol. Cluſ. XXVI. propemodum in morem.

Vid. Cluſ. 221. fol.

German: Weiſe Portugaliſche / mit braunen Streifflen geſprengte Schwertel-Lilien.

### III

IRis Pannonica variegata. Radices, aliorum Iridum modò, craſſæ, nodoſæ, albeſcentes, caulem cubitalem erigunt, è folijs paulò latioribus quaternis emerſum, ac in aliquot alas dilatatum, qui vaginatim expandit flores, priori formâ non diſſimiles, ſed tamen diverſi coloris: repanda enim folia latioribus partibus ſaturatâ purpurâ tinguntur; ubi verò anguſtiora fiunt, obſoletè flaveſcunt, variiſque purpuraſcentibus lineis, circa ſtamineas fimbrias obliquè ſparſis, inſigniuntur: ſurſum verò erecta illa, & mutuò contra ſe poſita, obſoletum cupri ſeu æris colorem imitari videntur. De Iridum floribus, mirè colorem variantibus, videndus

Cluſ. fol. 220. 221. 222. &c.

German: Veil-braun geſprengte Schwertel-Lilien.



II. *Iris lutea variegata Lobelij.* I. Iris latifolia decima Clusii. III. *Pseudo Iris palustris*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

IRis latifolia decima. Radix tranſverſis craſſis proceſſibus ſubinde protuberabat, folia ſurrecta erant, quaterna, & per longitudinem lirata, pallidè virentia, inter quæ caulis cubitalis, ſuperiùs vaginulis ſuis effundens flores, cæteris Iridibus non abſimiles, niſi terna inclinata folia obſoletâ flavedine inficerentur: terna ſurrecta triſtem colorem, è flavedine & purpurâ mixtum, obtinebant: reliquis notis non ſecus ac odore Sambuci decimam Cluſij referebat.

Vid. Cluſ. 220. fol.

Germ: Dunckel-braune geſcheckte Veil-Wurtz / ſo rüchet wie Holder-Blühe.

### II

IRis lutea variegata Lobel. Folijs non multùm à prædictâ diſcrepabat, radice paulò graciliore erat, florum folijs anſatis ſeu reflexis, obſoletè violaceis, ac eleganter ſtriatis, ſurrectis verò flaveſcentibus conſtabat.

Vid. Lobel. Obſerv. fol. 34.

Germanicè, Beſprengte gelbe Veil-Wurtz.

### III

PSeudoiris paluſtris. Acorus noſtras paluſtris Lobelij. Radix duriuſcula, obliquis, geniculatis, ac undique cirroſis proceſſibus in multas propagines abit, ac Biſtortæ modo intùs ſubrubeſcit, folia ſurrigit Iridibus longiora, viridia, dorſi utrinque per longitudinem eminentis: flores fert in caule ſeſquicubitali, lævi, particulatim è vaginis herbaceis juxta ſinus foliorum gracilium erumpentes, ſpecie Iridum ſtrigoſiore, luteo pallido colore blandientes: his ſuccedunt craſſa ſemina, in angularibus ſiliquis condita.

Dodon. 248. fol.
Coeſalpin. lib. 10. cap. 39. fol. 422.
Lobel. 31. Obſ. Adv. 29.
Lugdunenſ. 1619.
Matth. Epit. Cam. 6.
Matth. C. Bauh. fol. 21. & fol. 24. in textu Bauh.
Phytopin. 59.

Germanicè, Gelb Waſſer-Schwertel / oder Drachen-Wurtz.

Trag. 49. lib. ſecundo. Fuchſ. cap. 4.
Tabern. 330. lib. ſecundo. Cam. Matth. Germ. 3. fol.
Durant. 17. fol.



III Cruciata. I Spatula fœtida. II Caucalis Dodonei.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

SPatula fœtida Xyris. Iris ſylveſtris Galeni. Radix Iridum modo tranſverſa, ſolida, geniculata, folia erigit dura, ſtriata, atroviridia, longa, acuminata, &, quando conteruntur, odoris ingrati; atque inter illa caulem cubitalem teretem, cujus ſummo inſident flores, Iridis floribus graciliores, ut plurimùm triſti purpurâ conſpicui, niſi quòd media anguſtiora folia, quæ in ſummo bifida ſunt, obſoletè palleſcant, ac intima reflexa ſaturatiora quadantenus ſint, & in medio venulis luteo phœniceis notentur: ſubnaſcuntur ſiliquæ triangulares, ſemine rubente rotundo prægnantes.

Dodon. 247.
Cœſalpin. lib. 10. c. 38. fol. 422.
Lobel. Obſ. 37 Adv. 32.
Lugdunenſ. 1621.

Epit. Matth. Cam. 733. fol.
Hort. Medic. 183.
Matth. Caſp. Bauh. 702.
Phytopin. C. Bauh. 66.

Germ: Wand-Läuß-Kraut.
Tabern. 336. fol. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 339. fol.
Durant. 1076.

### II

CAucalis vulgaris. Foliorum varijs multifidis diſſectionibus Carottam ſylveſtrem æmulatur, caulis infra cubitalem altitudinem, in cacuminibus ſuis floſculis albis umbellatim decoratur, quorum exteriora, majora & latiora, minora circumambiunt: ſemen aſperſum, oblongum eſt: radix inutilis, annua, graciléſcens.

Dodon. 687. (Adv.
Lobel. Obſ. 420. 324. & 325.
Lugdunenſ. 715.

Phytopin. C. Bauh. 266.
Germ: Acker-Kletten/Kletten-Korffel.

Trag. lib. ſecundo, cap. 104.
Tabern. 306. lib. 1.

### III

CRuciata, ſive Gentiana minor. Radix albida eſt, oblonga, ſuperiùs fiſſuris cruciatim ductis perfoſſa, cui caules aliquot innituntur, inferiore parte ſui terram leniter radentes, ſurrecti, pedales, teretes, geniculis intercepti; circa quos folia ſingulatim bina, unitâ ſede affiguntur, frequenti ordine per longitudinem tribus nervis lirata, & ſubinde reflexa, Saponariæ facie, in mucronem abeuntia: flores plures in ſummis caulibus orbiculatim congeruntur, è tubulis ſuis oblongis in quatuor folia angularia, exigua cœrulea explicati, quibus marcidis, calicum deindè anguſta, oblonga conceptacula, ſemina copioſa intra ſe condunt, ſubrufa & nitentia.

Dodon. ſub. 1. Gentian. titulo 341.
Cœſalp. Vincetoxici nomine, l. 6. c. 79. f. 273.
Lobel. Obſ. 166. Adv. 130.
Lugdunenſ. 1259. fol.
Epit. Matth. Cam. 417.
Hort. Med. 65. fol.
Matth. C. Bauh. 481. & 482.

Phytop. C. Bauh. Gentianæ Cruciatæ nomine fol. 344.
Germ. Peters-oder Creutz-Wurtz/Modelgeer/ (Speeren-Stich.
Trag. lib. 1. cap. 84.
Fuchſ. cap. 159. Tabern. 399. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 216. fol.
Durant. 414.



III. Chamædrys. I. Acorus cum ſuo iulo. II. Scordium

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ACorus legitimus cum ſuo julo. Crebris, geniculatis, inæqualibus transverſis, albicantibus odoratarum radicum proceſſibus, latè in obliquas laterum propagines actis, ac infimâ ſede fibratis, telluris ſuperficiem pervagatur, foliáque erigit Iridis paluſtris foliorum modo, prominente coſtâ diſtincta, ſed longiora anguſtiora, dilutè magis virentia, ac trita ſuavem aromatum odorem emittentia: flores muſcoſi, palleſcentes, à latere folij cujuſdam, pari cum alijs latitudine, & triangularem quaſi ſpeciem affectantis, paulò ſupra mediam partem exeunt, in julo ſeu amento nucamentis Juglandium, noviter dependentium, non abſimili, quod virgulis obliquis & transverſis liratum conſpicitur, ac in digitalem quandoque craſſitudnem & longitudinem excreſcere ſolet.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 249. fol. | Epit. Matth. Cam. 5. fol. | Germ: Kalmus mit der Blůhe. |
| Cluſ. 231. fol. | Hort. Med. Cam. 5. fol. | Tabern. 327. fol. |
| Lobel. Obſ. 30. Adv. 29. | Matth. Caſp. Bauh. 23. | Matth. Cam. Germ. 3. fol. |
| Lugdunenſ. 1618. | Phytopin. 59. fol. | Durant. 16. |

### II

SCordium Trixago ſeu Triſſago paluſtris. Folia Chamædryn referunt, ſubhirſuta tamen, oblonga, & in caulibus multipliciter ſe ſpargentibus, imbecillibus, quadrangulis, pubeſcentibus, hærentia, Lupulini odoris: ſuperiores foliorum ſinus floſculi rubentes occupant, eandem Chamædryn æmulantes: radix reſtibilis, fibris capillaribus ſubtùs ſe firmat, graminis modo germinibus obliquis uligines perreptans.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 126. fol. | Hort. Med. 156. | Trag. lib. ſecundo, cap. 123. |
| Cœſalp. lib. 11. cap. 42. | Matth. C. Bauh. 613. | Fuchſ. 299. cap. |
| Lobel. Obſ. 261. Adv. 210. | Phytop. 472. fol. | Tabern. 437. lib. ſecundo. |
| Lugdunenſ. 910. | German: Lachen-Knoblauch | Matth. Cam. Germ. 283. |
| Epit. Matth. Cam. 488. | oder Waßer-Bathengel. | Durant. 909. |

### III

CHamædrys minor. Radiculis vagatur variè ſerpentibus, tenuibus, lignoſis, & mirè inter ſe implicatis, fibratis; cauliculis multis languidis, dodrantalibus, duriuſculis, in quibus folia viridia, inciſuris marginum Quernis ſimilia: flores in ſummis virgis inter folia exeunt, rubicundi, Scordij æmuli, quaſi in ſpicâ digeſti, utriculis ſingulatim erumpentes, in quibus poſtmodò ſemina fuſca, rotunda, exigua latent.

| | |
|---|---|
| Dodon. 43. fol. | Phytopin. 473. |
| Cluſ. 351. (in textu. | Germ: Camanderlein/auch klein Bath-Engel. |
| Lobel. Icon. 491. Obſ. 260. Adv. 209. | Trag. cap. 67. lib. 1. |
| Epit. Matth. Cam. 567. | Fuchſ. cap. 333. |
| Hort. Med. 39. | Tabern. 94. |

# *NONUS ORDO*

# COLLECTARUM PLANTARUM VERNALIUM.




I. Mandragora fœmina.

II. Chelidonium minu

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

MAndragora fœmina Pythagoricâ alluſione, qui, quòd hominis truncum artúſque utcunque repræſentaret, radicibus quandóque duo crura & clunes referentibus, Anthropomorphon dixit; nomen ſuum traxiſſe videtur à Germanicâ denominatione, Man & fragen / quaſi hominis effigiem gereret. Cætera anilia circulatorum commenta, ſculpendo inde formam hominis ad ſuas ſuperſtitiones efformantia, potius ridenda, quàm rimanda & admiranda cenſeo. Radices promiſſæ, craſſæ, capillaribus fibris hirſutæ, foris fuſcæ, intus albæ, trifidis vel bifidis proceſſibus demiſſis, crurum modo inter ſe convolutis, diſterminantur: folia prope terram gerunt, quaſi orbiculatim digeſta, longa, venoſa, rugoſa, criſpa, Hippolapathi ferè formâ, virore nigricantia, ac in acutum coacta: flores inter hæc plurimi ſingulatim longis pediculis efferuntur, è quinis ſub cœruleo purpuraſcentibus ac aliquantùm albidis folijs, & tenuibus aliquot ſtaminulis, in medio conflati, quibus ſuccedunt mala ſubrotunda, per maturitatem luteo palleſcentia, odore ſua veolenti ſaporem inducentia.

De Mandrag. vid. Dodon. 454. fol.
Cœſalp. lib. 5. cap. 24. f. 215. & 216.
Cluſ. LXXXVII. f. à quo noſtra deſcripta videtur.
Lobel. Obſ. 138. Adv. 160.
Lugdunenſ. 1726.
Cam. Epit. Matth. 818. fol.
Hort. Med. 95. fol.
Matth. C. Bauh. 759. fol.
C. Bauh. Phytopin. 303. fol.
German: Alraun das Weiblein.
Cam. Matth. Germ. 379. fol.
Durant. 573. fol.

II

CHelidonium minus. Teſticulus Sacerdotis Sylvatici Favagello Cœſalpini. Ejuſdem radiculæ caput calloſum, in oblongas plurimas, tritici magnitudine, ſtrumoſas, carnoſas appendices coacervatas definit: caulis, palmum altior, longis pediculis ſubvehit folia hederacea, virore ſplendentia, lævia, rotunda, Aſari modo, obtuſa, & ſubindè obſoletè purpurante maculâ in medio notata: flores radiati, luteo foliorum nitore ſtaminula tenuia, concoloria, obſident.

Dodon. 49. fol.
Cœſalp. lib. 14. cap. 7. fol. 546.
Lobel. Obſ. 323. Adv. 256.
Lugdunenſ. 1048.
Epit. Cam. Matth. 403. fol.
Matth. C. Bauh. 468. & 469.
Phytopin. C. Bauh. 610.
German: Feigwartz / Blatter-Kraut / Mayen-Kraut.
Trag. 35. lib. 1.
Fuchſ. 333. cap.
Tabern. 427. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 208. fol.
Durant. 236. fol.



II.
Salvia agreſtis flo. purpureo.

I.
Biſtorta Maior.

III.
Salvia agreſtis flo. al

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

BIſtorta major, Colubrina minor Tragi. Ab eadem radice, ſpiris intortâ & rubeſcente, ac fibris inferiùs firmatâ, prodeunt folia longa, Lapathi inſtar, lata, acuminata, venoſa, ſurrecta, pronâ parte plumbei, ſupinâ vireſcentis coloris: caules aliquot ſimplices inter illa attolluntur, rarioribus & graciliſcentibus folijs arctè cincti, tandem in ſpicas faſtigiati, floſculis minutis Perſicariæ coacervatas, quibus ſuccedunt ſemina triangula, nigricantia, Acetoſæ ritu.

Dodon. 331. fol.
Cœſalp. lib. 4. cap. 33. fol. 167.
Lobel. Obſ. 156. Adv. 121.
Lugdunenſ. 1285.
Cluſ. LXXVIII. lib. quarto.
Epit. Matth. Cam. 683.
Matth. C. Bauh. 674.
Phytopin. C. Bauh. 357. fol.
German: Natter-Wurtz.
Trag. lib. 1. cap. 105.
Fuchſ. 298. cap.
Tabern. 143. lib. ſecundo.
Matth. Cam. Germ. 322. fol.
Durant. 144.

### II

SAlvia agreſtis flore purpureo. Horminum ſylveſtre Lobel. Virgæ cubitales, quadrangulares, ſubhirſutæ, folijs ordinatim veſtiuntur ſcabris, obſcurè virentibus, ab inferiore latitudine ſenſim in mucronem finientibus, & per ambitum ſerratis, aut ſubindè rariter laciniatis: flores ſupernè, verticillato ſitu, in oblongam & deorsùm nutantem ſpicam congeruntur, falcatis galeis ſaturatè purpureis placentes: ſemina rotunda, nigra, in caliculis florum ſubnaſcuntur: radix plurimùm fibrata, vivax, nigricat.

Dodon. Orvalæ ſylveſt. 4. titulo 291.
Lobel. Obſ. 300. Adv. 240.
Lugdunenſ. 964.
Cluſ. xxix. lib. 4.
Epit. Matth. Cam. 629. fol.
Bauh. Phytopin. 453. fol.
German: Wilde Salvey / oder wilder Scharlach mit ſattbraunen Blumen.
Trag. lib. 1. cap. 16.
Fuchſ. cap. 215.
Tabern. 91. lib. ſecundo.
Matth. Cam. Germ. 304.
Durant. 457.

### III

SAlvia agreſtis flore albo. Florum colore, qui candore juvat, tantùm differt: caulibus & foliorum, dilutè virentium, laciniatis ſinubus parùm à prædicto abeſt.

Germanicè, Wilde Salvey / oder Scharlach mit weiſen Blumen.



II.
*Primula Veris Anglicana flo: pleno.*

I.
Hippoglossum.

III
*Sanicula montana alte*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

HIppogloſſum ſeu Hypogloſſum. Bislingua, Bonifacia, Radix Idæa Dioſcoridis. Fab. Columnæ, Ruſco affinis prima Coeſalpin. Caules ſortitur dodrantales, rotundos, fractu contumaces, multos à diverſis, radicis albicantis, ac oblongis ramoſis fibris ſe diſpergentis, nodoſis capitibus, prodeuntes; quos conſcendunt folia, è latitudine ſubrotundâ in mucronem producta, dura, rigidiuſcula, atrovirentia, per longitudinem crebris nervis virgata: ſingulorum foliorum medio gloſſarium ſeu ligula folioſa parva inſidet, ſub quâ in tenui pediculo, nervo à ſinu folij latioris exeunte, lirato, poſt florem parvum palleſcentem elapſum, pendent baccæ rubentes, Aſpargo majores, ſeminis oſſiculum obvelantes.

Dodon. 733. fol.
Coeſalpin. lib. 5. fol. 222. cap. 29.
Cluſ. ſub Lauri Alexand. titulo, f. 278.
Lobel. Obſ. 362. Adv. 284.
Lugdu. Lauri Taxæ nomine, fol. 205.
Epit. Matth. Cam. 919.
Hort. Med. 75.
Matth. C. Bauh. 829.

Phytopin. 603. fol.
German: Zäpflein-Kraut/ Zungen-Blatter.
Trag. lib. 1. cap. 131.
Fuchſ. cap. 87.
Tabern. 138. fol. lib. ſecundo ſub Vulariâ mare.
Cam. Matth. Germ. 415. fol.
Durant. 451.

### II

PRimula Veris Anglicana, flore pleno. Folijs eſt vulgatiori Primulæ non diſſimilibus, ſed longioribus, pallidè virentibus, & ſecundum margines eroſas criſpatim nonnihil ſinuoſis, ex unius radicis capite, ſubtùs in denſos fibrarum faſciculos diſperſo, orientibus: caulis è medio illorum attollitur mediocri craſſitudine, pallidè vireſcens, pedem aut ſeſquipedem æquans, verticetenus in umbellam denſiuſculam, multis inæqualibus petiolis alabaſtra, angularia ſub fulcientibus, conſtantem, quibus flores ſpecioſi, vulgari Primulâ ampliores, luteoli, multiplici texturâ ac proventu foliorum placentes, inſertos vides.

Dodon. 147. fol.
Lobel. Obſ. 305. Adv. 244.
Lugdunenſ. 834.

Epit. Matth. Cam. 883. fol.
Hort. Med. 22.
Matth. C. Bauh. 801.

Phytopin. 461.
Germ: Gefüllte Engliſche Schlüſſel-Blumen.

Tabern. 34. fol.
Cam. Matth. Germ. 404.
Durant. 800.

### III

SAnicula montana altera Cluſij. Sanicula alpina ſive guttata Camer: Caryophyllata ſeu Geum alpinum recentiorum fol. hederaceo Lobel. Radix nonnihil ſquamata, craſſiuſcula, in crebras demiſſas fibras deſinit, emittens folia propemodùm circinatæ rotunditatis, hirſuta, Saxifragæ albæ, aut aureæ dictæ, æmula, altius circumſerrata, & averſâ parte ſubalbida: caulis ſeſquipedem æquat, pariter hirſutus, in alis ſupernè oſtendens flores, quinis folijs Hyperico ſimiles, ſed albos, intùs ſanguineis minutis punctulis diſtinctos, his bifida vaſcula ſubmittunt ſemina nigra minutiſſima.

Cluſius 307. fol. lib. 3.
Lobel. 267. Adv.
Lugdunenſ. 687.

Cam. Epit. Matth. 764. fol.
Hort. Med. 153. fol.
Matth. C. Bauh. 723. fol.

Phytopin. 464.
Germ: Wild Schellkraut/ oder weiß Sanickel.
Cam. Matth. Germ. 353. fol.


II.
Periclymenon perfoliatum
IIII
Juncus Cyperoides palu,,
dosus.
I.
Clematis Daphnoides
maior.
III
Periclymenon germanicum

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

CLematis Daphnoides major. Folijs ferè eſt Laurinis, & ſecundum pediculum ſinuatim formatis, carnoſis, perpetuo virore nitentibus, caulibus tenuibus, obſequioſis, ſarmentoſis, procumbentibus: flores ſingulatim ad exortum foliorum prodeunt in pediculis tenuibus, & lentis, folijs eleganter cœruleis, ab anguſtâ baſi in latiorem tendentibus, ac ſummis oris leniter crenatis, conſtantes: radices albeſcentes tenuiter fibrantur.

Dodon. 401.
Cluſ. 121. fol.
Lobel. Obſ. 360. Adv. 282.
Lugdunenſ. 833. fol.

Hort. Med. Cam. 43.
Phytopin. C. Bauh. 598. fol.
German: Groß blau Inngrün/oder Sinngrün.

### II

PEriclymenum perfoliatum. Sarmenta prolixa, lignoſa, ſubalbicantia, & quandóque rubeſcentia, brachiata emittit, mirè & variè ſe pergulis aptantia, folijs veſtita latis, oblongis, mollibus, craſſis, dilutè vireſcentibus, ac ſubinde ſibi invicem connexis, ita ut etiam ſuperiore parte caulis, concavitatem quaſi acetabulorum affectent: flores albeſcunt, ſuaviter odorati, ſummis ramulis faſciculatim prodeunt, ex oblongâ, concavâ, fiſtuloſâ ſpecie, in duas particulas diviſi, quarum altera latior eſt reflexa, & veluti oretenus parùm ſecta, altera oblongam, anguſtam, prominentem ligulam æmulatur: è medio labrorum exeruntur tenuia ſtaminula aliquot: ſubnaſcuntur his marceſcentibus baccæ, ſucciplenæ, ovalis figuræ, rubentes, ſemina intra pericarpia ſervantes: radix longis & multis fibris demiſſis fulcitur.

Dodon. 406. fol.
Cœſalpin. cap. 11. lib. 5. fol. 207.
Lobel. 357. Obſ. Adv. 280.
Lugdunenſ. 1427.

Epit. Matth. Cam. 713. fol.
Hort. Med. 121. fol.
Matth. C. Bauh. 691.
Phytopin. 600.

Germ: Welſch Geiß-Blat/Speck-Lilien Zeunling/Wald-Gilgen/Wald-Winden.
Tabern. 589. f. 1.
Cam. Matth. Germ. 332. fol. Durant. 722.

### III

PEriclymenum non perfoliatum, Germanicum. Superiori ſimile eſt, niſi quòd folijs, ſibi invicem oppoſitis, magis in longitudinem abeuntibus, nec ita arctè ramulos ambientib⁹ conſtet.

Lobel. 358. Obſ. Adv. 280.
Lugdunenſ. 1428. fol.
Phytopin. C. Bauh. 601.

Germ: Teutſch gemein Speck Lilgen/ Je länger / je lieber.
Trag. lib. 2. cap. 96.

Fuchſ. 350. cap.
Vide etiam Autores ſuperiùs citatos.

### IV

IUncus Cyperoides paludoſus, Juncus floridus. Gladiolus paluſtris Cordi. Radix densè fibratur, folia ab uno ceſpite multa ſursùm ſpectant, Sparganij vel Cyperi ritu anguſta, longa, lævia, uti & caules intùs fungoſi, ſesquicubitales, faſtigiatim in umbellam quaſi floſculorum, ex albo dilutè purpuraſcentium, qui tenuibus oblongis pediculis ſuſtinentur, abeuntes.

Dodon. 590.
Cœſalp. l. 14. c. 17. nom Butomi f. 553.
Lobel. 44. Obſ. 44. Adv.
Lugdunenſ. 989. fol.

Epit Cam. 781. fol.
Matth. C. Bauh. 731. fol.
Phytopin. 29. fol.
Germ. Groß bluhende Bintzen/Cyperſchwertel.

Trag. 37. lib. 2.
Tabern. 699. lib. 1.
Matth. Germ. Cam. 361.
Durant. 483. fol.


II.
Epipactis angustisfolijs.
III.
Æsphodelus Liliaceu
I.
Fraxinella.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

FRaxinella. Dictamnum album. Radix ex unâ baſi, craſsis albicantibus fibris demiſſis, variè divaricatur, & hircinum quid redolet; caules ex eâ prodeuntes firmi ſunt, rotundi, decorati folijs Fraxini modo & ſpecie, ex uno nervo conjugatim hærentibus, attroviridibus, duris, ambitu minutè crenatis: ſuperior pars caulis floribus veſtitur elegantibus, in albo leviter ſubrubentibus, è nutantibus quinis folijs oblongis, & liratim venulis diſperſis inſignitis, & media tenuium ſtaminum reflexorum ſerie conflatis: ſemina triquetræ ſcabræ ſiliquæ nigra, ſplendida, rotunda, ac parùm in mucronem vergentia, condunt.

Dodon. 845.
Cœſalpin. 15. lib. 27. fol. 589.
Lobel. 537. Obſ. Adv. 410.
Lugdunenſ. 872. fol.
Cluſ. 99. fol.
Epit. Cam. 473.
Hort. Med. 55. fol.

Matth. Caſp. Bauh. 523. fol.
Paul. Renealm. ſpecim. hiſt. plant. 121. 122. &c. f.
Germ: Gemeiner Diptam/auch Aſch-Wurtz.
Trag. 7. cap. lib. 1.
Tabern. 450. lib. ſecundo.
Matth. Cam. Germ. 242. fol.
Durant. 324. fol.

### II

EPipactis anguſtifolia. Radices denſâ craſſarum albeſcentium fibrarum congerie conſtant, caulémque ſubminiſtrant pedalem, atque in eo folia Veratri albi ſpecie, ſed longè minora, per longitudinem nervata, ab exortu ſuo, quaſi illum circumvolventia: flores in oblongâ quaſi ſpicâ pendebant, è quinis folijs conflati, albidi, & in medio ſublutei.

An Helleborin. ſecunda Cluſ. fol. 273.
Germanicè, Wild weis Nieß-Kraut.
Et Helleborine flore albo. Tabern. fol. 396.

### III

LIliaſphodelus, ſeu Aſphodelus Liliaceus, luteo odorato flore. Radix crebris glandulis oblongis, Aſphodelinis, cui ſe aliæ craſſæ longiuſculæ intermiſcent fibræ, prædita eſt, ſtatim è capite emittens ceſpitem foliorum longorum, & carinatorum, inter quæ caulis cubito altior, teres, firmus, in ſummitate flores, Lilij albi æmulos, flavos, odoratos exhibet, ſucceſſivè ſe explicantes.

Dodon. ſub titulo Lilij non bulboſi, 204.
Lobel. 47. Obſ. Adv. 45.
Cluſ. fol. 137.
Lugdunenſ. 1590. fol.
Hort. Med. Cam. 89. ſub Lilij non bulboſi nomine.
Phytopin. C. Bauh. 113. fol.
Germanicè, Gelb wol-riechende Aſphodill-Lilien.
Tabern. 348. lib. ſecundo.



*Lilium* II *Convallium flo: albo*

I. Phalangium Alobrogi, cum maius.

*Lilium* III *Convallium flo: incarnato*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

PHalangium Allobrogicum. Folia longa, alijs Phalangijs paulò latiora, ſurrecta, viridia, carinata, ſe invicem inferiùs amplectuntur, atque ſimul è medio ſui erumpentem caulem rotundum, viridem, cujus ſumitates floribus albicantibus aliquot, Lilium bulboſum flavum quadantenus affectantibus, ex intervallis decorabantur, ſed minoribus, odoratis, & ſtaminibus quibuſdam tenuibus reflexis (quorum apices flavi) gracilem ſtylum medium prominentem circumdantibus: radix ab unâ baſi in complures craſſas, oblongas, albeſcentes fibras diffundebatur.

Cluſ. Append. alterâ depingitur.
An Lugd. Phalang. Dalechamp. affine. fol. 852.
Germanicè, Fremd Spinnen-Kraut/oder weiſer Widerthon.

### II

LIlium Convallium majus, flore albo odorato. Radicum tenuium & tenacium, albeſcentium, miris reflexibus, graminis modo, ſe reſtibili fœcunditate propagat, caules emittens dodrantales, binis longis folijs, Polygonatum quodammodò referentibus, præditos, atque ex inferiore caulium tenui involucro pediculum, ſeu ſtylum longum, qui ſuperiùs longâ ſerie floſculos multos rotundos, concavos, nutantes, vulgaris Lilij Convallij floribus ferè duplò ampliores profert, quorum labra leviter denticulata & reflexa cernuntur: & poſt flores deinde baccas rubeſcentes, ſemina dura occultantes.

Meminit illius Cam. Hort. Med. fol. 89.
Phytopin. C. Bauh. 1134. fol.
Germanicè, Groß wol-riechende Mayen-Blumen/oder Zancken.
Matth. Germ. Cam. 286. in textu, ubi illi montes
Tyrolenſes natales aſſignat.

### III

LIlium Convallium floribus rubris. E rubro ad purpureum colorem vergunt flores, & odore minùs valent, cæteris notis ſuperioris familiam refert, & à vulgari tantùm his indicijs differt.

De quo vide Dodon. 205.
Cœſalpin. lib. 5. cap. 34. fol. 225.
Lobel. Obſ. 87. Adv. 61. Icon. 173.
ubi noſtrate apponit.
Lugdunenſ. 838. fol.
Epit. Cam. Matth. 618.
Hort. Med. Cam. 89.
Caſp. Bauh. Matth. 632.

Phytopin. 113. fol.
Germanicè, Rothe Mayen-Blumen.
Trag. cap. 197. lib 1.
Fuchſ. cap. 88. (ruit lib. 2.
Tabern. 429. qui etiam hujus iconem inſe-
Matth. Cam. Germ. ubi & noſtratis in ſpecie meminit, fol. 286.
Durant. 524.



II. *Cynoſorchis flore purpureo.* I. Aſphodelus maior albus. III. *Fumaria rubra tenuifolia*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ASphodelus major albus. Haſtula regia, Albucum ſive Albucus Dodon. Radices à baſi in oblongos, plurimos, teretes, glanduloſos, ſucculentos proceſſus diſperguntur, ac erigunt folia multa oblonga, Porro æmula, parùm carinata, viridia, atque acuminibus finientia: è medio illorum caulis tantùm non ſeſquicubitalis, rotundus, procedit, in brachia terna ſuperiùs divulſus, quæ undique ſtipant flores, Phalangio ſimiles, candicantibus folijs ſtaminula flaveſcentia ſtellatim obſidentes, quibus capitula orbiculata, ſeminum feracia, ſubnaſcuntur.

Dodon. fol. 206.
Cœſalpin. lib. 10. cap. 26. fol. 415.
Lobel. Obſ. 46. Adv. 45.
Lugdunenſ. 1588. fol.
Cam. Epit. Matth. 371. fol.
Hort. Med. 23. fol.
C. Bauh. Matth. 451. fol.
Phytopin. Bauh. 56.
Germanicè, Weis groß Aſphodill-Wurtz.
Tabern. 339. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 194. fol.
Durant. 108. fol.

### II

CYnoſorchis flore purpuraſcente. Radices geminas, quarum una marcida, altera ſucculentior, Olivaris formæ, & nauſeoſi odoris, oblongæ, craſſæ fibrarum appendiculæ ſuperiùs nonnihil obtegunt, progreſſæ ex caulè palmari, aut nonnunquam altiore, quem inferiùs folia Liliaceis minora & anguſtiora, lævia, dilutè virentia, & ſenſim gracileſcentia involvunt; ſuperiùs ſpica excipit denſiuſcula, oblonga, conſtituta è floribus puſillis, ſupernè galeatis & purpuraſcentibus, cæterâ parte labrorum in quatuor barbulas albicantes, & purpureis punctis diſcretas, divulſis.

Cluſ. 268. fol.
Phytopin. C. Bauh. 118.
Germanicè, Purpur-braun Knaben-Kraut.

### III

FUmaria rubra tenuifolia. Capnos tenuifolia Hiſpanica. Radix tenuis, annua eſt, caulis angularis, pellucidus, tener, dodrantalis, multiplex, in quo folia multivarijs & penè capillaceis ſegmentis, vulgari multò tenuioribus, & pallidioribus, diſciſſa: flores cacumina ramulorum occupant, vulgaris quidem ſpecie, ſed minores, nutantes, maximâ ex parte rubentes, pauco albo, viridi & luteo colore variegati, confertas ſpicas conſtituentes: his ſuccedunt ſemina, è rotunditate oblongiuſcula, exigua, compreſſa, fuſca.

Lobel. Obſ. 438. Adv. 338.
Cluſ. CCVIII.
Cam. Hort. Med. 62. fol.
Germanicè, Rother fremder geſcheckter Erdrauch.
Tabern. 103. fol. lib. 1.



II. *Dorea Narbonenſium.*  I. Lilium fatuum.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

I

Lilium fatuum, Liliaſphodelus puniceus Cluſij, Phœniceus Lobel. Folijs prodit Porro longioribus, latioribus, & ſurrectis, atque à radicis, in multas glanduloſas oblongas appendices diſperſæ capite, ſe invicem amplectentibus, dilutè viridibus, & carinatis, Aſphodeli lutei liliacei folijs vegetioribus, cui etiam flores reſpondent liliacei, colore ſupernè obſoletè punicantes, caduci, marginibus ſuis ſubindè tenuiter criſpati, ac ungues verſus in luteum colorem elangueſcentes, quibus ſemina plana Martagi in oblongis angularibus capitulis ſuccedunt.

Dodon. fol. 204.
Cluſ. in textu. 137.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 30. fol. 416.
Lobel. in textu, Liliaſphodeli phœnicei facie, Obſerv. 48. Icon. 93.
Lugdunenſ. 1499. Hemerocallid.
Dodon. & Lilii non bulboſi titulo.
Cam. Hort. Med. 89. fol.
Phytopin. C. Bauh. Lilij rubri Aſphodeli facie, fol. 113.

Germanicè, Todten-Lilien.

Tabern. ſub titulo Aſphodeli liliacei rubri ſecundi, fol. 339. Tom. ſecundo.

II

DOrea ſeu Doria Narbonenſium putata. Solidagini Sarracenicæ conformis eſt. Bicubitalem ſæpiùs attingit altitudinem, folijs Hippolapathi longitudinem ſuperantibus, glabris, viridibus, & ambitu tenuiter dentatis, quæ ſuperiùs in tenuem faciem abeuntia, inferiùs paulò latiorem referentia, caulem obſident ſummitate ſurculoſum, & floribus Solidaginis ejusdem (quam etiam ſemina, pappis tenuibus inhærentia, minuta, exprimunt) ſimilibus, luteis, faſtigiatum: radix ſatis magna eſt, & fibroſa.

Lobel. Obſerv. 158. Adverſ. Herbæ Doriæ titulo.
Lugdu. ſub duabus Iconibus, uni deſcriptioni additis, titulo herbæ aureæ Penæ & Lobelij:
& Doreæ ſive aureæ herbæ Narbonenſium Penæ. 1273. fol.

Germanicè, Frembd gülden Häydniſch Wund-Kraut.

Tabern. 339. ſub titulo.



I. Aſparagus domeſticus.

II. Thyrſus Aſparag

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Vernalium.

### I

ASparagus domeſticus. Radices, crebras, longas, craſſas fibras, hinc inde diſperſas, altè demittunt, è multis capitibus, ſibi invicem cohærentibus, & craſsè ſquamatis, ortas, quæ deindè in turiones ſeu aſparagos luxuriant ſucculentos, teneros, læves, molles, unde demùm, ætatis ſucceſſu, caules ſenſim gracileſcentes, ſeſquicubitales, aut altiores, in ramulos tenues multipliciter diffunduntur, quos folia frequentia, brevia, tenuia, & capillacea, longâ ſerie veſtiunt, atque inter illa flores, tenuibus pediculis affixi, oblongiuſculi, concavi, minuti, ex herbaceo palleſcentes, quibus Ochri magnitudine baccæ rubentes ſubnaſcuntur, intus ſubrotundis inæqualibus ſeminibus nigris turgentes.

Dodon. 691. fol.
Cœſalpin. lib. 5. cap. 26. fol. 217.
Lobel. Obſerv. 458. Adv. 353. fol.
Lugdunenſ. 610. fol.
Cam. Epit. Matth. 259. fol.
Hort. Med. 23. fol.
Caſp. Bauh. Matth. 373. fol.

Germanicè, Zame-Spargen.

Trag. 74. cap. lib. 1.
Fuchſ. 17. cap.
Tabern. 515. lib. 1.
Cam. Matth. Germ. 145.
Durant. 104.

### II

THyrſus Aſparagi. Ponuntur hîc ob oculos thyrſi, ſeu novelli turiones Aſparagi, molles, teneri, & quaſi foliorum rudimentis obſiti, ſub quibus maximus pollicarem craſſitudinem duplo æquabat, & aliquantùm compreſſus videbatur, & ſuperiore parte nutans.

Germanicè, Spargen-Kolben.

# JNDEX
# VERNALIUM PLANTARUM

## Omnium, in quo numerus anterior Ordines, poſterior verò folia deſignat.


Ordo.

### A.

0 Arbor Judæ, Judas Baum. Wild Johannes-Brodt fol. 3.
0 Amigdala cum flore, Mantell-Baum mit der Blühe. f. 6.
0 Anagyris anguſtis folijs, ein Linſen-Baum / Baum-Bohnen. f. 7.
0 Anagyris latis folijs, breit blätterichte Baum-Bohnen. f. 7.
1 Auricula Urſi flore albo, Weiſſer Berg-Sanickel. f. 2.
1 Auricula Urſi flore purpureo, Berg-Sanickel mit brauner Blumen. f. 2.
1 Auricula Urſi flore luteo, Berg-Sanickel oder Fluß-Blumen. f. 2.
1 Ariſtolochia flore albo, Weiſſe Holl-Wurtz. f. 2.
1 Anemone Sylveſtris flore albo, Weiſſe wilde Anemonen. f. 13.
1 Anemone tenuifolia flore purpureo violaceo, Schmal-blätterricht Purpur-Feil-braune Anemone. f. 17.
1 Anemone latifolia flore Coccineo pleno, breit blätterichte Anemone Rösel. f. 17.
1 Anemone latifolia purpureo rubeſcens plena. Breit-blätterichte Anemone Röslein. f. 17.
1 Anemone flore multiplici coccineo colore tenui folia, Teutſche hoch-rothe volle ſchmal-blätterricht Anemonen-Röslein. f. 18.
1 Anemone hortenſis flore pleno coccineo, latifolia, breit-blätterichte Anemonen-Röslein mit vollen Blumen. f. 18.
1 Anemone ſimplex latifolia dilute purpuraſcens, einfache breit-blätterricht Anemon-Röslein. f. 18.
1 Anemone hortenſis latifolia flore flavo dupliccato, breit blätterichte / bleich gelb Anemonen-Röslein. f. 18.
2 Arum, Aron Teutſcher Inguer. f. 1.
2 Arum latifolium, Aron. f. 1.
3 Allium Urſinum, Beer-Knoblauch. f. 10.
6 Alchimilla, Sinau / oder Löwen-Tatzen. f. 10.
6 Acetoſa Veſicaria peregrina, frembte Ampffer mit aufgeblaßnen Schöttlein. f. 11.
8 Acorus cum ſuo julo. Kalmus mit der Blühe. f. 9.
9 Aſphodelus liliaceus, gelbe wol-riechender Aſphodili Lilien. f. 5.
9 Aſphodelus major albus, weiß groß Aſphodeli-Wurtz. f. 7.
9 Aſparagus domeſticus. Zame Spargen. f. 9.

### B.

0 Buxus, Buxbaum. fol. 1.
2 Bulbus Sylveſtris ſeu Ornithogalum luteum, Feld-oder Acker-Zwiffel. f. 7.
5 Bulbus Lilij Perſici. f. 4.
5 Bulbus Sultan. f. 10.
6 Borago flore albo, Burretſch / oder Bortragen-Blumen. f. 14.
6 Borago Flore cæruleo, weiſſe Burretſch / oder Bortragen-Blumen. f. 14.
7 Bellis prolifea variegata, geſprengt gefüllte Maßlieben mit vilen Neben-Blümlein. f. 4.
7 Bellis minor flore multiplicis rubra, gefüllte rothe Maßlieben. f. 4.
7 Bellis minor multiplici flore alba, gefüllte weiſſe Maßlieben. f. 4.
9 Biſtorta major, Natter-Wurtz. f. 1.

### C.

0 Ceraſus flore pleno, gefüllte Kirſchen-Blühe. f. 4.
0 Ceraſus Racemoſa Sylveſtris, Elſchtern-wilte Trauben-Kirſchen / oder Vogel-Kirſchen. f. 4.
0 Clematis Daphnoides minor flore albo, Sinngrün oder Berwinck mit weiſſen Blumen. f. 8.
0 Clematis Daphnoides flore cæruleo, Sinngrün mit blauen Blumen. f. 8.
0 Clematis Daphnoides flore purpureo, Sinngrün mit Purpurfarben Blumen. f. 8.
0 Clematis Daphnoides flore purpureo pleno, Voll Purpurfarbe Sinngrün. f. 8.
0 Cytiſus quintus Cluſis putatus, Baum-Klehe der fünffte bey dem Cluſio geachtet. f. 10.
0 Cytiſus Columellæ Camerarij, raucher Baum-Klehe von Columella angedeutet. f. 11.
0 Cytiſus Septimus Cluſij ſimilis, Baum-Klehe der mit 7. Cluſij ſich vergleichet. f. 11.
0 Colutea Veſicaria, Welſch Linſen-Baum / Schaaf-Linſen / wild Sennet-Baum. f. 12.
0 Cytiſus Galeni Maranthæ Cornutus, Gehorneter Baum-Klehe / oder Gaiß-Klehe. f. 12.
0 Cytiſus primus Tabernæ Montani ſpicatus, Gaiß-Klehe / der erſte deß Tab. f. 12.
1 Conſolida media, Braun Gülden Gundell. f. 6.
2 Colchicum Vernum, gefüllte Liecht-rothe Frühling-Zeitloß. f. 1.
2 Crocus Vernus, Purpur-brauner Frühling-Saffran. f. 3.
2 Crocus Vernus, Frühlings-Saffran mit weiſſen-Blumen. f. 3.
2 Crocus Vernus albus fundo viol. Weiß Frühling-Saffran mit Veil-braunen Boden. f. 15.
3 Colchicum Vernum flor: purpur: plenum, groß Purpurfarb gefüllter Frühling-Zeitloß. f. 1.

5 Corona Imperialis Polyanthos, Vil-Blumen tragende Käyſers-Cron. f. 1.
5 Corona Imperialis / Goldtfarbe Käyſers-Cron. f. 2.
5 Corona Imperial: Florum claſſe duplici: Roth-Feuer / Haar-farbiſche Käyſer-Cron. f. 3.
5 Chamæ Iris Sylveſtris minor. Kleine blaue Schwertl. f. 4.
5 Centaurium flore luteo, klein Tauſent Gulden-Kraut mit gelben Blumen. f. 7.
5 Centaurium minus flore rubro: klein Tauſent-Gulden-Kraut mit rothen Blumen. f. 8.
5 Centaurium minus flore albo: klein Tauſent Gulden-Kraut mit weiſſen Blumen. f. 8.
6 Cyclamen Vernum. Schwein-Brodt / welches im Frühling grünet. f. 13.
7 Cacuta maxima, groß Wüſchterling / oder Waſſermerck. f. 2.
7 Caltha paluſtris flore multiplici, gefülte Dotter-Blumen. f. 5.
7 Cynanus major: groß blau Wald-Korn-Blumen. f. 6.
7 Chamæpitys Auſtriaca, Oeſterreichiſch Erd-Küffer. f. 6.
7 Cyanus aruenſis flore cæruleo, blaue Korn-Blumen. f. 7.
7 Cyra: aruenſis flore incarnato. Fleiſch-farbe Korn-Blumen. f. 7.
7 Cyranus aruenſis flore albo, weiß Acker Korn-Blumen. f. 7.
7 Cyranus flore purpureo aruenſis, Purpurfarbe Acker Korn-Blumen. f. 7.
7 Cyranus flore rubro aruenſis, roth Acker Korn-Blumen. f. 7.
7 Cyranus aruenſis flore variegato, weiß Korn-Blumen mit roth und blau-vermiſchten Putzen. f. 7.
7 Cyranus aruenſis flore variegeto fundo purpureo, weiſſe Korn-Blumen mit Purpurfarben braunen Putzen. f. 7.
8 Chamæiris latifolia VIIII. Cluſij, breit-blätterichte klein Schwertl / auß Purpurfarben und bleich-gelben Blumen. f. 1.
8 Chamæiri latifolia X. Cluſij, breit-blätterichte klein Schwertl mit Purpur-oder vielfärbige Blumen. f. 1.
8 Chamæiris latifolia minima, der kleiniſte / breit-blätterichte Schwertl mit bleichen Blumen. f. 1.
8 Chamæiris latifolia biflora, klein Schwertl-Wurtz mit ſatten Viol-braunen Blumen. f. 1.
8 Chamæiris flore argenteo, breit-blätterricht kleiner Schwertl / mit ſilber-farben Blumen. f. 2.
8 Chamæiris cæruleo violaceo colore, breit blätterichter kleiner Schwertl mit braunen / und blauen Blätteren. f. 2.
8 Chamæiris flore candido, kleine breit-blätterichte Schwertl mit gantz weiſſen Blumen. f. 2.
8 Chamæiris flavo & purpureo flore, kleiner breit-blätterricht Purpur und bleich-farber Schwertl. f. 2.
8 Calceolus Mariæ, Unſer Frauen Schueh. f. 6.
8 Caccealis Dodonæi, Acker-Klettenkorffel. f. 8.
8 Cruciata. Peters-oder Creutz-Wurtz. Wodelgeer. f. 8.
8 Chamædrys, Camanderlein / auch klein Bath-Engl. f. 9.
9 Chelidonium minus, Feig-Wurtz / Blatter-Kraut. f. 1.
9 Clematis Daphnoides major, groß blau Inngrün / oder Sinngrün. f. 4.
9 Cinoſorchis flore purpureo, Purpur braun Knaben-Kraut. f. 7.

### D.

1 Dens Caninus Belgarum, Schopff-Wurtz / weiß Stendel-Wurtz. f. 1.
1 Dens Caninus, rothe Schopff-Wurtz. f. 1.
1 Doronicum, Gemſen-Wurtz. f. 5.
2 Dracunculus aquatilis. f. 16.
9 Dorca Narbonenſium, frembdt gulden Heydniſch-Wund-Kraut. f. 8.

### E.

9 Epipactis anguſtifolia, wild weiß Nieß-Kraut. f. 5.

### F.

1 Fumaria tenui folia flore niveo. f. 11.
3 Frittilaria, braun-geſcheckte Narciſſen-Lilien. f. 7.
3 Frittilaria flore pleno, braun abhang Narciſſen-Lilien mit groſſen Blumen. f. 8
3 Frittilaria alba, ſchnee-weiß abhang Narciſſen-Lilien. f. 8.
3 Frittilaria pyrenæa obſoleto luteo colore, braun gelb-geſcheckte Narciſſen-Lilien. f. 9.
3 Frittilaria minor obſoleto colore inodora, gelb geſcheckte Narciſſen-Lilien. f. 9.
3 Frittilaria Polyanthos lutea, viel-tragende gelb-geſcheckte Narciſſen-Lilien. f. 9.
3 Frittilaria Juncifolijs, Bintzen-blätterichte Narciſſen-Lilien. f. 10.
7 Fraga fructu magno, groſſe rothe Erd-Beer. f. 8.
7 Fraga fructu albo, weiſſe Erd-Beer. f. 8.
7 Fraga fructu rubro, rothe Erd-Beer. f. 8.
9 Fraxinella, gemeiner Diptam / auch Aſch-Wurtz. f. 5.
9 Fumaria rubra tenuifolia, roth-frembter geſcheckter Erdrauch. f. 7.


G.

# Index Vernalium Plantarum Omnium.

## G.


O Geniſta Scoparia, vulgi Lobel: gelbe Pfrumen/ oder Ruhrſchrotten. f. 11.
O Guajacana, vermeinter Zurgell-Baum. f. 13.
1 Garyophyllata Montana, Berg-Benedicten-Wurtz. f. 5.
1 Geranium muſcatum inodorum, Biſem Storch-Schnabell ohne Geruch. f. 8.
1 Geranium Batrachioides magnum ſpecioſum, blauer Storch-Schnabel-Blumen. f. eodem.
1 Geranium Batrachioides flore albo, weiß groß Storch-Schnabell. f. 8.
1 Geranium Anglicanum variegatum, Engliſch geſprengt Storch-Schnabell-Kraut. f. 9.
1 Geraninm Sanguinarium majus, Blutberg Storch-Schnabell-Kraut/ oder Gottes-Gnad. f. 9.
1 Geraneum moſcatum odoratum, Biſem Storch-Schnabell-Kraut. f. 10.
1 Geranium fuſcum, frembder Storch-Schnabell. f. 10.
1 Geranium Saxatile, Berg-Storch-Schnabell. f. 10.
1 Geranium Sanquinarium, Blut-Röslein/ Blut-Wurtz/ Schnabel-Kraut. f. 16.
1 Geranium Magrorhizon, Berg-Schnabell-Kraut. f. 16.
1 Geranium Tuberoſum, Storch-Schnabel-Kraut. f. 16.
3 Gnaphalium Montanum variegatum, geſprengt Engel-Blümlein. f. 16.
Aliud ſuave rubens, rothe Engel-Blümlen. f. 16.
5 Gemita tinctorum, Ferr-Blumen/ Heyden-Schmuck. f. 12.
6 Gratiola flore albo, & Gratia Dei, Wildt-Aurin. f. 15.
7 Gentianella minima verna flore cæruleo, klein blau Gentian, ſo im Frühling grünet. f. 15.


## H.


O Hepatica paluſtris, Waſſer Leber-Kraut. f. 3.
2 Hyacinthus Stellatus, gemeiner blauer Stern-Hyacinth.
2 Hepatica aurea, gelb gefüllte gulden Leber-Kraut. f. 2.
2 Hepatica aurea flore albo, gulden Leber-Kraut mit weiſſen Blumen. f. 2.
2 Hyacinthus Botryoides, Leibfarber Trauben-Hyacinth. f. 2.
2 Hepatica aurea, Edel oder Gulden-Leber-Kraut mit blauen Blumen. f. 3.
2 Hepatica aurea flore rubro, Edel Leber-Kraut mit rothen Blumen. f. 3.
2 Hyacinthus Orientalis flore cæruleo, Orientaliſcher blauer Hyacinth. f. 4.
2 Hyacinthus Orientalis flore violaceo, Veil-brauner Orientaliſcher Hyacinthen-Blumen. f. 4.
2 Hyacinthus Oriental: flore purpureo alb. Hertzen-Blumen. f. 5.
2 Hyacinthus Orientalis flore albo, frembder Hyacinth mit Aſchen-farben gantz weiſſen Blumen. f. 5.
2 Hyacinthus Orientalis: frembder Hyacinth mit Aſchen-farben weiſſen-Blumen. f. 5.
2 Hyacinthus parvus ſtellatus, blauer Stern/ Hyacinth der kleiniſte. f. 5.
2 Hyacinthus Orientalis variegatus: Orientaliſcher braun-rother Hyacinth. f. 6.
2 Hyacinthus Orientalis mixtus, blau und weiß gemiſchter Oriental-Hyacinth. f. 6.
2 Hyacinthus Orientalis, Oriental-brauner Hyacinth-Blum. f. 7.
2 Hyacinthus Orientalis argenteo colore, Silberfarb-Hyacinth-Blumen. f. 7.
2 Hyacinthus Anglicus, blauer ſpater Engliſcher-Hyacinth. f. 8.
2 Hyacinthus Serotinus, ſpater weiſſer Hyacinth. f. 8.
2 Hyacinthus Anglicus flore incarnato, leibfarber Engliſcher-Hyacinth. f. 8.
2 Hyacinthus Anglicus col. viol. Amethyſten Farben Engliſcher-Hyacinth. f. 8.
2 Hyacinthus Anglicus col. Amethyſtino, bleich-Viol-brauner Engliſcher Hyacinth. f. 8.
2 Hyacinthus Stellatus Peruanus, Stern-Hyacinth auß Peru. f. 9.
2 Hyacinthus Botryoides major. Groß Viol-braun Hyacinth. f. 10.
2 Hyacinthus Stellatus Italicus, Italianiſcher Stern-Hyacinth. f. 11.
2 Hyacinthus Comoſus Byzantinus, dunckel-grauer Conſtantinopolitaniſcher-Hyacinth. f. 11.
2 Hyacinthus Hiſpanicus flore violaceo: Liecht-brauner Orientaliſcher Hyacinth. f. 12.
2 Hyacinthus Hiſpanicus flore incarnato, Leibfarbe Blumen voll Spaniſch-Hyacinth. f. 12.
2 Hyacinthus Stellaris Bizantinus, Conſtantinopolitaniſcher-Stern-Hyacinth. f. 13.
2 Hyacinthus candidiſſimus pleno flore, gefüllter weiſſer Orientaliſcher Hyacinth. f. 14.
2 Hyacinthus Orientalis Serotinus erectis floribus candid: weiſſer Edler Orientaliſcher Hyacinth. f. 14.
2 Hyacinthus Orientalis Serotinus erectis cæruleis floribus, ſpäter Orientaliſcher mit blauen aufrechten Blumen. f. 14.
2 Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno, blauer Orientaliſcher gefüllter Hyacinth.
2 Hyacinthus Orientalis Serotinus mixtus, Oriental: Hyacinth gemiſchter Farben.
2 Hyacinthus Orientalis violaceo colore albis lineis, Orientaliſcher Veil-brauner Hyacinth. f. 15.
2 Hyacinthus Orientalis flore duplici, doppelter Orientaliſcher Hyacinth. f. 15.
2 Hyacinthus Orientalis reflexis folijs col. viol. Schatt-brauner Orientaliſcher Hyacinth geſtreifft. f. 15.
2 Hyacinthus Serotinus maximus, Hirſch-farbe Blumen-Hyacinth. f. 16.
2 Hyacinthus Comoſus ſpurius. f. 16.
2 Hyacinthus Anglicus Cinericeus. f. 16.
3 Hyacinthus Botryodes cæruleus, gemein Trauben-blauer Hyacinth. f. 1.
3 Hyacinthus Botryoides floribus albis, weiß Trauben-Hyacinth. f. 1.
5 Hyacinthus Serotinus obſoleto colore, ſpater Hyacinth. f. 14.
9 Hippogloſſum, Zäpflein-Kraut/ Zungen-Blatter. f. 3.


## I.


5 Iris tuberoſa; lang-knöttichte Schwertl. f. 4.
8 Iris pratenſis major, Himmel-blau Wieſen-Schwertl. f. 3.
8 Iris Calcedonica latifolia, Veil-Wurtz von Canſtantinopel/ mit ſchwartz geſcheckten Blumen. f. 4.
8 Iris Florentina, weiſſe wolriechende Veil-Wurtz. f. 4.
8 Iris Jllyrica, Himmel-blaue wolriechende Veil-Wurtz. f. 4.
8 Iris latifolia violaceo colore major, groſſer blätterichter brauner Schwertl/ oder Veil-Wurtz. f. 5.
8 Iris latifolia vulgaris cærulea, breit-blätterichter Himmel-blauer Schwertl. f. 5.
8 Iris latifolia major variegata. f. 5.
8 Iris Portugalica, weiſſe Portugaliſche mit braunen Streiflein geſprengte Schwertl-Lilien. f. 6.
8 Iris Pannonica variegata, Veil-braune geſprengte Schwert-Lilien. f. 6.
8 Iris latifolia, dunckel-braune geſcheckte Veil-Wurtz ſo riechet wie Holder-Blühe. f. 7.
8 Iris lutea variegata Lobelij, geſprengt gelbe Veil-Wurtz. f. 7.
9 Juncus Cyperoides paludoſus, groß blühende Bintzen. f. 4.


## L.


O Lunaria Botrytis, Monat-Kraut/ Mon-Rauten. f. 3.
O Lychnis viſcoſa ſylveſtris flore incarnato, wilde leibfarbe Negelein. f. 5.
O Laurus cum flore, Lorberbaum mit ſeiner Blühe. f. 6.
O Liguſtrum, klein weiten Mund-Holtz/ Bainhöltzel. f. 13.
1 Lychnis Sylveſtris, wilde Morgen-Röslein. f. 6.
1 Lunaria græca perennis, groß/ weiſſe Griechiſche-Violen. f. 7.
1 Lunaria græca annua, braune Mond-Violen. f. 7.
3 Lilio Narciſſus Hemero colli disfaciè, Conſtantinopolitaniſche Lilgen-Narciſſen. f. 16.
3 Lilio Narciſſus Bononienſis. f. 16.
3 Leucoium Bulboſum minus. f. 16.
4 Leuconinm Bulboſum Serotinū groſſer ſpater vil-blumichte Hornungel-blumen. f. 10.
5 Lilium Perſicum, Perſianiſche Lilien. f. 4.
5 Lilium Cruentum flore pleno, gefüllte gold-farbige Lilien. f. 5.
5 Lilium purpureum majus Dodonei. f. 6.
5 Lilium cruentum bulbiferum, roth goldfarbe Lilien mit Zwiflen. f. 7.
5 Lilium cruentum polyanthos, goldfarbe Lilien mit vielen Blumen auf einem Stengel. f. 8.
5 Lilium album, doppelte weiſſe Käyſer-Lilien. f. 9.
5 Lilium Bizantinum flore multiplici, weiſſe Lilien. f. 9.
9 Lilium Convallium flore albo, groß wol-riechende May-Blumen/ oder Zancken. f. 6.
9 Lilium Convallium flore incarnato, rothe May-Blumen. f. 6.
9 Lilium fatuum, Todten-Lilien. f. 8.


## M.


2 Muſcari flore obſoleto albo, grau weiſſer Biſam-Hyacinth. f. 10.
2 Muſcari flore obſoleto nigro, dunckel-grau Biſam-Hyacinth. f. 10.
2 Muſcari obſoleto al: flor: Chalcedoniſch groß Trauben-Hyacinth. f. 13.
2 Muſcari luteo flore, frembt Trauben-Hyacinth. f. 13.
3 Meleagris Flos maximus Italicus, braun abhang Narciſſen-Lilien mit mehr Blumen. f. 8.
4 Moly latifolium flore favo. f. 7.
6 Meliſſa Fuchſij, Meliſſen deß Doct. Fuchſen. f. 7.
9 Mandragora Fæmina, Alraun das Weiblein. f. 1.


## N.


1 Naſturtium Aquaticum flore pleno, gefüllter weiſſer Kreß/ oder Gaugblumen. f. 3.
1 Naſturtium Aquaticum ſimplici flore, Gaug-Blumen. f. 3.
3 Narciſſus totus luteus montanus major, der groß gelb Joſeph-Stab/ oder Hornungs-Blumen. f. 1.
3 Narciſſus totus luteus montanus minimus, klein gelber Berg Joſeph-Stab. f. 1.
3 Narciſſus Maximus medio purpureus, Spaniſch groß Narciſſen-Rößlein. f. 2.
3 Narciſſus medio luteus, gelb wolriechend Narciſſen-Blumen. f. 2.
3 Narciſſus medio purpureus. f. 2.
3 Narciſſus major flore multiplice, groß gefüllter Narciſſen-Roſen. f. 3.
3 Narciſſus Sylveſtris ſtellatus, gefüllte Stern-Joſeph-Stab. f. 3.
3 Narciſſus Juncifolius luteus flore pleno. f. 3.
3 Narciſſus major Juncifolius. Bintzen Plätterricht Narciſſen-Rößlein mit vielen gelben Blumen. f. 4.
3 Narciſſus Juncifolius latiore calice, gelbe Narciſſen-Röslein mit einem breiten Kelch. f. 4.
3 Narciſſus minor Juncifolius, das kleine Bintzen-blätterichte gelb wolriechende Narciſſen-Röslein. f. 8.
3 Narciſſus minimus Juncifolius, Bintzen-blätterricht klein gelb Narciſſen-Röslein. f. 4.
3 Narciſſus Septentrionalis flore luteo, groß vermengter gefüllter Joſeph-Stab. f. 5.
3 Narciſſus Septentrionalis calice luteo pleno duplicatis folijs, gelb-gefüllter Joſeph-Stab/ mit einem bleichen gelben doppelten Stern. f. 5.
3 Narciſſus Septentrionalis calice pleno luteo oris inciſis, mit zwey/ und dreyfachen Kelch gelber Joſeph-Stab. f. 5.
3 Narciſſus Juncifolius precox major, wolriechend gelbe/ groſſe Narciſſen-Röslein. f. 7.
3 Narciſſus Orientalis major polyanthos totus albus, groß weiß Orientaliſche wolriechende Narciſſen-Röslein. f. 11.
3 Narciſſus Orientalis medius totus albus polyanthos, mittel klare weiß Orientaliſche wolriechende Narciſſen-Röslein. f. 11.
3 Narciſſus Orientalis polyanthos minor totus albus, klein weiß Orientaliſche Narciſſen-Röslein. l: 11.
3 Narciſſus Orientalis medio croceus calice pleno, Orientaliſch Narciſſen-Röslein
3 mit gelb gefültem Kelch. f. 12.
3 Narciſſus Orientalia medio croceus major, weiß Narciſſen-Röslein mit goldtfarbem Kelch. f. 12.


Nar-

3 Narciſſus Conſtant: minor, kleines weiß Narciſſen-Röſlein mit Saffranfarben verborten Kelch. f. 12.
3 Narciſſus albus maximus calice luteo brevi, Conſtantinopolitaniſche weiß Narciſſen-Roſen mit einem gelben Kelch. f. 13.
3 Narciſſus albus medius calice luteo brevi, weiß geſternte Narciſſen-Röſlein mit gelben Kelch. f. 13.
3 Narciſſus totus luteus oblongo calice & reflexis folijs, Narciſſen-Röſlein mit hochen gelben Kelch. f. 13.
3 Narciſſus Nobilis Orientalis Polyanthus mixtus, Orientaliſcher gantz gefüllter weiſſer Narciß. f. 14.
3 Narciſſus de Algiers polyanthos totus luteus, Aegyptiſcher gelber Narciß mit mehr Blumen. f. 14.
3 Narciſſus Orientalis albus odoratus calice ſtellato, gantz weiß Stern Narciß / iſt auß Orient. f. 14.
3 Narciſſus Polyanthus Orientalis calice medio luteus odoratus maximus, & medio luteus odoratus maximus, & odoratus minor, groß 1. mittel Arth. 2. kleiner. 3. Orientaliſche Narciſſen mit niderholen Kelchen. f. 15.
3 Narciſſus Juncifolius polianthos albus. f. 16.
4 Narciſſus medio purpureus minor, weiß klein Narciſſen-Röſlein. f. 10.
7 Nymphæa alba major, groſſe See-Blumen / Haar-Wurtz. f. 3.
7 Nymphæa alba minor, kleine weiſſe See-Blumen. f. 3.
7 Nymphæa lutea, gelbe See-Blumen / Waſſermohn. f. 3.


## O.


O Oxyacantha Galeni, Saurach / Wein-Legelein / Sauer-Dorn. f. 9.
1 Orobus Pannonicus, wilde Ungariſche-Wicken. f. 6.
2 Ornithogalum minus, weiß Stern-Blumen / die kleinſte. f. 6.
2 Orchis minor flore incarnato, klein Knaben-Kraut. f. 9.
2 Ornithogalum medium, mittlere Stern-Blumen. f. 11.
2 Ornithogalum Neapolitanum, Neapolitaniſche Stern-Blumen. f. 12.
5 Ornithogalum ſpicatum flore lacteo, frembde Feld-Zwiffel mit weiſſen Blumen. f. 11.
5 Ornithogalum Pannonicum, Ungariſche Feld-Zwiffel / grünlechte Blumen. f. 11.
5 Ornithogalum Arabicum. f. 12.
5 Ornithogalum Hiſpanicum ſpicatum, Spaniſch Stern-Blumen. f. 13.
5 Ornithogalum lacteum maximum, weiſſe groſſe Feld-Zwiffel. f. 14.
5 Ornithogalum ſpicatum maximum, ein andere Arth der groſſen Feld-Zwiffel. f. 14.
6 Ophioglosſum, Natter-Zinglein. f. 7.
7 Onobrychis Belgarum, Unſer Frauen Spiegel. f. 1.
7 Orobanche, Ervenwürger. f. 2.


## P.


O Poma flore multiplici, gefüllte Aepffel-Blühe. f. 5.
O Piſtacia, , welſche Pimper-Nüßlein. f. 6.
O Polemoneum monespelienne, baumichter Wieſen-Klehe. f. 11.
1 Pulmonaria maculoſa, fleckend Lungen-Kraut / Hirſch-Köhel. f. 1.
1 Primula Veris ſylveſtris, bleichgelbe nidrige frühe Schlüſſel-Blumen. f. 1.
1 Primula Veris hortenſis flore gemino, doppeld ineinander wachſende Schlüſſel-Blumen. f. 5.
2 Pſeudo Narciſſus Montanus, weiß Berg Joſeph-Stab. f. 2.
2 Pſeudo Narciſſus, weiſſer Joſeph-Stab / mit einem gelben Kelch. f. 2.
2 Palma Chriſti flore purpureo, Händlein-Wurtz. f. 9.
2 Palma Chriſti maculata. f. 16.
3 Pſeudo Narciſſus Juncifolius, wild falſch Berg-Pintzen / blätterticht Narciſſen-Röſlein mit groſſen überlengten Kelch. f. 4.
3 Pſeudo Narciſſus minor luteus repens, kleiner und nidriger Joſeph-Stab. f. 5.
3 Pſeudo Narciſſus pallidus calice amplo, groß frembd gelber Narciß mit einem weiten Kelch. f. 6.
3 Pſeudo Narciſſus ſimplex Belga, der Nider-Länder groß gelber Joſeph-Stab. f. 6.
3 Pſeudo Narciſſus aureus præcox, gantz hoch-gelber geflamter Joſeph-Stab. f. 6.
3 Pſeudo Narciſſus luteus, gelb Joſeph-Stab / oder Hornungs-Blum. f. 7.
3 Pſeudo Narciſſus minimus Juncifolius aureus, kleiner Bintzen blätterichter gelber Joſeph-Stab. f. 13.
5 Palma Chriſti, Handlein-Wurtz / Creutz-Blumen leibfarb. f. 11.
5 Palma Chriſti, Händlein-Wurtz mit weiſen Blumen. f. 11.
5 Polygonatum vulgatius, groß Weiß-Wurtz. f. 13.
5 Polygo majus. f. 13.
6 Pæonia flore pleno incarnato, leibfarbe gefüllte Gicht-Roſen. f. 7.
6 Pæonia polyanthos flore rubro, rothe gefülte Pänonien-Roſen / oder Gicht-Roſen. f. 8.
6 Pæonia mas flore purpureo, Purpur-roth einfache Gicht-Roſen. f. 10.
6 Pæonia mas major flore incarnato, die gröſte leibfarbige Gicht-Roſen. f. 11.
6 Polygalon flore rubro purpuraſcente, rothe Creutz-Blumen. f. 11.
6 Polygalon flore cæruleo, blaue Creutz-Blumen. f. 11.
6 Pæonia mas flore incarnato, Leibfarbe Peonien / das Männlein. f. 12.
6 Pyrola minima, kleine wolriechende Waltmangolt. f. 12.
6 Pſeudochamæ Buxus, falſcher kleiner wilder Buxbaum. f. 12.
6 Pæonia mas flore albo, einfache weiſſe Gicht-Roſen. f. 13.
6 Pæonia Bizanthina major, Bizantiniſche Peonien-Roſen. f. 14.
6 Pæonia Bizanthina minor, kleine Bizantiniſche Päonien-Roſen. f. 14.
6 Pæonia Pumilis, Päonia ſo die kleiniſte iſt / derohalben das Zwerglein genannt. f. 14.
6 Pæonia rubra flore ſimplici, rothe einfache Päonien-Roſen. f. 15.
7 Phalangium Ramoſum, weiß Widerthon / oder Erden-Spinnen-Kraut. f. 1.
7 Primula veris anguſtifolia rubra, kleine ſchmal-blätterichte rothe Schlüſſel-Blümlein. f. 4.
7 Prim: veris anguſtifolia alba, weiſe ſchmal-blätterichte kleine Schlüſſel-Blümlein. f. 4.
7 Pentaphillon flore albo, Fünff-Finger-Kraut mit weiſſen Blumen. f. 6.
8 Pſeudo Iris Paluſtris, gelbe Waſſer-Schwertl / oder Drachen-Wurtz. f. 7.
9 Primula veris anglicana flore pleno, gefüllte Engliſche Schlüſſel-Blumen. f. 3.
9 Periclymenon perfoliatum, welſch Geiß-Blatten / Speck-Lilien. f. 4.
9 Periclymenon germanicum, teutſch gemein Speck-Lilgen / Je länger / je lieber. f. 4.
9 Phalangium Alobrogicum majus, frembd Spinnen-Kraut / oder weiſſer Widerthon. f. 6.


## R.


O Ruſcus, Meußdorn. f. 2.
O Rapunculus Sylveſtris major, wilde Rapuntzeln mit Purpur-weiſſen Blumen. f. 5.
O Ribes minor fructu rubro, kleine rothe Johannes Träublein / ſo ſüßlecht ſeyn. f. 14.
O Ribes rubra vulgaris, gemein rothe Johannes Beerlein. f. 14.
O Ribes fructu nigro, ſchwartze Gicht-Beer / oder Johannes-Träublein. f. 14.
O Ribes fructu rubro major, , groß rothe frembde Johannes Träublein. f. 14.
O Ribes fructu albo, weiß Johannes Träublein. f. 14.
1 Ranunculus ſylvarum flore albo ex pleno, weiß gefüllte Waldhenlein. f. 2.
1 Ranunculus nemoroſus flore pleno, gefüllte weiſſe Waldhenlein. f. 3.
1 Ranunculus nemoroſus flore luteo, gelbe Waldhenlein. f. 3.
1 Ranunculus albus flore pleno, weiß gefüllter Hahnenfuß. f. 12.
1 Ranunculus flore globoſo, Alpen-Hahnenfuß. f. 12.
1 Ranunculus bulboſus major, gelb gefüllter Hahnenfuß. f. 12.
1 Ranunculus Jllyricns, Jllyriſcher Hahnenfuß. f. 13.
1 Ranunculus hortenſis flore pleno, gefüllter gelber Hahnenfuß. f. 13.
1 Ranunculus hotenſis, aufrecht ſtehender Garten-Hahnenfuß. f. 14.
1 Ranunculus montanus major flore luteo, groſſer Berg-Hahnenfuß mit gelben Blumen. f. 14.
1 Ranunculus erectus minimus, gemeiner / einfacher / ſüſſer / gelber Acker-Hahnenfuß. f. 14.
1 Ranunculus Aſſiaticus, Aßiatiſcher Hahnenfuß. f. 15.
1 Ranunculus Aſſiaticus, Aßiatiſcher Hahnenfuß mit länglichten Wurtzeln. f. 15.
1 Ranunculus Greticus, Aßiatiſcher Hahnenfuß mit Schneeweiſſen Blumen. f. 15.
1 Ranunculus Aſſiaticus, Aßiatiſcher Hahnenfuß mit rotheu einfachen Blumen. f. 15.
1 Ranunculus Aſſiaticus, Aßiatiſcher Hahnen-Fuß / mit bleichgelben Blumen / hin-und wieder underſchieden. f. 15.
6 Roſa Damaſcena flore pleno, gefüllt Biſem / oder Muſchcaten / auch Damaſcener-Röſlein. f. 1.
6 Roſa Centifolia rubra, groſſe Holändiſche hundert-blätterichte Roſen. f. 2.
6 Roſa præneſtina variegata, geſprengte rothe / oder leibfarbe Roſen. f. 2.
6 Roſa provincialis flore incarnato pleno, leibfarbe Provintz-auch Ulmer-Roſen mit gefüllten Blumen. f. 2.
6 Roſa lutea maxima flore pleno, groß doppelte / oder gefüllte Roſen. f. 2.
6 Roſa flore albo pleno, weiß gefüllte Roſen. f. 3.
6 Roſa alba flore ſimplici, weiſſe einfache Roſen. f. 3.
6 Roſa mileſia flore rubro pleno, doppelt gefüllte geſambte Roſen. f. 3.
6 Roſa Provincialis flore albo, weiß Provintz-Roſen. f. 3.
6 Roſa ex rubro nigrans flore pleno, gefüllte Kohl-Roſen. f. 4.
6 Roſa lactea Camerarij, weiß Preßlauer-Röſlein. f. 4.
6 Roſa rubicunda ſacchacrina dicta, Zucker-Röſlein. f. 3.
6 Roſa Damaſcena flore ſimplici, einfache Damaſcener-Röſlein. f. 4.
6 Roſa lutea flore ſimplici, einfache gelbe Roſen. f. 5.
6 Roſa Cinnamomea, doppelte rothe Zimmet-Roſen. f. 5.
6 Roſa præcox ſpinoſa flore albo, weiß frühe Röſlein. f. 5.
6 Roſa ſylveſtris odorata incarnato flore, wol riechende Dorn-Röſlein. f. 6.
6 Roſa ſylveſtris flore rubro, rothe Feld-oder Hecken-Roſen. f. 6.
6 Roſa Mileſia, rothe einfache gefeine Roſen. f. 6.
6 Roſa Eglenteria, frembde Pimpernellen-Roſen. f. 6.


## S.


O Syringa flore cæruleo, Spaniſcher Springs-Baum. f. 1.
O Syringa flore lacteo, Aſchenfarber Spaniſcher Springs-Baum. f. 1.
O Syringa Italica flore albo pleno, blaue Doſten / weiſſer Springs-Baum. mit vollen Blumen. f. 2.
O Syringa flore albo ſimplici, Springs-Baum mit weiſſen einfachen Blumen. f. 2.
O Summitates piceæ, Fichten / rothe Thannen-Blühe. f. 4.
O Staphylodendron, Pimper-Nüßlein. f. 8.
O Sambucus Roſea, gefüllte Schwelcken / oder Schnee-Ballen. f. 10.
1 Squammata ſeu Dentaria major, ein Schuppen-Wurtz ohne Blat. f. 1.
2 Scilla alba, weiß Meer-Zwiffel. f. 3.
5 Scapus cum Bulbo, roth groß goldfarbe Lilien. f. 6.
5 Scapus cum radice. f. 6.
5 Sultan Zambach Martagon Conſtantinopolitanum flore albo, weiß wolriechende Türckiſche Käyſer-Lilien. f. 10.
5 Scabioſa ſylveſtris cærulea, wild Apoſtem-Kraut. f. 12.
6 Sedum minus flore rubente, kleine Haußwurtz mit rothlechten Blumen. f. 8.
6 Sanicula, Sanickel. f. 10.
7 Sparganium, Jgels-Knoſpen. f. 2.
8 Spatula fætida, Wand-Läuß-Kraut. f. 8.
8 Scordium. Lachen-Knoblauch / oder Waſſerbathengel. f. 9.
9 Salvia agreſtis flore purpureo, wilden Salvey mit ſattbraunen Blumen. f. 2.
9 Salvia agreſtis flore albo, wilde Salvey mit weiſſen Blumen. f. 2.
9 Sanicula montana altera, wild Schel-Kraut. f. 3.

## T.


O Trifolium arboreſcens, rund-blätterichter Baum-Klehe. f.10.
1 Thalictrum flore incarnato, Wehl-Saamen. f.11.
1 Thalictrum flore albo. f.11.
2 Tulipa Præcox flor. rub. f.7.
2 Tulipa præcox flore albo. f.7.
3 Tulipa viridis coloris, Tulipa gantz grün. f.10.
4 Tulipa lutea virgulis oblongi ad latera colore cinnabaris, gelb Tulipan mit grünen Streiff/ und hoch-rothen Seiten Streimen. f.1.
4 Tulipa alba circa calicem luteum radio rubente, gantz weiß mit gelben Boden/ und umb denſelben ein Roſin-rothen Circul. f.1.
4 Tulipa lutea irrorata ex cinnabari rutilis maculis, gelb mit Feuer rothen geſprengt. f.1.
4 Tulipa candida virgulis ex purpura rubeſcentibus, gantz weiß mit Roſin-rothen vermengten und gemiſchten/ auch zertheilten Blättern. f.1.
4 Tulipa lutea in medio conformi macula rubens, gelb mit Einnober-rothen getheilten Blättern. f.1.
4 Tulipa albicans margine coccineo, weiſſe Tulipan/ mit Roſinfarben Enden und gelben Streiffen. f.2.
4 Tulipa floride pallens oris coccineis, Liecht-gelbe/ und weiſe Tulipan mit Roſenfarben Enden und Streiffen. f.2.
4 Tulipa ex albo marginibus rubeſcens, Tulipa weiß mit gelben Enden/ vornher mit Einnober-rothen und Roſinfarben Streiffen. f.2.
4 Tulipa ex flavo rubeſcens, gelbe Roſinfurbe in einander vermengt mit einem gelben Boden.
4 Tulipa lutea ex rubro viridi coccineo variegata, gantz gelbe Tulipan/ die drey mitlere Blätter Einnober-roth geſprengt/ die andere Roſin-roth/ und grün geſtreimbt.
4 Tulipa lutea maculis aſperſa minutis, Tulipan gantz gelb mit Einnober-rothen Streimen/ und ſchwartzen Boden. f.3.
4 Tulipa candida lineis viridibus, Tulipan gantz weiß/ in der Mitte deß Blats grüne Strich. f.3.
4 Tulipa lutea margine roſeo, gelbe Tulipan mit Roſin-rothen Enden. f.3.
4 Tulipa miniata linea viridi, Tulipan Roſinfarb in roth geſprengt außwendig mit grünen und weiſen Streimen. f.3.
4 Tulipa coccinea albeſcentibus oris, Tulipan/ Roſin-roth mit weiſſen Enden/ und gelben Boden. f.4.
4 Tulipa lutea lituris aureis, gantz gelbe Tulipan mit goldt-farben Streimen. f.4.
4 Tulipa albicans maculis latis rubentibus, Tulipan Kirſchenfarb mit weiſen Enden/ und gelben Boden. f.4.
4 Tulipa diverſi coloris alba linea rubente calice citrini coloris, Tulipan mit rothen Strichen/ auch einen gelben Boden/ under umb den Boden einen blauen Stern. f.4.
4 Tulipa exſplicata florum candidorum linearum rubearum, Tulipan gantz weiß/ mit hoch-rothen breiten Streimen/ und gelben Boden. f.4.
4 Tulipa ex luteo citrini coloris florum lineis dorſalibus viridibus, gelbe Tulipan mit grünen Streimen. f.4.
4 Tulipa lutea maculis rubens, Tulipan hoch-gelb mit rothen Streimen. f.5.
4 Tulipa aurei coloris, Tulipan ſchön gold-farb. f.5.
4 Tulipa lutea prope calicem radio rubro, Tulipan mit gelben Boden/ und Einober-rothen Streimen. f.5.
4 Tulipa parte media viridibus ſignaturis altera vero rubra, Tulipan Roſinroth auch Einober-roth mit grünen Streimen. f.5.
4 Tulipa ex purpura roſea perſica, Tulipa gantz lieblich Roſinroth. f.5.
4 Tulipa ex albo ruffa margine rubente, Tulipan weiß-roth mit hoch-rothen Enden. f.6.
4 Tulipa ſulphurei coloris oris rubeis, Tulipan ſchweffel-farb mit Roſin-rothen Enden/ und grünen Streimen. f.6.
4 Tulipa lutea lituris miniatis, Tulipan hoch-gelb mit hoch-rothen Enden. f.6.
4 Tulipa fulvo ſulphurei coloris margine amplius rubente, Tulipan/ ſchweffel gelb mit breit-rothen Enden. f.6.
4 Tulipa argentei, & albicantis coloris, mit drey ſilberfarben Blättern/ und drey leibfarben ſchillerten. f.6.
4 Tulipa nivei coloris oris rubeo purpuraſcens, Tulipan hoch-weiß mit roth-Purpurfarben Enden. f.7.
4 Tulipa floribus reflexis inferius miniatis exterius herbaceis, Tulipan vermiſcht mit Zinober-roth/ und gelb/ und auf den Enden goldt farb. f.7.
4 Tulipa floribus ex ſulphure colore palleſcentibus lituris, bleichgelbe Tulipan mit Roſin-rothen Feuer-Streimen. f.7.
4 Tulipa ex pallido tota vireſcens, Tulipan gantz gelb-grün. f.7.
4 Tulipa purpurea calice palleſcente, Tulipan Purpurfarb mit gelben Boden. f.7.
4 Tulipa lutea miniate punctata, Tulipan weiß mit gelben Boden und braunen Streimen. f.8.
4 Tulipa alba unguibus luteis, Tulipan weiß mit gelben Boden und braunen Streimen. f.8.
4 Tulipa alba maculis roſeis, Tulipan weiß mit Roſen-rothen Flecken und liecht-gelben Boden. f.8.
4 Tulipa Roſea venis luteis, Tulipan Roſinfarb mit gelben Streimen/ und gelben Boden. f.8.
4 Tulipa ſumme miniata calice luteo, Tulipan Einober-roth mit gelben Boden. f.8.
4 Tulipa miniata pleno flore, Tulipan mit gefüllten Blumen. f.9.
4 Tulipa nivea oris purpuraſcente, ſchnee-weiſſe Tulipan mit Roſinfarben Enden. f.9.
4 Tulipa flore pleno tota lutea, gelbe gefüllte Tulipan. f.9.
4 Tulipa ſerotina polyanthos, Roſin-roth von vilen Blumen Tulipan. f.10.
4 Tulipa globoſa ſerotina cinabrio colore, Tulipan von hoch Einober-rothen Farben/ und ſchwartzen Boden. f.11.
4 Tulipa globoſa ſerotina aureo colore punctata, goldtfarb ſpater Tulipan/ hoch-roth geſprengt. f.11.
4 Tulipa polyanthos præcox Roſea colore mixta, viler argent Roſin-roth Tulipan mit gelben Strichen. f.12.
4 Tulipa perſica aperta, offne nnd zugethane Perſianiſche Tulipan. f.12.
4 Tulipa ſerotina ſtellata, Stern-Tulipan. f.13.
4 Trifolium acetoſum flore albo, Sauer-Klee/ oder Buch-Klee. f.1.
4 Trifolū acetoſum flore flavo, Mäler-Kraut/ oder Saur-Klee mit gelben Blumen. f.1.
4 Trifolium Paluſtre, Waſſer-auch/ Biber-Klee. f.13.
4 Teſticulus Vulpinus, groſſe Fuchs-Hödlein/ oder Fliegen-Blumen. f.6.
4 Thyrſus Aſparagi, Spargen-Kolben. f.9.


## U.


O Unifolium, Ein Blat. f.3.
1 Viola Martia flore rubro, braun gefüllter Mertzen-Viol. f.4.
1 Viola Martia albo flore, multiplici albo, weiſſer gefüllter Mertzen-Viol. f.4.
1 Viola matronalis flore purpureo, brauner einfacher Mertzen-Viol. f.4.
1 Viola Martia flore albo, weiſſer einfacher Mertzen-Viol. f.4.
1 Viola Martia purpurea multiplici flore, einfacher Roſin-rother Mertzen-Viol. f.4.
2 Viola flamea major viol. col. mixto, groß welſch wol riechend frey Scham-Kraut. f.16.
2 Viola flamea major pallido col. mixta, groß welſch wol-riechende Blumen. f.16.
4 Victorialis longa, Alpen-Knoblauch/ oder Sigwurtz das Männlein. f.13.
5 Viola erecta flore cæruleo, hoch-aufrechter blauer Mertzen-Veil. f.5.
5 Viola erecta flore albo, hoch aufrechter weiſſer Mertzen-Veil. f.5.
5 Veronica recta cærulea, blauer aufrechter Ehren-Preiß. f.10.
7 Viola Martia canina, wilde Hunds-Veil. f.5.
8 Viola matronalis flore albo, Winter-Violen mit weiſſen Blumen. f.3.
8 Viola matronalis flore purpureo, Winter-Violen mit braunen Blumen. f.3.


## X.


8 Xyloſteon alterum Dodonei, ein Bain-Höltzlein. f.9.
8 Xyloſtium floribus albis, gemein Bain-Höltzlein mit weiſſen Blumen. f.9.


**Ende deß Frühling Theils.**

ORDO

# COLLECTARUM ARBORUM ET FRUTICUM

ÆSTIVALIUM.



Prunella[II] Officinarum. Arbor[I] Uitæ. Chamæpitis[III] Maior.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

ARbor Vitæ Bellonij, Dodon. & Herbarior. Thuja & Thya Theophraſti. Camer. An Bruta Plinij. Caudice aſſurgit ſupra bicubitalem altitudinem, ex pallido rubore nigricante, rami inde alarum modo porriguntur, rursùs in alios ſquamatos compreſſos diviſi, qui gravem odorem reſinaceum, uti & tota arbor, continent, & parvulis ſquamarum bullis per longitudinem notantur: flores puſilli è ſquamis cohærentibus oriuntur, in pallidâ flavedine obſcurum ruborem exhibentes, Sabinæ æmuli; poſtmodùm in exiguos fructus, obſoletum ferrugineum colorem affectantes, maturitate ſquamatim dehiſcentes, & paleacea ſubrufa ſemina ſpargentes, abeunt.

| | |
|---|---|
| Deſcribitur à Dodon. 846. | Hort. Med. Cam. 168. & 169. fol. |
| Cluſ. 36. fol. lib. 1. | Matth. Caſp. Bauh. 125. fol. |
| Lobel. Obſ. 630. Adv. 448. | Germanicè, Baum deß Lebens. |
| Lugdunenſ. 60. Thuja, tertij generis nomine. | Tabern. 649. lib. 3. |
| | Durant. 84. |

### II

PRunella aut potius Brunella officinarum, cujus uſus comendatur maximè in febri cauſticâ, quam Germani die Breune dicunt. Dodrantales & quadrangulares illi caules ſunt, parùm villoſi, per intervalla quaſi geniculati: è ſingulis nodis contrario ſitu bina emittuntur folia, tàm ſupernè quàm infernè parùm villoſa, guſtus aſtringentis, Origani ferè æmula, ſed magis acuminata: flores ſumis cauliculis ſe exhibent, in parvâ ſpicâ foliaceâ, galeati, ſaturatè purpurei, nonnunquam cineracei & albi coloris, quibus poſtmodùm minuta pallidiuſcula ſemina ſuccedunt.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon: 136. | Hort. Med. 131. | Fuchſ. 238. cap. |
| Cœſalpin. cap. 37. lib. 11. fol. 453. | Matth. C. Bauh. 684. | Tabern. 256. |
| Lobel. Obſ. 251. Adv. 198. | Phytopin. 501. | Matth. Cam. 328. |
| Lugdunenſ. 1310. | Germanicè, Braunellen. | Durant. 266. |
| Epit. Cam. 703. | Trag. 118. | |

### III

CHamæpitys major tertia Dioſcorid. Ajuga & Iva Arthritica Officin: à Dodon. & Lobel. deſcripta. Radix lignoſa, fibroſa, duriuſcula eſt, cauliculi hinc prodeunt multi, folijs oblongis, virentibus, Pſyllij ſupini fere, anguſtis, tripartitim fiſſis, odore reſinaceo Pinum redolentibus, veſtiti: ad ſingulos foliorum exortus calices parvi herbacei oriuntur, è quibus hiantibus erumpunt floſculi, melini Galeopſidis propè figurâ: ſequuntur ſemina, in ſingulis vaſculis terna, quaterna, parva, oblongiuſcula, pallida.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. fol. 28. | Hort. Med. 40. fol. | Fuchſ. 341. cap. |
| Lobel. Obſ. 207. Adv. 164. | Matth. C. Bauh. 670. fol. | Tabern. 102. lib. 2. |
| Lugdunenſ. 1159. | Phytopin. Bauh. 477. (Schlagkräutlein. | Cam. Matth. Germ. 319. |
| Epit. Matth. Cam. 679. | German. Je länger/je lieber/Erdpin/Erdkiffer/ | Durant. 229. |



I
Pſeudoſycomorus.

III
*Millefolium flo: albo.*

II
*Millefolium flo: rubr.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

PSeudoſycomorus Tabern. Zizyphus candida & Sycomorus Italorum Azadrach Avicennæ. Siliqua Bellonij. Tuber Cœſalpin. Zenzelacht Rauvolffij. Arbor ſancta Monſpelienſium. Lotus alba Pellicerij. Procerè aſſurgit, caudice foris lividi coloris, per ætatem ſcabro: folia, in longis & multipartitim diffuſis pediculis, Fraxini, ſeu Cicutæ, aut Barbæ caprinæ foliorum ſitum affectant, acuminata, & profundè circumſerrata, trifida, ſaturatæ viriditatis: flores, racematim virgulis dependentes, è quinis oblongis & ſubtùs purpuraſcentibus, ſuperiùs verò albeſcentibus anguſtis ſtellatis folijs, & meditullij calice ſaturati ruboris, per ætatem nigreſcentis exerto, conflantur; quibus pereuntibus oritur fructus, Sorborum ferè magnitudine, oblongiuſculus, poſt virorem pallidus, fungoſâ pulpâ tegens oſſiculum hexagonum, anguloſum, quod oblonga nigricantia ſemina, aliquot cellulis diſtincta, complectitur.

Dodon. 835. & 836. fol.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 23. fol. 107.
Cluſ. fol. 30.
Lobel. Obſ. 546. Adv. 416.
Lugdunenſ. 358.
Cam. Epit. Matth. 18. fol.

Hort. Med. 25.
C. Bauh. Matth. 232. & 233. (Maulbeer-Baum.
Germanicè, Weis Bruſt-Beerlein/oder wilder
Tabern. 682. fol. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 103.
Durant. 383.

### II

MIllefolium flore rubro. Folijs Millefolio vulgari vegetioribus prodit, quod etiam florum formâ hilari rubore conſpicuorum æmulatur, atque ob id receptum in hortos cultiores meruit.

Cluſ. 331. fol.
Vide etiam ſequentes autores quoſdam.

German: Roth Garben/oder Schaaf-Garben
Tabern. 463. lib. 1. (mit rothen Blumen.

### III

MIllefolium flore albo. Radix, densè tenuitérque fibrata, aliquot caules cubito altiores erigit ſtriatos, in quibus oblonga coſta è lateribus frequentes proceſſus foliatos, tenuiter pinnatos, aut diſſectos, emittit, Tanaceti more magis fiſſos: in ſumis brachiorum adnatis, faſtigiatim quaſi in umbellas ramoſas coacervatos floſculos, ſtamina puſilla pallida exiguis aliquot albidis folijs circumdantes, videas, odore non ingrato, licet infirmo, ſub quibus remanent ſemina, Agerati vel Achilleæ æmula, minuta, numeroſa, cinerei coloris.

Dodon. 100.
Cœſalpin. lib. 12. cap. 11. fol. 482.
Lobel. Obſ. 430. Adv. 333.
Lugdunenſ. 769.
Cam. Epit. Matth. 876.
Hort. Med. 101.
C. Bauh. Matth. 789. & 799.

Phytopin. Bauh. 239.
German: Schaaf-Garben mit weiſen Blumen.
Trag. 160. cap. lib. 1.
Fuchſ. 278. cap.
Tabern. 468. lib. 1.
Cam. Matth. Germ. 401. fol.
Durant. 605. & 606.



II. Spartium Hiſpanicum. I. Cupreſſus arbor.

Ordo, Fol. 3.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

CUpreſſus arbor, caudice eſt longo, ut & ramis ſurrectis, qui nullâ ſerie ſursùm ſpectantes inde panduntur, coni figuram quaſi affectantes: folia Sabinæ bacciferæ ſunt, aut Tamariſci, oblonga, & carnoſiora, æquè tamen viridia: coni, qui pilulæ dicuntur ac officinis nuces, primùm pallidè vireſcunt, poſtmodùm obſoletum nigrorem affectant, Larginis non diſſimiles, per maturitatem fatiſcendo ſemina effundentes parva, inæqualia, & turgidula.

Dodon. 844. fol.
Cœſalpin. cap. 55. lib. 3. fol. 134.
Lobel. Obſ. 628. Adv. 446.
Lugdunenſ. 58.
Epit. Cam. 52.
Hort. Cam. 51.
Matth. Bauh. 116.
Germanicè, Cypreſſen-Baum.
Tabern. 646. fol. lib. 3.
Matth. Cam. Germ. 30.
C. Durant. 301.

### II

SPartium Hiſpanicum, quod Spartium Dioſcoridis eruditis cenſetur. Geniſta Italica Dodon. Geniſta Tranſalpina ſive Hiſpanica arboreſcens Camerar. Stipite pollet lignoſo, qui quàm plurimos emittit ramulos, ſeu virgas, virentes, junceas, lentas, & inſtar viminis obſequioſas, teretes, obſeſſas folijs raris, Lino proximis, obſcurè viridibus, inæqualiter poſitis, uti & flores in ſummitatibus ramorum ſpicatim digeſti, odorati, Geniſtâ ampliores, lutei: his ſubnaſcuntur ſiliquæ oblongæ, compreſſæ, nigricantes, condentes ſemina ſubrufa, lentis propè magnitudine.

Dodon. 749. fol.
Cœſalpin. Geniſtæ alterius junco rotundo titulo, capit. de Geniſtâ vulgari lib. & fol. eod. lib. 3. cap. 35. fol. 115.
Cluſ. fol. 102. lib. 1.
Lobel. Obſ. 533. fol.
Lugdunenſ. 168.
Matth. Epit. Cam. 149.
Hort. Med. 65.
Matth. C. Bauh. 852.
Paul. Renealm. Spartij titulo, fol. 35.
Germ: Wol-rüchende Spanniſche Pfriemen-Stauden/ auch Spanniſche Khun-Schrotten.
Tabern. 806. lib. 3.
Matth. Cam. 440.



II Ocimum Indicum viride maius folijs protuberanti,, bus.

I Nerium seu Rhododendron flore albo

III Ocimum minus angustifolium flore albo

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

NErium ſeu Rhododendrum flore albo. Rhododaphne ſeu Laurus roſea. Humanam ſtaturam æquat altitudine, ſtipite lævi, foris cinerei aliquantùm coloris, vel obſcurè virentis, amicto folijs frequentibus, Amygdalinis folijs longioribus, ſeu Lyſimachiæ Chamænerion dictæ latifolio proximis, craſſioribus, durioribus, viridioribus, acuminatis. In ſummitate rami ſurrecti flores ferunt calicibus parvis, ſupernè laciniatis, ſuffulti, qui ſinuatim evolvuntur in quina folia alba, ſenſim latiora, & totidem ſecundum oras laciniata alia brevia umbillicotenus foventia, roſarum penè ſimplicium ſpecioſâ figurâ: ſequuntur ſemina in ſiliquis duplicatis, digitum longis, Apocyni ritu aut Vincetoxici, obſoletè rufis palleſcentibus, floccis concolloribus obſeſſa, ventis facilè diſpergenda: radix prolixa eſt, ferè ſingularis.

Autores vide in ſequenti ſpecie,

præter { Lobel. Obſ. 199.<br>Lugdunenſ. 246.

Germanicè, Oleander mit weiſen Blumen.

Tabern. 757.

### II

OCimum Indicum viride majus, folijs protuberantibus. Ab Ocimi Indici maculoſi congeneri ſpecie, ſuperficie foliorum criſpatâ, protuberantiâ inæqualiter turgente, & quaſi bullatâ, unice differt.

Germanicè, Indianiſche Baſilien mit grün gebückelten Blättern.

### III

OCimum minus anguſtifolium, flore albo. Folijs, Clinopodio minori non multùm abſimilibus, ambitu ſerratis, & flore albo habitúque humiliore ab aliorum Ocimorum familiâ ſaltem diſcernendum eſt.

Germanicè, Klein ſchmal-blätterichte Baſilien / mit weiſen Blumen.



I. Nerion flore rubro. *Fructus* II. *Nerij.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

I

NEriom ſeu Rhododendron flore rubro. Vulgatioris roſei coloris facie tantùm flores diſcrepant, alioquin Nerio priori, quod flore albo placet, per omnia ſimile eſt. Siliquæ ſeminum ſuperiùs deſcriptæ appictæ fuerunt, ut illorum forma magis oculis objecta foret.

Autores plurimi illius mentionem fecerunt, ut

Dodon. 839. fol.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 41. fol. 119.
Lobel. Obſ. 198. Adv. 154.
Lugdunenſ. 245.
Cam. Epit. Matth. 843.
Hort. Med. 107.
Matth. C. Bauh. 775.

Germanicè, Oleander mit rothen Blumen / Unholden-Kraut.

Trag. 142. cap. lib. ſecundo.
Fuchſ. 205. cap.
Tabern. 757.
C. Matth. Germ. 388.
Durant. 642.



I
Poma Aurantia nana dicta.

II.
*Mala Medica seu Citria.*

III.
*Poma Aurantia.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

I

POma Arantia, Nana dicta, ſeu Pumiliones. Tantùm humili ſtipite, minoribus & anguſtioribus folijs numeroſioribúſque, ut & largiore ac liberaliore florum & fructuum fœtu, à vulgari diſcernenda ſunt, Pumilionum nomine à Cluſio indigitata; qui ſolus eorum meminit.

Vid. Cluſ. fol. 6. | Germanicè, Kleine Vil-tragende Zwerg-Pomerantzen.

II

MAla Medica, ſeu Citria, vulgò ſic dicta, cum potius Limonia mala dicenda forent, omnibúſque doctioribus Herbarijs hoc titulo inſigniantur. Ramis multis, firmis aculeis armatis, folijs Lauro latifolio proximis, & parùm circumſerratis, benè ſuavitérque odoratis, ac crebris foraminibus ſcatentibus, viridibus, conſtat: flores Arantij mali florum ſpeciem affectant, foris purpuraſcentes, intùs albidi; quibus ſubnaſcuntur poma oblonga, Citrijs malis minora, ſed inæquali corticis tuberoſi ſpecie & colore ſubflaveſcente non multùm abſimilia, illíſque tenuiore odoratâ albidâ carne diſtinctam pulpam pellucidam, acidiſſimam, in qua aliquot ſemina malis Arantijs conformia latent, ambientia.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 779. | Lugdunenſ. 301. fol. | Tabern. 660. lib. tertio. |
| Cœſalp. lib. 3. cap. 59. f. 140. | Cam. Epit. Matth. 149. | Matth. Cam. Germ. 180. f. |
| Cluſ. 6. fol. | C. Bauh. Matth. 206. | Durant. 563. fol. |
| Lobel. 573. | Germanicè, Gemeine Citronen / oder vilmehr Limonien. | |

III

POma Arantia, ab Arantio Achajæ oppido, vel ab Araniâ gente Perſicâ, ſed Aurantia, quæ Virgilio aurea mala dicuntur: Galeno Ceſtiana mala & Sueton. Martiana mala recentioribus habita &c. arbor Laurum latifoliam altitudine æquat, aut quandoque ſuperat, cujus etiam folia æmula fert, ſed ampliora, & appendice ſecundum pediculi initium notata, perpetuò virentia, ut prioris Limoniæ mali folia, firma, & foraminibus undiquaque pertuſa, aromatici odoris: rami virore virentia ſubalbicant, frequentes, obſequioſi, aculeis aliquot robuſtis armati, quod potiſſimùm in ſylveſtri genere obſervandum. Summitates occupant flores odoratiſſimi, quinis carnoſis candicantibus perforatis folijs ſtamina exigua plurima, firmum medium piſtillum exertum cingentia, obſidentes: fructus, floribus ſubnaſcentes, rotundi, mali mediocris magnitudinem obtinet, rugoſo craſſo cortice, per maturitatem aurei intenſi coloris, intus pulpâ luteâ ſuccum in quibuſdam dulcem, modò acidam, vel vinoſi ſaporis, tunicis albis continentes, foventéſque ſemina anguloſa, albeſcentia, Limonijs malis conformia.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 780. | Lugdunenſ. 302. | Germanicè, Pomerantzen. |
| Cœſalpin. lib. 3. c. 59. fol. 140. | Cam. Epit. Matth. 150. | Tabern. 662. |
| Cluſ. 7. fol. | Hort. Med. Matth. 24. | Cam. Matth. Germ. 80. |
| Lobel. 573. Obſ. | C. Bauh. Matth. 206. | Durant. 787. |



I.
Malus punica flore simplici.

II.
Plantago Roſea

III.
Plantago Roſea sp

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

MAlum Punicum vel Granatum fructiferum. Arbor ad trium ulnarum aſſurgens altitudinem, folijs ſaturatæ viriditatis cum nitore, ramuſculis rubentibus ſpinoſis, floribus phœnicei coloris, qui, ubi dilatati fuerint, ad coccineum inclinant, cum capillamentis in medio exiſtentibus flavioribus. Menſe Julio florebat, fructus Septembri ferebat, qui in hiſce regionibus raró ad maturitatem veniunt, aliàs ferè trivialis noticiæ, à Cœſalpino benè deſcriptus.

Dodon. 781. fol.
Cœſalp. lib. 3. cap. 60. fol. 141.
Lobel. Obſ. fol. 563.
  Adv. 419.
Lugdunenſ. fol. 130.
Epit. Matth. Cam. 130. fol.
Hort. Med. Cam. 95.
Matth. C. Bauh. 193.
Germanicè, Einfache Granat-Blumen.
Tabern. 737. lib. tertio.
Matth. Cam. Germ. 77.
Durant. 565.

### II

PLantago roſea latifolia. Vulgatioris Plantaginis (quæ maxima ſinuata C. Bauh. dicitur) folia carnoſiora obtinet, & nulli non cognita, nuſquàm non gentium obvia eſt, quam etiam ſeminibus, in ſingulis conceptaculis multipliciter congeſtis, puſillis, & radice albicante, multùm fibroſâ, æmulatur: floris eminentem locum folia herbacea innumera, Roſarum ritu in denſum orbem ſtipata, & conglomerata, exornant, miro oculorum ſpectaculo.

Lobel. Adv. 128.
Lugdunenſ. 1256.
Epit. Cam. Matth. ſecundum iconem appoſitam 261.
Hort. Med. Cam. 128.
Matth. C. Bauh. 375.
Germanicè, Roſen-Wegerich.
Tabern. Plantaginis multiplicis nomine, fol. 403. lib. 2.
Matth. Cam. Germ. 145.
Durant. 767. quo ad iconem.

### III

PLantago roſea, ſpicata dicta, ob ſpicam ex flore, Roſam æmulante, turritim enatam, cum ſuperiore Plantagine ejuſdem coloris, à qua nec ſpecie, ſed hac tantùm formâ, etiam ſimul in unâ eadémque plantâ obſervandâ, differt.

Germanicè, Geſpitzter Roſen-Wegrich.



I.
Balaustia.

II.
Prunus Myrobalanus rotundus.

III.
Mala Armeniaca.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

BAlauſtium. Figurâ & appellatione illâ, ſylveſtris Mali Punicæ flores exhibemus, nihil nobis obſtante Plinio, qui Cytinos ſativæ flores denotantes cum ſylveſtribus confundit. Ramis multis purpuraſcentibus conſtat, folijs Chamæceraſi ſeu Myrti latifoliæ folijs majoribus, & nitidi viroris, ſativam æmulantibus, tantùm quòd flores ex calice oblongo, carnoſo, ac anteriore parte latiore ac diſſecto, erumpentes, multiplici foliorum cinnabarini coccinei, aut verè punicei coloris, ſerie etiam Roſas centifolias pulchritudine ſpecioſâ antecellant. Plantæ, ab Italicis ramis depactis enatæ, pulchritudine, altitudine matrem ſuperare videntur.

Dodon. 787. fol.
Lobel. Obſ. 563. Adv. 319.
Lugdunenſ. fol. 304.
Matth. Epit. Cam. 130.
Matth. C. Bauh. 193.

Germanicè, Wild Granat-Baum mit vollen Blumen.
Tabern. 737. lib. tertio.
Matth. Camer. 77.
Durant. 565.

### II

PRuna Myrobalana dicta. Arborem, quæ Biturigibus Gallorum Myrobalanorum Chepulorum nomine oſtenſa fuit, huic noſtræ admodùm ſimilem fuiſſe, Cl. Cluſius annotatum reliquit. In ſatis amplam attoillitur magnitudinem, ramis alijs ſubinde in alios diviſis, caudex ille lævis, & quo rami tenuiores, eò tenuiore cortice obteguntur: foliorum figura ferè media inter Prunum & Ceraſum, tenera, & circumcrenata: flores candidi & vulgari tenuiores ſunt: fructus globoſi, in promiſſis pediculis penduli, initiò virentes, poſt maturitati proximi rubore perfuſi, & poſtmodum ad ſaturatè purpureum colorem inclinantes: caro pulpoſa eſt, ſucculenta, guſtui blandiens, nucleum mediocrem obvolvens.

Vid. Cluſ. rarior. plantar. hiſtor. fol. 47.
Germanicè, Runde Myrobalanen. | Tabern. 698. lib. 3.

### III

MAla Armeniaca majora, quæ & mole fructuum & ſuavitate minora Armeniaca ſuperant, præcocia vulgò indigitata. Veniunt ex arbore per ætatem ſatis altâ, foliiſque virente, Perſicæ Mali æmulis, latioribus, & rotundioribus, ſerratis ambitu, & in ſummo mucronatis, quaternis, & quinis ſæpè ab uno exortu emergentibus: flores eandem Perſicam malum imitantur, coloris incarnati, è quibus fructus, ſine ullo pediculo conſpicuo, ſimul cohærentes, rotundi, & uno latere Amygdalini fructus inſtar fiſſurâ notati, ex aureo colore purpuraſcentes, palato grati, nucleum intus rotundum & aliquantùm compreſſum condentes.

Dodon. 785.
Lobel. Obſ. 596. Adv. 436.
Lugdunenſ. 297.
Matth. Epit. Cam. 146.
Hort. Med. Cam. 21. fol.

Matth. C. Bauh. 204.
Ger. Groß Marillen oder Johanns-Pfirſchen.
Tabern. 702. f. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 85.
Durant. 555.



II.
*Balauſtium flore minori Romanum.*

I.
Ciſtus flore albo.

III.
*Cotinus.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

CIſtus flore albo. Ledon v. Cluſio dictus. A radice lignoſâ & diſperſâ cubito altius attollebatur, ramis pluribus prædítus, è fuſco nigricantibus, & lento glutinoſo humore obſitis, quos folia, eodem modo pinguia & quaſi reſinoſa, veſtiebant, in virore fuſca, Oleæ folijs anguſtiora, & quaſi ambitu tenuiter rugata: flos in ramorum cacuminib⁹ multus erat, quatuor ſubrotundis folijs albidis ſtamina tenuia lutea meditullij cingens: ſemen in oblongo rigido anguloſo capitulo, aliorum Ciſtorum more, cumulatim latebat, inæquale, exiguum, rufum. Ad hujus ſtirpis radices Hypociſtis inveniri, à Cluſio traditur.

Cluſ. 79. lib. 1. | Germanicè, Weiſe Ciſt-Röslein.

### II

COtinus Coriaria Plin. Dodon. Scotanum Cœſalpin. Coggygria Plinij (Coccygria Cam.) & Cocconelia Theophraſti Cluſ. Olea Æthiopica Hippocratis Guillandini è placit. C. Bauh. Tricubitalis ejus altitudo erat, volvente, & ramis teretibus cortici concoloribus plurimis, circa quos ſubrufi longi pediculi folia frequentia porrigebant, obliquè nervata, ac è rotunditate leviter oblongata, rigida, Ulmo ſeu Piſtaceæ veræ folijs latiora, illorúmque odorem aromaticum æmulantia, pallidi viroris. Summis ramis floſculi exiles, herbacei, palleſcentes, racematim eminent, & his evanidis tenuis capillacea ſeu plumacea lanugo (quod nulli alij arborum generi evenire Plinius aſſerit) vel cæſaries, racemoſam, mollem, latam, obſcurè purpuraſcentem congeriem conſtituens, in cujus extremitatibus ſemina rara, exigua, parùm oblongata, depreſſa, è rufo per maturitatem nigricantia, lentibus minora, affiguntur.

Dodon. 767.
Cœſalpin. lib. 2. cap. 39. fol. 75.
Cluſ. 16. fol. cap. 12. lib. 1.
Lobel. Adv. 412. fol.
Lugdunenſ. 193.
Epit. Cam. 123. fol.

Hort. Med. 49.
Matth. C. Bauh. 187. fol.
Germanicè, Gelb Preſilgen-Holtz.
Tabern. 751. & 752. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 62. fol.
Durant. 281.

### III

BAlauſtium, flore minori, Romanum. Differt hæc arbor ab aliâ congenere, ſuperiùs deliniatâ, folijs atrovirentibus, & calicibus craſſioribus durioribúſque, florum minorum triſtiore ſaturatâ purpurâ punicantium magis ſylveſtrem genium referens.

Germanicè, Römiſche wilde Granat-Aepffel-Blühe.



III. Viola Marina repens. I. Alcea Sÿriaca. II. Cotula Fœtida.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

ALcea Syriaca, Ketmia Syrorum Ravvolffij. Caudex bicubitalis, lignoſus, rotundus, cortice ſcabro rubeſcente tectus, rectus, ramoſus, folia in ramis confuſo ordine ſuſtinet, oblonga, & quandoque trifida, ſaturatè viridia, potiſſimùm verò, ad Spinæ appendicis diviſuram, ambitu parùm laciniata, craſſa: flores vulgari Alceâ multùm ampliores, & magis è rubro purpuraſcentes fert, vetuſtate ad cœruleum colorem vergentes, ac juxta ungues radiato rubenti umbilico micantes: ſtylus in medio multis glomerulis pallidis ſtipatus eminet, ſtamina tenuia oblonga apicata à ſe exerens, cui unà cum flore decidenti ſuccedunt ſemina, in anguloſis oblongis capitulis, lunata, Abutili modo parùm compreſſa, dorſo villoſo.

Leonh. Ravvolff. Itinerar. fol. 62.
Hort. Med. Cam. 9.
Phytopin. C. Bauh. 134.
Germanicè, Roſin-rothe Syriſche Baum-Pappel.

### II

COtula fœtida, Parthenium, vel Virginea. Florum formâ & colore Anthemidi ſeu Chamæmelo vulgari reſpondet, nec folijs admodùm diſcrepat, niſi quòd denſiora & atrovirentia ſint, atque admodùm, ceu tota planta, fœtida & graveolentia; veſtiunt hæc, ab radice inutili tenuíque erumpentes, fragiles cauliculos, nullo ſervato ordine: ſemina gerit ſub diſco florum Chamæmeli, minuta, facilè reſtibili fœcunditate ſuum genus reparantia.

Dodon. 258.
Cœſalpin. Cotæ nomine 42. cap. lib. 12. fol. 492.
Lobel. Adv. 314. fol. icon. pag. 773.
Lugdunenſ. 954. fol.
Hort. Cam. 49. fol.
Matth. C. Bauh. 649.
Phytopin. C. Bauh. 227.
Germanicè, Kröttendill / Hundsdill.
Trag. 47. lib. 1.
Fuchſ. 222. cap.
Tabern. 83. fol. lib. 1.
Matth. Cam. Germ. 308. fol.
Durant. 283. fol.

### III

LEucoium marinum minus, & ſylveſtre anguſtifol. Heſperis Theophraſt. flore purpuraſcente. Viola marina repens autori. Cauliculis pedalibus infirmis, atque idcirco facilè humi procumbentibus, in plurimas alas diviſis, conſtat, folijs Leucoij vulgatioris incani, è diluto virore albicantibus: floſculi quatuor, folijs prædití, in carneo colore modicè rubent, quibus marcidis conſpicuæ fiunt ſiliculæ, ſeu cornicula teretia, exili & compreſſo plano ſubrufo ſemine referta.

An Dodon. fol. 160.
Lobel. Obſ. 179. Adv. 141.
Cluſ. 298.
Hort. Cam. 87. fol.
Phytopin. C. Bauh. 378.
Germanicè, Klein röthlicht Meer-Violen.
Tabern. 29. lib. 2.



I.
Alcea Syriaca flore candido.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

I

ALcea Syriaca, flore candido. Radiato meditullij umbilico, rubore perfuſo ſaltem prædita eſt, foliáque in flore pauló tenuiora candida obtinet, cæteris partibus nullatenùs ab Alceâ Syriacâ vulgatiore diſcrepat.

A nemine Herbariorum hoc colore florum attingitur.

Germanicè, Syriſch Baum-Pappel / mit weiſſen Blumen.



II.
Mÿrtus Tarentina.



I.
Mÿrtus latifolijs.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

MYrtus latifolia. Myrtus Italorum communis. Myrtus Bætica ſylveſtris Cluſij. Latifoliam dictam voluimus reſpectu Myrti alterius Tarentini, cum tamen non verè latifolia ratione Myrti Bæticæ domeſticæ 1. Cluſij exiſtimanda ſit. Tricubitatem altitudinem attingebat noſtra, cortice ramorum ſubrufo, illiſque obſequioſis, ac conveſtitis folijs perpetuis, frequentibus, oblongis, Ruſco & Buxo latioribus, mucronatis, craſſis, odoratis, in æquali ſitu locatis, & ſaturato virore ſplendentibus, ac, ſi verſus Solem eleventur, foraminibus exilibus undiquaque quaſi pertuſis: flores pediculi ſubrubentes à foliorum exortu ſubmittunt, Ceraſi floribus formâ minore, candidos, & quinque foliorum villoſa in medio ſtaminula odorata cingentes: his ſuccedunt baccæ oblongæ, in ſummo apicibus coronatæ, demùm nigricantes, quæ intus copioſis ſeminibus, triplici ſepto diſtinctis, ſeu parvis oſſeis granulis incurvatis, albidis, refertæ ſunt.

Vid. Dodon. 760. fol.
Cœſalpin. lib. 3. cap. 49. fol. 127.
Cluſ. 66.
Lobel. Obſ. 559.
Lugdunenſ. 237.
Cam. Epit. Matth. 132.
Hort. Med. Cam. 104.
C. Bauh. Matth. 195. fol.
Germanicè, Breit-blätterichter Welſcher Myrten-Baum.
Tabern. 760. lib. 3.
Cam. Matth. Germ. 71.
Durant. 625.

### II

MYrtus Tarentina. Minoribus, & Buxo magis anguſtis folijs eſt, æquè tamen craſſis, rigidis, & ſaturatè virentibus, ſed crebris quaſi foraminibus pertuſis, confertim magis ramulos ſuos amicientibus: flores paulò inferiores præcedente ſunt, formâ non diſpares, uti & fructus, pluribus apicibus coronati. Familiarior magis hortis Germaniæ eſt alijs Myrtorum ſpeciebus, utpote quæ, ramulis terræ impactis, faciliùs radices agat.

Cluſ. fol. 97. ſine icone.
Lugdunenſ. 237.
Cam. Epit. Matth. 133.
Hort. Med. Cam. 104.
C. Bauh. Matth. 195.
Germanicè, Tarentiniſcher Myrten-Baum.
Cam. Matth. Germ. 72.
Durant. 627.


I
Gelsiminum Catalonicum.
II
Maiorana latifolia.
III
Euphrasia ramosa pratensis flore albo
IV.
Euphrasia minus ramosa fl
ex cœruleo purpurascent

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

GElſiminum Catalonicum, vel Chamægelſiminum grandi florum peramœnum, Cam. E ſurculoſis ramoſis diſperſis radicibus emittebat caudicem lignoſum, variè rimoſum, è fuſco nigricantem, & brachia ramoſa verſus pollice craſſiorem, cujus caput à ſe diffundebat virides plurimos læves ramos, in quibus folia, ex adverſo ſibi oppoſita, coſtæ longæ conjugatim cohærentia, Jasmino ſeu Gelſimino luteo rotundiora, & minus craſſa viridia; præter ea quæ, in ſummo eminentia, in acutum quandoque mucronem faſtigiantur: flores ramorum vertices promunt, tenuiter laciniatis anguſtis caliculis ſuffultos, Jaſmino dicto quidem ſimiles, ſed multò grandiores, quina folia lata, ſupinâ parte candida, pronâ ſubrubentia, producentes, odoris ſuaviſſimi: ſemina non obſervata prætereunda duxi. Inſitione in Vulgare propagandum ſcribunt.

Lugd. Jaſmini Punicei Dalechamp. nomine, (fol. 1431.
Cam. Epit. Matth. 37.
Hort. Med. 64.
Germ: Jaſmin mit groſſen Blumen. Fremd Veil-Reben/oder Cataloniſcher

### II

MAjorana latifolia. Tantùm in latitudine foliorum, & ramis vegetioribus, capitulis florum rotundioribus, diſcrimen repoſitum eſſe videtur.

Germanicè, Breit-blätterichter Majoran.

### III

EUphraſia ſeu Euphragia ramoſa, pratenſis, fl. albo. Caule multiplicatur ab unâ radice, ramoſo, & foliorum Veronicâ fœminâ minorum, rotundorum, crenatorum magis quàm criſtatorum, viridium, minùs denſè ſitorum; floribúſque, luteo umbilico albicantibus, à ſequenti diſcrepat, & pratis lætioribus multùm familiaris eſt.

De Euphrag. vulgari Dodon. 54.
Cœſalpin. lib. 8. cap. 34. fol. 339.
Lobel. 261. Obſ. Adv. 210.
Lugdunenſ. 1167.
Cam. Epit. Matth. 767.
Thal. Harcyn. Saxono-Thuring. fol. 40.
Qui ad noſtram alludere videtur.
C. Bauh. Matth. 721.
Phytopin. Bauh. 443.
German. Staudechter Augen-Troſt mit weiſen (Blumen.
Trag. 108. cap. lib. 1.
Fuchſ. 91.
Tabern. 533. lib. ſecundo.
Cam. Matth. Germ. 356. Durant. 367.

### IV

EUphraſia, minus ramoſa, flore è cœruleo purpuraſcente. Radice ſuffulciebatur ſingulari, tenui, caulem erigens ſpithamæ altitudinis, ſtipatum frequentiſſimis criſtatis, ſubrotundis, è virore nigricantibus folijs, inter quos flores eminebant, Ocimi penè effigie, ſed labris diſſectis, præter umbilici maculam nigricantem, è cœruleo purpuraſcentes; ſemina in parvis ſubſequentibus capitulis, minuta, albeſcentia, occultantur.

Germanicè, Augen-Troſt / mit Purpur-blaulechten Blumen.



I. Strich nodendron. *Linaria* II. *Styriaca.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Arborum & Fruticum Æſtivalium continens.

### I

STrichnodendron Pſeudocapſicum Dodonæi. Amomum Plinij Italorum, & Solanum arboreſcens Belgarum Lobel. Frutex eſt bicubitalis, radicis lignoſæ, oblongæ, albeſcentis, ramos frequentes, ſaturato virore liventes, ſurrigens, circa quæ crebra folia Piperis Indici minoris, anguſta, & in ambitu quorundam leviter quaſi circumroſa, mucronata: flores inter folia tenuibus ſingularibus hærent pediculis, candicantes, Solani floribus aut Piperis Indici æmuli, quibus ſubnaſcuntur baccæ Corallij modo, per maturitatem rubentes, Ceraſi parvi magnitudine, in ſucculentâ pulpâ foventes ſemina plana, alba Solanorum.

Dodon. 706.
Lobel. Obſ. 136. Adv. 103. & 104.
Lugd. Solani Americani Dalechampij nomine, 599.

Germanicè, Baummichter Nacht-Schatten / auch Corallen-Baum.

Tabern. 281.

### II

LInaria Styriaca repens. Radiculæ tenues, annuæ, exiguæ, albeſcentes, plures cauliculos infirmos effundunt, ſesquipalmares, veſtitos folijs carnoſis, anguſtis, oblongis, Linariâ vulgari minoribus, brevioribus, è ceſio virentibus, frequentibus: floſculi ſummitates virgularum occupant, vulgaris floribus conformes, purpureo cœrulei, elegantes, ad violaceum colorem accedentes, poſt quos capitula oriuntur rotunda, membranacea, firma, ſemina compreſſa, parva, nigra Linariarum continentia.

Cluſ. 322. fol.
Et Oſyris purpureo cœrulea repens.
Lobel. Adv. 176.

Germanicè, Ungeriſch Lein-Kraut / mit Viol-braunen Blumen.

Tabern. 496. Linariæ Pannonicæ ſecundo nomine.

# *PRIMUS ORDO*
# COLLECTARUM PLANTARUM ÆSTIVALIUM.


I. Herba Paris.
III. Digitalis flore luteo.
II. Digitalis flo: incarnato.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

HErba Paris ſeu Solanum tetraphyllum, & Uva lupina Lobelio, Uva verſa, & Solanum monococcon Geſnero dicta. E radice transversâ, & ſummo ceſpite variè ſparsâ, fibríſque capillatâ, caulis exurgit unicus, duos palmos altus: in cujus plus quàm mediâ parte quatuor folia, decuſſatim ſibi mutuò reſpondentia, panduntur, ( nonnunquam terna, raró quina, rariſſimè ſena obſervari poſſunt) lata, nigricantia, aliàs Virgæ ſanguineæ penè congrua: flos ſummitatem caulis obſidet ſtellatus, pallidè herbaceus, cujus marceſſentis apex acinum purpureonigrantem promit, Solani lethalis baccis non abſimilem: ſuſtentum quatuor ſubſtratis anguſtis foliolis; ſemina verò alba, parva, Halicacabi, intra ſe condentem.

Videndus Lobel. in Adver. 105. pag.
Obſerv. 137.
Icon. pag. 267.
Dodonæ. in primâ edit: quæ eſt in octa. de herb.
Deleter. fol. 327. cap. 15.
Matth. C. Bauhini, fol. 772. & 767.
Caſp. Bauhin. Phytopin. fol. 798.
Lugd. pag. 1313.
Camer. in Hort. 118. pag.
Thal. in Sylv. Saxonothuring. fol. 57.
Germ: Wolffs-Beer/Stern-Kraut/Einbeer.
Matth. Camer. 382. fol.
Tabern. lib. ſecundo, cap. 6. fol. 391.
Trag. lib. primo cap. 102.
Fuchſ. cap. 30.
Durant. fol. 448.

### II

DIgitalis flore incarnato ſeu dilutè purpureo. Radice firmatur non profundè dimiſſâ, craſſis fibris multifidâ: caulem folia Verbaſci, ſed minora, nec tam lanuginoſa, alternatim veſtiunt: ſuaviter virentia & crenata: ab ejus verò medio uſque ad ſummum uno è latere eleganti ſerie conſpiciuntur flores deorſum nutantes, ex purpureo candidi, ſeu incarnati, oblongi, & dactyliothecis non diſpares: intus cavi & leviter hirſuti, ac punctati. His ſuccedit in rotundis pericarpijs ſemen puſillum, obſcurè rubeſcens.

Deſcrib. Dod. in primâ edit. inter Coronar. plant. fol. 42. cap. 11.
Lobel. Obſer. pag. 308. Adverſ. 245.
Camer. in Hort. 55.
Germanicè, Leibfarbe Fingerhůt.

### III

DIgitalis flore luteo, radice eſt magis perenni, magisque fibroſâ, caule cubitali, folijs anguſtioribus, per longitudinem venoſis, glabris, nigricantibus, & in margine nonnihil ſerratis, ac ſubtus albicantibus: flores obſoletè lutei, citra ullas puncturas, deorſum penduli: ſemina ſubſequentia parva ſunt, & pallidè rubentia, ſuperioribus pauló majora, cæteróquin forma æquali.

Videatur Dodon. Coronar. ſtirp. fol. 42.
Lobel. Adver. 245. Lugdunenſ. pag. 831.
Cam. in Hort. 55. Thal. in Sylv. Saxono. 38.
Caſp. Bauhini in Phytopin. 465.
Germanicè, Gelbe Fingerhůt.
Trag. lib. ſecundo, cap. 125. Fuchſ. cap. 345.

III.

Hieracium peregrinum.



II. Digitalis flore rubro.

I. Digitalis flore albo.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

DIgitalis, folijs ſuaviter vireſcentibus, lanuginoſis, ut & caule: floribus nive candidis, ab interiore parte hirſutis, nigris punctis intercurſantibus, conſtans.

Germanicè, Weiſe Fingerhůt.

### II

DIgitalis, folia obſcurè virentia & lanuginoſa habet, flores autem purpureos, interius ijsdem nigris punctis inſignitos & pictos.

Hæ plantæ menſe Junio Anno 1611. conſpiciebantur bicubitales.

Deſcriptiones harum ſunt apud

Dodon. fol. 169.
Lobel. Adverſar. fol. 245.
Dalechamp. fol. 831.
Camer. in Horto Medico, fol. 55.

Germanicè, Rothe Fingerhůt.

Leonh. Fuchſ. cap. 344.
Tabernæmont. fol. 270. lib. ſecundo.

### III

HIeracium latifolium, peregrinum, Phlomoydes, caule oblongo, & folijs lanuginoſis, ſubviridis coloris, flore pleno, obſcurè croceo: vulgus herbariorum vocat Piloſellam majorem, repentem, flammeam.

Germanicè, Wüllen Habichkraut.



III. Medium flore cœruleo.

I Valeriana Rubra.

II. Medium flore albo

Primus Ordo, Fol. 3.

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

VAleriana rubra, quæ alijs Narciſſus Virgilij & Columellæ alijs Been rubrum cenſetur, ex radice beneolenti, & mediocriter craſsâ longâque, caulem emittit rotundum, & longa poſt intervalla brachiatum, ad exortus foliorum geniculatum: folia utrinque bina pari ſitu huic affiguntur, ſupernè vireſcentia, ſubtus verò pallidiora, ex lato in acutum tendentia: faſtigijs ramulorum flores, denſo ſtipatu in muſcario digeſti, prodeunt creberrimi, hilari rubore micantes & caudati, Valerianæ vulgaris figurâ: quibus ſuccedunt ſemina, floccis plumoſis in ſummo notata.

Dodon. lib. tertio, cap. 22.
Lobel. Obſerv. 184. Adverſ. 144.
Lugdunenſ. lib. decimo, fol. 1187.
Camer. Horto. fol. 176.
Matth. Epitome, fol. 24.
Matth. C. Bauhini, fol. 41.

Caſp. Bauhin. in Phytopin. fol. 386.
Cœſalpin. lib. quarto, cap. 5.
Germanicè, Fremder rother Baldrian/geſpörlerter Baldrian.
Tabernæmon. lib. primo, fol. 571.
Icon. 168.

### II

MEdium ſeu Viola mariana, folijs virentibus, & caule hirſutis flore albo, ſtamina candidiora habet.

Germanicè, Weiſe Marien-Glocken.

### III

MEdium Dodonæ: Viola mariana, folijs ijsdem uti prædicta, floribus ex cœruleo purpureis, cum ſtaminibus item ex cœruleo albicantibus: Flores ejus ſunt capacitatis, ut unus capiat liquoris unicas duas.

De his ſcribunt Dodon. fol. 163.
Lobel. Adverſar. fol. 137.
Cluſ. lib. quinto, fol. 23.
Dalechamp. fol. 825.
In Epitome Camer. fol. 729.
Camer. in Horto Medico, fol. 98.
Matth. Caſp. Bauhin. fol. 699.
Germanicè, Blaue Marien-Glocken.
Im Teutſchen Matthiol. Camer. fol. 414.
Caſtor. Durant. fol. 1044.
Tabernæmont. fol. 33. lib. ſecundo.



I
Medium flore purpureo.

II.
Pseudomelanthium flo: rubescente.

III.
Pseudomelanthium flo: al

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

MEdium flore purpureo, ſeu magis è cœruleo purpuraſcente, quod Herbariorum plæríſque cum Medio vero Dioſcorideo, cui folia Seridis ex verſione Oribaſij tribuuntur, convenire viſum: ſed magis ad deſcriptionem Dioſcoridis accedit Ravvolffianum illud, ab eo in monte Libano inventum; niſi folijs Cichorij Spontanei inſtar diſſectis, non admodùm diſpar noſtro; cui folia Intubo minori ſativo ſimilia ſunt, aut Cichorio luteo Tabernæm: hirſuta tamen & per ambitum tenuiter crenata, in bicubitalibus ab radice lignoſâ & candidâ caulibus, & pluribus ad latera brachiatis emiſſis virgis; quarum ſummitates campanulæ oblongæ in cœruleo lætè purpuraſcentis coloris, & in extremis oris ſenis aut quinis inciſuris expanſæ, occupant. Styli in medio quinquangulares, in duo aut tria poſt ſtamina deſinentes: ſub quibus cauliculi angulares membranacei, aſperi, quinque loculis diſtincti, ſemina condunt parva, ſpadicea, quæ facile ſe ſparſa propagant.

Dodon. ſtirp. Coron. Ed. in oct. c. 7. f. 29.
Lobel. Obſerv. 175. Adverſ. fol. 138.
Lugdunenſ. lib. ſeptimo, cap. 16. fol. 825.
Cœſalpin. lib. nono, cap. 28. fol. 385.
Cluſ. lib. quinto, fol. CLXXIII. depictum, non deſcriptum.
Matth. Caſp. Bauhin. 699. fol.
Epitome Matth., fol. 729.
Horto Camer. fol. 98.
Phytopin. Caſp. Bauhin. 143.
Germ. Tabern. ſecundo. lib. 12. cap. fol. 32.
Matth. German. Camer. 414.
Durant. 1044.
German: Purpur-braune Glocken-Blumen.

### II

PSeudomelanthium, Nigellaſtrum Dodon. Lolium perperàm Fuchſio, flore rubeſcente. Caulis eſt ultra cubitum altus, ex radice tenui, ſingulari, annuâ, prodiens, rectus, rotundus, piloſus, æquè ac folia ejus, æquali ſitu ex adverſo bina ſemper affixa, Pſyllij figurâ, ſed acuminata & latiora: calix florum oblongus & ſtriatus in quatuor barbulas ſolvitur, quibus flos incumbit è purpureo rubeſcens: ſemina ſuccedunt pulla Lychnidum.

Dodon. Coronar. plant. cap. 14. fol. 49.
Lobel. Obſer. 23. Adverſ. Icon. 38.
Lugdun. libro quarto, cap. 33. fol. 438.
Cœſalpin. libro ſexto, cap. 43. fol. 253.
Matth. Epitome Camer. fol. 554.
Matth. Caſp. Bauhini, fol. 582.
Phytopin. Caſp. Bauhini, fol. 383.
Thal. 86.
Germ. Trag. lib. ſeptimo, cap. 40. pag. 127.
Fuchſ. cap. 44.
Tabernæm. lib. ſecundo, cap. 2. fol. 10. & 13.
Matthi. Germ. Camer. libro tertio, cap. 67. fol. 277.
Durant. fol. 586.
Germanicè, Raden mit rothen Blumen.

### III

PSeudomelanthium flore albo. Tantùm floris colore à ſuperiore variat.
Germanicè, Raden mit weiſen Blumen.



I.
Medium flore argenteo.

II.
*Lychnis Sylveſtris.*

III.
*Lychnis Sylveſtris flore albo.*

# Celeberrimi Eystettensis

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

MEdium flore argenteo, variat tantùm colore florum ſubalbido, & quaſi argenteo, cætera nihil à reliquis ſpeciebus differt.

Germanicè, Marien-Glocken mit Silber-farben Blumen.

### II

LYchnis ſylveſtris flore albo, nona Cluſij, Lychnidum familiam, quæ 33. plantarum Cl. C. Bauhino ferax putatur, & hæc planta auget; cujus à radice obliquâ, fibroſâ & perenni, crebra eriguntur folia, paulatim in latitudinem vergentia, & ſummitatibus acuminata, viridia, aliquantum villoſa: inter quæ caulis pedalis, aut procerior, folijs alijs binis, ſenſim brevioribus, ex adverſo in latiore pediculo ſitis, cingitur: ſummæ virgæ in oblongis ramulis oſtendunt ſtriatos florum cauliculos, ſuſtinentes quina bifida uſque ad umbilicum mucronata alba foliola, quorum apex pariter quinis ſtaminulis eminentibus inſignitur, folia verò facilè præ marcore ſe contrahunt & convolvunt, & tabeſcentes locum faciunt oblongis ſtriatis vaſculis, quæ referta ſunt ſeminibus parvis nigrocinereis, aliarum Lychnidum vice.

Cluſ. rar. plantar. hiſt. lib. tertio. c. 3. fol. 291.

Germanicè, Wild Margen-Röslein/oder wild Him̃el-Röslein

Tabernæmont. libro ſecundo, cap. 2. fol. 10.

### III

LYchnis ſylveſtris flore albo, quæ Behen album, & Polemonium, ac papaver ſpumeum dicitur, pleriſque ſuis partibus ſuperiori non diſpar, præter lævorem, & pallidum foliorum virorem, & florum tumentes albidos utriculos, ac lineás inæquales quaſi vermiculatás. Flos albus eſt, & folijs pluribus: radix æquè alba. Semina nigrocinerea.

Lobel. Obſerv. 184.
Icon. 340.
Adverſar. 143.
Lugdun. lib. decimo. c. 58. fol. 1186.
Camer. in Hort. Med. fol. 117.

Germanicè, Weis Behen/ Splyſpeckel.

Trago pag. 130. lib. primo, cap. 40.
Tabernæmon. lib. ſecundo, cap. 2. fol. 11.




II.
*Cervicaria hortenſis flo: cœruleo.*

I.
Ceruicaria maior ſylueſtris.

III.
*Cervicaria hortenſis flore a*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

CErvicaria major ſylveſtris, quarta ſpecies Dodonæo, quàm Cervicariam marinam vocare maluit. Folijs Cervicariam ſequentem æmulatur, niſi quòd anguſtiora ſint, & nervis magis per longitudinem excurrentibus inſignita: ambitu quoque leniter crenata, ſine petiolis in caule aliquot adnatis virgis ramoſo hærentia: circa tamen ejus medium ſubindè minora fiunt, & poſtmodum ſtrictiſſima. Sub ijſdem tam in alis, quàm in caule, quaſi oblongo thyrſo, racematim longâ & continuâ inæquali ſerie exhibentur flores purpureo cœrulei, calathi figurâ, plantâ ſequente minores, ſed illi non diſſimiles. Seminum forma cum illa convenit. Radix verò candida & oblonga, obliquas fibras hinc & inde ſpargens, aliquantum diſcrepat.

Dodon. de rap. ſylveſt. fol. 33. fol. verò pag. 164.
Lobel. Adverſ. 139.
Lugdun. fol. 829.
Caſp. Bauhin. in Phytopin. fol. 142.

Germanicè, Wild Purpur-blau Hals-Kraut/ oder Glöcklein.

### II

CErvicaria hortenſis fl. cœruleo, in hortos plurimos recepta fuit, licet æquè ac ſuperior ſpontanea ſit. Folia Urticam referunt, ex viridi nigricantia, aſpera, ſerrata & in acumen deſinentia prodeunt è caule ſeſquicubitali, anguloſo, aſperſo, hirſuto, in cujus alis flores exeunt deorſum nutantes, coloris dilutè cœrulei, pauló priore majores, in ambitu quinis inciſuris diviſi. Semina illi ſunt minuta, plana rubeſcentia Violæ Marianæ. Radix alba, firma & lignoſa, ſatis profundè dimittitur, vivax, ſed non inſtar ſuperioris ſerpit.

Dodon. de plant. Coron. fol. 31.
Lobel. Obſerv. 176. Icon. 326. Adverſar. 139.
Cœſalpin. lib. 9. cap. 29. (ſub nomine Archangelicæ) fol. 386.
Phytopin. Caſp. Bauh. 142.

Germanicè, Blaue wilde Glocken-Blumen.

Trago lib. ſecundo, cap. 147.
Fuchſ. cap. 146.
Tabernæmont. libro primo, fol. 121. Cervicariæ majoris ſecundæ nominis.

### III

CErvicaria hortenſis flore albo, florum tantum colore candido à ſuperiore deſcripta diſcrepat. Germanicè, Weiſe wilde Glocken-Blumen/ oder Hals-Kraut.



III. *Muscipula flo: rubro.* I. Pÿramidalis Lutetiana. II. *Muscipula flo: albo.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS
## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

PYramidalis Lutetiana, ſeu Campanula major lacteſcens Lobelij. Caulis, ternos cubitos altus, ſurrectus, plurimo lacteſcente ſucco ( veluti tota planta ) refertus, folijs, impari & continuo ordine in longis pediculis à ſe exeuntibus, ſuperbit, lævibus, glabris, atrovirentibus, & ab acuto angulo, per mediam partem latiorem, in mucronem deſinentibus, atque per ambitum modicè ſerratis: quæ tamen à medio caulis uſque ad ſum̃um anguſtiora ſubindè redduntur, & juxta exortus ſuos crebros poſt ſe habent in oblongis pediculis ſurrectis, breves foliaceos caliculos, ſuſtinentes flores cymbalares cœruleos, Campanulæ Perſici foliæ æmulos. Sed tota planta, è latitudine in acutum paulatim faſtigiata, pyramidalem figuram, unde etiam illi nomen, obtinere videtur. Radice conſtat craſsâ, fibroſâ, & facilè etiam fragmentis propagandâ. Semina obſoletè atrorubentia ſunt, Medij ſemina referentia, ſed valdè minuta. Lobel. in Obſerv. fol. 177. Icon. 327.

Cluſ. qui Iconem tantùm poſuit, rar. plant. hiſtor. lib. 5. cap. CL. fol. CLXXII.
Lugdun. lib. octavo, fol. 827.
Hort. Med. Camer. fol. 33.
Phytopin. Caſp. Bauhin. 139.
Germanicè, Blaue Milch-Glöcklein.
Tabernæmon. lib. ſecundo, cap. 13. fol. 33.

### II

MUſcipula flore albo, Viſcaria ſativa Tabernæ: Radix annua, lignoſa, ſingularis, fibroſa, caulem apud nos emittit cubitalem, & quandóque minorem, teretem, glabrum, per intervalla geniculis interceptum, è quibus ſingulis, hunc folia oblonga, ſatis ampla, acuminata, & in diluto virore, quaſi leviter candicantia, bina ordine æquali diſpoſita, arctè cingunt: ſuperiùs in aliquot tenues alas dirimitur ( mediâ parte tam glutinoſo liquore oblitas, ut plerunque muſcæ & alia minuta inſecta illic adhæreant ) quarum faſtigia quaſi in umbellam faſciculatim coguntur, è floſculis pulchris, ex oblongis & anguſtis cauliculis prodeuntibus, & quinis foliolis albis conſtantibus, congeſta. Semen in oblongis membranaceis vaſculis ſuccedit parvum, ſubrotundum, cinerei coloris. Autores vide paulò inferiùs.

Germanicè, Weis zam Leim-Kraut.

### III

MUſcipula flore rubro, coloris tantùm varietate à ſuperiore diſcrepat, vulgatioris tamen notitiæ ſola tantùm ab autoribus proditur.

Dodon. de ſtirp. coron. in octav. edit. cap. 20. fol. 73.
Lobel. in Obſerv. pag. 242.
Cluſ. lib. tertio, cap. 3. fol. 289.
Lugdun. lib. ſeptimo, cap. 8. fol. 809.

Hort. Medic. Cam. 103.
Phytopin. Caſp. Bauhin. fol. 387.
Germanicè, Roth zam Leim-Kraut.
Tabernæm. lib. 2. fol. 16. Icon. fol. 300.



III. *Campanula alba persicifolia.*

I *Chamænerion.*

II. *Campanula cærulea perſ folia.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

CHamænerion & Epilobium Geſnero, cui & Antoniana, ſive Sancti Antonij herba maxima dicitur (Alijs filius ante patrem, à ſiliquis præcocibus, quæ incremento ſuo florum eruptiones antevertunt, quaſi ſoboles parente prior) Duplex plerúnque obvia eſt: Anguſtifolia & latifolia, quæ noſtra eſt, & ſæpè bicubitali aut tricubitali altitudine fruteſcere videtur. Folijs conſtat prorſus integris, ſalignis, alternatim inhærentibus cauli, cujus ſummitates paulatim in thyrſum abeunt; & pediculis ſuis tenuibus exhibent ſiliquulas longiuſculas, teretes, obſeſſas quatuor foliolis anguſtiſſimis, quæ ſuſtinent viciſſim floſculos rubeſcentes quaternorum foliorum, multis in medio ſtaminibus inſignes. Decidentibus his ſiliquæ in quatuor particulas dehiſcunt, ſemen minutiſſimum rubeſcens tenui pappo affixum effundentes. Radix perennis eſt, & germinibus ſe latè multiplicat.

Videatur Dodon. fol. 85.
Lobel. Obſerv. 186. Adverſ. 145. qui tamen, ut alij pleríque, anguſtifolium depinxit.
Lugdun. lib. nono, c. 42. fol. 1060. & ſub nomine Onagræ lib. ſeptimo, cap. 37. fol. 865.
Hort. Camer. fol. 93.
Cluſ. lib. quarto, fol. LV.
Caſp. Bauhin. in Matth. ſub titulo Chamædaph. fol. 842. falsó ejus iconem poſuit.
Phytopin. Caſp. Bauhin. fol. 468.
Germanicè, Rothe Weiderich-Röslein.
Tabernæmon. 525. lib. quarto.

### II

CAmpanula Perſicifolia & Phytevma Matthioli fl. cœruleo. Radicibus exurgit non profundis, at germinatim ſe ſpargentibus, albis, fibroſis, è quarum capitibus proveniunt folia anguſta, oblonga, Nerij, leviter ſerrata, & obſcurè virentia: inter ea caulis attollitur bicubitalis, parùm ſtriatus, raro intervallo viciſſim folia ſenſim minora, & poſt illa flores in ſingulorum pediculorum ſummitatibus foliaceis exhibens, cymbalares, Medio ſeu Violæ marinæ, præter calathum breviorem, non impares, orificij ambitu diſſectos, & candidis intus ſtaminibus conſpicuos, & ſaturatè cœruleos. Semina ſequuntur in parvis perforatis Rapunculi capitulis, nitentia, perexigua.

Dodon. 166. Lobel. Obſerv. 177.
Adverſar. 139.
Cœſalp. lib. nono, cap. 30. fol. 386.
Lugdun. fol. 827.
Cluſ. lib. quinto, fol. CLXXI.
Matthiol. Caſp. Bauhin. 827.
Thal. ſub nomine Rapunculi campanulati Nerij fol. pag. 95.
Phytopin. Caſp. Bauhini, fol. 139.
Germanicè, Blaue Feld-Glöcklein.
Tabernæm. lib. ſecundo, fol. 33.

### III

CAmpanula Perſicifolia Lobel. flore albo, quo floris colore unicè à ſuperiore differt. Germanicè, Weis Feld-Glöcklein.



III. *Antirrhinum Sylvestre.*

I. Antirrhinum flore albo.

II. *Antirrhinum flore rubro.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

ANtirrhinum majus flore albo, radicem obtinet lignoſam, biennalem, caules cubito altiores, ramoſos; in quibus uſque ad faſtigium, continuato proventu, ſed inordinato ſitu, emicant folia atrovirentia ſeu Linariæ, ſeu Leucoij potiùs; quamvis paulò latiora; ipſi verò, pariter ac eorum virgæ laterales, ſuperbiunt floribus albeſcentibus, quaſi ſpicatim locatis, utriculatis, prope pediculos foliaceos anguſtioribus, ſuperiori verò parte capacioribus, & totâ figurâ leonini vel canini rictus concluſi ſpeciem referentibus. His marcidis ſubſtituuntur capitula oblonga, tenui ſtamine primitùs in ſummo notata, initiò vireſcentia, & poſtmodùm ex obſcuro nigrore palleſcentia, foraminoſa, & canini capitis ſceleto ſimilia, referta ſemine nigro exiguo, unde facilè ſuum genus propagat.

Germanicè, Löwen-Mäuler mit weiſen Blumen.

### I I

ANtirrhinum flore rubro, vulgatioris notitiæ eſt, & tantùm floris colore rubro diſcrepat.
Germanicè, Löwen-Mäuler mit rothen Blumen.

### I I I

ANtirrhinum ſylveſtre Phytevma Dodon: & Orontium: multùm ſimilitudinis cum ſuperioribus habet, ſed multo brevius eſt, & modicè hirſutum : cauliculo, qui æquè ac radicula tenuis eſt, affiguntur utrinque bina foliola, Linariæ oblonga, anguſta, ſubhirſuta: ex horum ſe ſubinde multiplicantium ſinubus oriuntur floſculi, antirrhinis prioribus pares, licet exiliores, coloris pallidè rubeſcentis. Capitula quaſi in apice, caduco & tenuiſſimo ſtamine inſignita, non ſunt diſparia, breviora tamen, & ſuperius perforata, calvariam ſimiæ referentia, intus plena copioſo ſemine, exiguo, nigro.

Dodon. fol. 282. Edit. octav.
Lobel. Obſerv. 221. & 222. Adverſ. 175.
Cœſalp. cap. 52. lib. octavo, fol. 350.
Lugdun. 1239. uſque 1341.
Hort. Camer. 18.
Epitom. Camer. 920. uſque 923.
Matthiol. Caſp. Bauhin. fol. 829.

Germanicè, Dorant Stärck-Kraut.

Matthiol. Camer. 416. Tabernæmon. 522. & 523.
Durant. 71. & 72.



III. *Anthirrinum flore albo oris rubentibus.*

I. Anthirrinum flore albo oris rubris.

II. *Anthirrinum flore albo oris luteis.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

ANtirrhinum flore albo, oris rubris, hac tantùm coloris notâ à prædictis Antirrhini majoris ſpeciebus differens.

Germanicè, Weis Löwen-Mäuler mit rothen Rachen.

### II

ANtirrhinum flore albo, oris luteis, æquè ac ſuperior oris luteis tantùm variat.

Germanicè, Weis Löwen-Mäuler mit gelben Rachen.

### III

ANtirrhinum flore albo, oris rubentibus. Variat & hoc oris ſaltem rubentibus, cæteróquin priorum familiam nullis notis abnegat.

Germanicè, Weiſe Löwen-Mäuler mit röthlichten Rachen.



# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

ACONITUM Lycoctonum flore luteo, aut potiùs è luteo palleſcente, quam Cl. D. Bauhinus in monte Muteto flore albo obſervavit. Folia profert ampla, atrovirentia, viticea, Geranij Batrachoidis modo altè laciniata, ſed inciſuris latioribus prædita. Inordinatè autem ambiunt caulem cubito altiorem, ſuperiori parte ferè nudum, & adnatis ramorum in thyrſos diviſum. Flores his adfiguntur luteopallidi, Anthoræ floribus minores, formâ non impares. Floribus ſuccedunt cornicula trigona, in uno pediculo ſimul cohærentia, Aquilegiæ corniculis æqualia, quæ ſemina nigra, anguloſa & rugoſa complectuntur. Plantam ſuſtinent radices numeroſæ, variè ſparſæ, nigricantes, multis fibris convolutæ, perennes.

Lobel. Obſ. 386. Adver. 301. Icon. pag. 627.
Cœſalp. cui Napelli ſecundum genus floribus pallidis eſt. lib. 13. cap. 32. fol. 585.
Lugdun. 1739. fol. lib. 17.
Cluſ. lib. 5. c. IX. fol. XCIV. Icone tantũ poſitâ.
Hort. Camer. fol. 4.
Epitom. Camer. fol. 827.
Matthiol. Caſp. Bauhin. lib. 4. 736. fol.
Thal. Sylv. Hercyn. Saxonothuring. fol. 7.
Phytopin. Caſp. Bauhin. fol. 332.
Germanicè, Wolffswurtz mit gelben Blumen.
Trag. ſub nomine Lupariæ, lib. I. cap. 82. fol. 247.
Tabern. lib. 2. cap. 8. fol. 284.
Fuchſ. c. 30.
Camera. in Mathio. German. 76. fol. 380.

### II

ACONITUM Lycoctonum flore Delphinij latifolium, à Cluſio & depictum & deſcriptum, ſub Aconiti Lycoctoni Delphinij facie Sileſiaci I. nomine. Superioris propemodùm formam æquat. Folia ſubhirſuta ſunt, Platani diviſurâ caulis glaber, æquè altus ac prior, ſed quaſi tenui polline, & attactu facilè detergendo, conſperſus, qui ſpicatim flores caudatos, ſursùm verſos, & aliquantùm recurvos, interiùs cœruleos, exteriùs purpureos oſtendit, Conſolidæ regali, nondum penitùs apertæ, æmulos. Flores excipiunt ſiliquoſa ſuperioris Aconiti trigona capitula, referta ſeminibus rugoſis & inæqualibus, fuſcis. Radix eſt craſſa, tuberoſa, graveolens, fibroſa, è ſuo latere nova germina emittens.

Cluſ. hiſto. plan. lib. 5. c. 9. f. XCV.
Phytopin. C. Bauhin. f. 332.
Germanicè, Blaue Schleſiſche Wolffs-Wurtz.



III. *Napellus flo: variegato.* I. Antora. II. *Napellus Arborescens*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

ANthora ſive Antiphtora, Aconitum ſalutiferum & Napellus Moyſis dicta. Radix parvuli Napi figuram refert, turbinata, fibroſa, & prope caput parvula olivaris formæ tubercula emittendo facilè ſe propagans. Caulem fundit cubitalem, rectum, multifidis folijs, & Conſolidæ regalis inſtar ab imo tenuiter diſſectis, ſumitatem verſus rarioribus veſtitum. Juxta foliorum pediculos virgæ tenuiores multæ, floribus Napelli, aut cæterorum Aconitorum abundant, cucullatis, & inferiori parte hiantibus, pallidéque flaveſcentibus. Succedit ſemen in corniculis Aquilegiæ, quinis ſeníſve quaſi calcaribus invicem in uno pediculo conjunctis, nigrum, ſcabrum.

Dodon. 440. Lobel. 385. Icon. pag. 677. Adver. 301.
Lugdun. 1748. Cluſ. rarior. plant. f. XCVIII.
Cœſalp. lib. 15. c. 35.
Epitom. Matth Cam. 837. & 838.
Matth. D. Bauhin. 769.
Germanicè, Gifftheil.
Matth. Camer. fol. 455.
Tabern. lib. 1. cap. 13. fol. 399.
Durant. 73.

### II

NApellus arboreſcens, ob proceritatem, qua fruteſcere videbatur, & decempedalem attingebat, aſpectu elegans, ſed vi pernecabili extimeſcendus. Radicem profert, ſub tanto caule, oblongam, fibroſam, craſſam, & in longitudine tuberoſam: folia atrâ viriditate nitent, multiplici ſectione, Geranij cœrulei vulgatioris, aut Ranunculi II. Sylveſtris Tabernæ: diviſuris quadantenus reſpondentes. Flores confuſo ſitu in ramorum thyrſis oblongis ſpectantur ſaturatè cœrulei, galeati, inferius bifidis particulis expanſis diviſi, qui poſtmodùm marceſcentes in terna cornicula fuſca deſinunt (unde etiam Cordo Lycoctonum ſativum tricarpon appellari placuit) condentia ſemen rugoſum, triangulum, nigricans.

Dodon. 439. Lobel. Obſ. 387. Adv. 301.
Lugd. 1745. Cluſ. XCVI. lib. 5.
Epitom. Cam. 836.
Matth. C. Bauhin. 768.
Hort. Camer. 104.
Phytopin. Caſp. Bauhin. fol. 334.
Germ: Narren-Kappen / Blau Eyſenhütlein.
Matth. Camer. 383.
Tabern. 286. lib. ſecundo.
Durant. 629.

### III

NApellus, è cœruleo & albo colore variegatus, raritate tantum ac dicto florum colore à priore diſcrepat.

Germanicè, Geſcheckte Narren-Kappen / oder Eyſenhütlein.



I.
Linum ſylveſtre flore cœruleo

II
Tragopogon flore luteo.

III.
Tragopogon purpureu

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

LInum Sylveſtre flore cœruleo, è radicis lignoſæ candicantis, parúmque fibroſæ, capite, folia lino anguſtiora & numeroſa cauliculos, pedem altiores, crebros, graciles, teretes, inæqualiter cingunt, uſque ad ſumma faſtigia ramulis diviſos, quorum pediculis tenuibus, oblongis, inſident flores caduci, ſativo lino pares, ſaturatè cœrulei, folijs quinis totidémque ſtaminulis apicibúſque medijs conſtantes. Semina conduntur in rotundis capitulis, oblonga, parva, fuſca, nitentia, ſativi lini ſeminibus reſpondentia.

Lobel. Obſ. pag. 226. Icon. p. 413
Lugdun. lib. 4. f. 495.
Cluſ. plant. hiſt. lib. 3. c. 16. fol. 319.
C. Bauhin. in Matth. Lat. f. 335.
Cam. in Ep. Matth. f. 202.
Cam. in Hort. 90.
Phytop. Caſp. Bauhin. fol. 403.
Germanicè, Klein blau wild Lein-Kraut.
Trag. pag. 337. lib. 1. c. 117.
Tabern. lib. ſecundo, fol. 494.
Matth. Germ. Cam. lib. 2. c. 17. f. 117.

### II

TRagopogon ſeu Barba hirci, flore luteo. Radix ſingularis, unica, &, ceu tota planta, lacteo ſucco turgida, folia depromit viridia, graminea, Phalangij inſtar, ſed longiora; quæ caulem inordinatè ſinubus ſuis amplectuntur; ſuperiùs in adnatâ diviſum, quorum extremitates ex oblongis caliculis, & in ſummo foliaceis, flores emittunt aureos, frequenti foliorum ſerie conſtantes. Sereno cœlo (Scorzoneræ & aliorum Cichoraceorum vice) Solem verſus panduntur: nubiloſo, calicibus contractis ſe occludunt. Florum marcidorum caput poſtmodùm circumdat papposa cæſaries, ſemina ſub ſe continens oblonga, ſtriata, è fuſco palleſcentia.

Dodon. Pempt. 2. lib. 3. c. 13.
Lobel. Obſ. 297. Icon. 550.
Lugd. l. 9. c. 61. f. 108. & 1079.
Cœſalp. lib. 13. c. 23. f. 517.
C. Bauh. in Matth. Lat. 410.
Cam. in Epitom. Matth. f. 312.
Cam. in Hort. fol. 27.
Phytop. C. Bauh. 536.
Germ: Gelb Bocks-Bart/Joſephs-Blum.
Trag. pag. 288. lib. 1. c. 94.
Tabern. l. 2. cap. 17. f. 297.
Fuchſ. 318. cap.
Matth. Germ. lib. 2. c. 72. f. 166.
Caſt. Durant. fol. 131. & 132.

### III

TRagopogon purpureum, robuſtius pauló priori eſt, & folijs frequentioribus ac latioribus, nec radice ut in ſuperiore dulci, ſed adſtringente, reliquis partibus, abſque floris intenſè purpureo cœrulei colore, omninò conveniunt.

Iidem Autores, qui ſuperiùs citati, & huc quadrant.



II. *Linaria flo: albicante.* I. Linaria aurea. III. *Linaria vulgaris.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

LInaria aurea Tragi, Oſyris Viennenſium, & Oſyris Auſtriaca Cluſij. Radix dura, lignoſa, & aliquantùm fibroſa, perennis, deſinit in cauliculos cubitales, lentos, frequentibus longis & anguſtis foliolis Lini inſtar cinctos, uſque ad faſtigium, quod in tenues virgarum alas dividitur, abeuntes in foliacea capitula, quæ in umbellâ quaſi rariore oſtendunt flores minoris Conyzæ luteos, quinis foliolis & ſtylo medio prominenti conſtantes. Succreſcit ſemen fuſcum, ſuperiùs villoſum, Hieracijs vulgaribus non abſimile, Septembri maturum. Major & minor eſt illa Linaria; noſtra minori reſpondere videtur.

Quæ apud Lobel. pag. 225. & Icon. 409.
Lugdun. 1152. Cluſ. 325. lib. 3. minoris nomine.
Phytop. Caſp. Bauhin. fol. 403.
Germanicè, Gůlden Lein-Kraut.
Trag. pag. 358. lib. 1. c. 117.
Tabern. 496.

### II

LInaria flore albicante, proceritate vulgarem non excedit, folijs pauló latioribus, & lætè vireſcentibus, floribus albicantibus, rictu purpuraſcente decoris, à nemine niſi à Camerario deſcripta.

Germanicè, Weis Lein-Kraut mit Purpur-farben Rachen.
Camer. Hort. Med. fol. 90.

### III

LInaria vulgaris lutea: cauliculi ſesquipedales ſimplices, recti, graciles, frequentes, ſurgunt è radice repentè albicante, alternatim denſo crebriorum foliorum anguſtiorum proventu uſque ad extremitates ſuas ornati; in ſummo ſpicam oblongam exerunt, refertam floribus pallido luteis, cavis, rictu croceo conſpicuis, & ſuperiùs Antirrhini inſtar labris diſſectis, inferiùs in tenuem caudam abeuntibus. Semina concluduntur in oblongis & intùs bifidis membranaceis capitulis, ſubrotunda, paleacea, compreſſa, minuta, nigra.

Dodon. 184. Lobel. Obſ. 222. Adv. 175.
Cœſalp. lib. 8. c. 51. f. 350.
Lugd. 1332. Hort Camer. 930.
Matth. Cam. 837. Phytop. C. Bauh. f. 400.

Germ: Stern-Kraut / U. L. Frauen Flachs.
Trag. fol. 135. Tabern. 497. lib. 2.
Fuchſ. 207. Matth. Cam. 418.
Durant 526.



III. *Pulegium Cervinum.* I. *Pſeudo Struthium.* II. *Pulegium Regium.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

PSeudoſtruthium Matthioli, luteola & herba lutum Dod. Lutea Plinij, caulem rectum profert, ex una radice craſsâ & ſingulari, ſecundo poſt ſationem anno, bicubitalem, & ſæpè multiplici germinatione conſpicuum, toroſum, frequenti foliorum oblongorum proventu ſtipatum; qui demùm in ſpicam oblongiuſculam excreſcit, floſculis undíque pallidoluteis denſè farctam. Huic poſtmodùm adnectitur ſemen in folliculis aſperiuſculis, & ſurſùm decuſſatim hiantibus, minutum, nigrum, rotundum, Blito nigro non abſimile.

Dodon. 81. Lobel. Obſ. 190. Adv. 149.
Lugd. 822. Epitom. Camer. 356.
Matth. C. Bauh. 442. C. Bauh. Phytop. 571.
Germanicè, Stärck-Kraut/ Streich-Kraut.
Trag. pag. 362. lib. 2. c. 118.
Tabern. lib. 1. c. 11. fol. 395.
Matth. Camer. 209. Durant. 990.

### II

PUlegium Regium officinis, à multiplici flexu radicularum, tranſverſim & ſummo ceſpite variè fibras agentium, ramulis ſupinis ſe leviter extollit, folijs Ocymo aut Amaraco æmulis, ſed aliquantulùm ſerratis; cauliculos totos, juxta foliorum exortus, verticillatim digeſti floſculi, è purpureo languentes, ambiunt. Semen minutiſſimum, obſoletè ſpadiceum. Sapor herbulæ acris eſt, odor ſuaveolens.

Dodon. 280. Lobel. Obſ. 266.
Adv. 214.
Lugdun. 89. & 892. Epit. Cam. 471.
Cœſalp. lib. 11. c. 60. Hort. Cam. 133.

Matth. C Bauhin. 52. Phytop. f. 419.
Germ: Poley.
Trag. 9. Fuchſ. 37. cap.
Matth. Camer. fol. 240. Durant. 810.

### III

PUlegium anguſtifolium, ſeu Cervinum & Monſpelienſe, benè deſcripturâ Lugdunenſi Herbario. Crebris ſurculis dodrantalibus, æquè ac ſuperius, ſe ſummâ tellure ſpargit, odore vehementiore, folijs pariter numeroſis, anguſtis, Satureiæ aut Hyſſopi parvis interdum juxta exortum lacinijs notatis, quibus per intervalla verticillati floſculorum languidè purpuraſcentium globuli interponuntur: ſemina ſuperiori paria, & facilè terræ commiſſa prodeuntia.

Ab autoribus prædictis ſuperiori adjungitur.
Caſp. Bauh. fol. in Phytop. 420. Lugdun. 892.
Germanicè, Hirſch-Poley/ oder Poley von Mompelier.



III. *Abrotanum Mas.* I. Reseda Plinij. II. *Dracuncellus Hortenſis.*

# CELEBERRIMI EYSTETTENSIS

## Horti, Icones Plantarum Æſtivalium.

### I

REſeda Plinij Neotericorum, Eruca peregrina Italica ſeu Cantabrica, radix longa, levis, albeſcens, extollit caulem bicubitalem, aut altiorem quandóque, quem conjugatim in uno pediculo, alternato ſitu uſque ad ſumas virgas ambiunt folia, Ruculæ vel Erucæ ſylveſtri æmula, viridia, glabra. Faſtigio verò in alas dividitur, prægnantes floſculis plurimis, in oblongam ſpicam congeſtis, muſcoſis, albeſcentibus; quibus ſtamina minuta crocea in medio: his ſubſtituuntur vaſcula albida, palleſcentia, angularia, membranacea, turgidula, & in ſummo hiantia, referta ſeminibus exiguis, nigris, Pſeudoſtruthio non diſparibus.

| | |
|---|---|
| Lobel. Obſ. 410. Adv. 76. | Germ: Fremd Raucken mit weiſen Blumen. |
| Lugd. lib. 10. c. 57. f. 1199. Hort. Camer. 138. | Tabern. 398. lib. 1. |

### II

DRacuncellus ſeu Dracunculus eſculentus, Draco & Tarchon hortenſe. Adſcribunt huic plantæ miram originem, videlicet è lini ſemine, Squillæ germinanti inſerto, aut cæpæ, aut Raphani radicibus impacto: atque id etiam poſt alios Lobelius è Ligurum & Hetruſcorum hortulanorum affirmationibus nobis perſuadere conatur: multis tamen, qui familiam inter Botanicos ducunt, reclamantibus, atque illi locum natalem ſpontaneum in Burgundiâ aſſignantibus. Nos, irrito Scaligeriano ſucceſſu moniti, nihil tale tentare auſi ſumus. E radice reſtibili & latè ſummâ tellure germina innumera, graminis aut Pulegij inſtar ſpargente, ſuffruticis ad modum ſeſe attollit in caulem ſeſqui cubitalem, rotundum, ramoſum, qui impari ordine ab imo uſque ad ſummas alas decoratur folijs Lini, ſeu Ptarmicæ, minùs ſerratis, viridibus, carnoſis, ſapore gratam acredinem referentibus (cujus commendatione etiam in acetaria recepta fuit) quorum tamen prima & novella plerúnque in trifidas lacinias dividuntur. Floſculi, in faſtigijs ramulorum ſparſi, luteoli ſunt, & abrotano campeſtri vel artemiſiæ non impares. Semen minutiſſimum, nigrum, infœcundum, ita ut totius plantæ propagatio tenellis germinibus, in varios partes divulſis, nitatur.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 697. Lobel. Obſ. 243. | Matth. Caſp. Bauh. 445. | Germ: Dragoncella oder Dra- |
| Adv. 190. | Epitom. Matth. Cam. 363. | Matth. Cam. 191. (ckonkraut. |
| Lugd. lib. 5. c. 53. f. 685. | Hort. Med. 56. | Tabernæm. 176. lib. ſecundo. |
| Cœſalp. lib. 14. c. 36. f. 563. | Phytop. C. Bauh. f. 155. | Durant. 328. |

### III

ABrotanum mas radicem obtinet lignoſam, admodum fibroſam, caulem vix cubitum altum, æquè lignoſum, gracilem, quem folia, in oblongam tenuitatem capillaceam diſciſſa, circumdant, albido virore prædita, odoris medicati: floſculi luteoli, tenues, in racemis abſinthij vice diſpoſiti. Semen aliorum congenerum plantarum ſpecie minutum, è quo minus quàm è ſurculis decerptis multiplicatur.

| | | |
|---|---|---|
| Dodon. 21. f. Lob. Obſ. 444. Adv. 342. | Matth. C. Bauh. 512. Hort. Cam. f. 1. | Trag. 129. Fuchſ. 2. |
| Lugdun. 937. f. Cœſalp. lib. 12. c. 6. 478. | Phyt. C. Bauh. 230. Germ. Stabwurtz | M. Cã. 235. Tab. 61. |
| | | (Durant. f. 3. |